

АВИФАУНИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ / FAUNISTIC NOTES

Регистрация пары европейского черноголового чекана (*Saxicola torquata rubicola*) в Московской области**A record of a pair of the European Stonechat (*Saxicola torquata rubicola*) in the Moscow Region**

В 2005 г. в окрестностях г. Пушкино (Серпуховский р-н Московской обл.) мы неоднократно наблюдали самца и самку **черноголовых чеканов** (*Saxicola torquata*). В первый раз эта пара была отмечена 22.04.2005 г. у д. Тульчино (54°50' с.ш.; 37°43' в.д.) Я.А. Редькиным и М.В. Коноваловой. Птицы держались в пойме р. Оки у края многолетней залежи, недалеко от двух молодых берёзок. При повторных посещениях этого участка 30.04 и 1.05 птицы были обнаружены вновь. Пара обычно держалась у края залежи (непаханого несколько лет поля), сидя на высоких прошлогодних стеблях чернобыльника. Во время последнего посещения 4.06 удалось обнаружить только самку, птица сильно беспокоилась, дважды мы наблюдали её с кормом в клюве, однако гнезда или слётков найти не удалось. Во время всех посещений чеканы близко подпускали наблюдателей и позволяли хорошо себя рассмотреть. Обе птицы имели ряд признаков, позволивших однозначно отнести их к европейскому подвиду *S. t. rubicola*. У самца рыжая окраска на нижней части тела занимала всю грудь и переднюю часть живота, задняя часть живота также имела хорошо заметный охристый налёт. Спина выглядела тёмно-бурой с неясными светлыми пестринами. На беловатом фоне в области поясницы и надхвостья были хорошо заметны (особенно при взлёте птицы) тёмные продольные пестрины. У самки голова и горло были однотонного тёмно-бурого цвета. Кроме того, на грязно-охристом надхвостье также были заметны тёмные пестрины.

Среди немногочисленных сообщений о находках черноголового чекана в центральных областях России только два содержат данные о подвидовой принадлежности наблюдавшихся птиц: 11.07.1955 г. в Рязанской обл. на р. Оке недалеко от с. Ижевского добыт взрослый самец подвида *S. t. rubicola* (Птушенко, 1962), а в 1990 г. пара птиц западносибирского подвида *S. t. taura* (Pall.) гнездилась на юге Москвы (Томкович, 1995). Таким образом, на территории Московской и сопредельных областей встречаются и, вероятно, изредка гнездятся как европейский, так и западносибирский подвиды черноголового чекана.

Несмотря на крайнюю редкость встреч черноголового чекана в Подмоскovie и сопредельных областях (Птушенко, Иноземцев, 1968), наша находка черноголовых чеканов в окрестностях г. Пушкино — не первая. Ранее Б.Н. Вепринцев и В.В. Леонович отметили выводок черноголовых чеканов 15.07.1974 г. на луговом склоне берега Оки севернее жилых кварталов города (Зубакин и др., 1981), а 7.05–2.06.1996 г. С.И. Петров наблюдал поющего самца этого вида на пустыре у южной окраины Пушкино (Петров, письм. сообщ.). К сожалению, в обоих случаях о подвидовой принадлежности наблюдавшихся птиц ничего не сообщается.

Литература

- Зубакин В.А., Абоносимова Е.В., Лавринович Т.Е., Мищенко А.Л., Ошанин С.Д., Шитова Е.Г. 1981. Фауна наземных позвоночных Пушкино и его окрестностей. — Экология малого города. Пушкино: 44–85.
- Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М., 461 с.
- Птушенко Е.С. 1962. Дополнения и исправления к списку видов птиц Окского заповедника и Рязанской области. — Орнитология, 5: 108–109.
- Томкович П.С. 1995. Гнездование черноголового чекана в Москве. — Орнитология, 26: 198.

В. Ю. Архипов¹, Я. А. Редькин²

¹ Ин-т теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пушкино, Московская область, 142290, Россия. e-mail: v_arkhipov@mail.ru

² Зоологический музей МГУ, ул. Большая Никитская, 6, Москва, 125009, Россия. e-mail: jardo@online.ru

V. Yu. Arkhipov¹, Ya. A. Red'kin²

¹ Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Moscow Region, 142290, Russia. e-mail: v_arkhipov@mail.ru

² Zoological Museum of Moscow Lomonosov State University, Bolshaya Nikitskaya Str., 6, Moscow, 125009, Russia. e-mail: jardo@online.ru