

ISSN 2221-9269



Московка



НОВОСТИ ПРОГРАММЫ
Птицы Москвы и Подмосковья
№ 42, сентябрь 2025 г.

Редколлегия: Х. Гроот Куркамп, М. Калякин, О. Волцит

Адрес редакции: Зоологический музей МГУ, ул. Бол. Никитская, 2, Москва, 125009

Электронный адрес: Х. Гроот Куркамп geert.grootkoerkamp@gmail.com

Программа «Птицы Москвы и Подмосковья»

Наша цель — объединить людей, которые знают, любят и охраняют птиц, и совместными усилиями создать новую сводку о птицах Москвы и Московской области.

С 1999 г. при Зоологическом музее Московского университета действует Программа «Птицы Москвы и Подмосковья». Главная цель Программы — объединение любителей птиц для всестороннего изучения птиц региона и публикации полной, современно оформленной сводки «Птицы Москвы и Московской области», учитывающей весь имеющийся в литературе и в неопубликованных рукописях материал. Конкретные сведения, изложенные в книге, должны послужить целям просвещения, привлечь внимание к птицам как к индикаторам состояния окружающей нас среды, создать фундамент для сохранения биологического разнообразия птиц региона.

Трудно найти более важную цель для регионального объединения любителей и знатоков птиц из Москвы и Подмосковья, а для её достижения, безусловно, понадобятся усилия многих и многих заинтересованных лиц. Хотелось бы, чтобы при этом результат любого частного наблюдения естественным образом включался в итог общих усилий, направленных на осуществление конкретного, важного и интересного для всех нас дела.

Электронное обеспечение программы:

Рассылка Birdnewsmoscow — Птицы Москвы и Подмосковья

birdnewsmoscow@googlegroups.com

Сайт программы: <http://www.birdsmoscow.net.ru>

База данных «Онлайн дневники наблюдений» <https://database.ru-birds.ru/>

фото на 1 стр. обложки, ремез, Нарские пруды © Е.В. Швыдун
фото на 4 стр. обложки, садовая овсянка, Луховицкий р-н © В.Д. Калиниченко
при оформлении выпуска использованы рисунки Х. Гроота Куркампа и В.С. Шляховой

Москва: Товарищество научных изданий КМК
Moscow: KMK Scientific Press Ltd.





Новости и перспективы Программы

Михаил Калякин

Есть и то, и другое. Хотя благодаря «горизонтальным связям» — чатам, сайтам, форумам и рассылкам — все заинтересованные лица в основном в курсе происходящих событий, но всё-таки не все читают всё, и некоторое суммирование, надеюсь, оправданно. В первую очередь остановимся на том, в какой стадии находится работа по подготовке атласа птиц Московской области и Москвы. А то именно в тех самых чатах и рассылках кто-нибудь нет-нет да запутается.

Итак. Полевые наблюдения, результаты которых попадут в атлас, ЗАКОНЧЕНЫ. Данные о всех встречах с птицами, состоявшихся 1 сентября 2025 г. и позже, в атлас НЕ ПОПАДАЮТ. Но это совершенно не означает, что они менее важны и интересны. Перефразируя В. Маяковского, подчеркнём — птицы всякие важны, встречи всякие нужны. Они должны попадать в систему онлайн-дневников и обязательно так или иначе будут использованы для уточнения наших знаний о птицах региона. Я уже не говорю о встречах птиц за границами Московской области — жизнь в этом смысле продолжается. Более того, она продолжается сразу в двух наших онлайн-системах, поддерживаемых Зоологическим музеем и командой из Ильи Уколова, Ксении Семёновой и Андрея Лисовского — за что им огромное спасибо (<https://rusbirds.ru/>; <https://www.ru-birds.ru/>)! Вернёмся к атласу. Закончилась и не менее тягучая фаза его подготовки — все добавления и уточнения наблюдатели должны были внести в онлайн-систему или прислать Ольге Викторовне до 30 сентября. Эта дата тоже уже в прошлом, так что можно уверенно говорить о том, что началась окончательная обработка собранного массива данных. На этом пополнение базы данных для создания карт атласа завершено, всем участникам большое спасибо!

Обработка данных не так проста, как хотелось бы. Перечислю только некоторые «подводные камни», тормозящие процесс работы над атласом. Ошибки или неточности... неаккуратность наблюдателей в ряде случаев заставляет перепроверять географическую привязку наблюдений, даты и гнездовой статус, что иногда требует обращения к авторам представленных сведений. Не такой простой оказалась и процедура выявления всех авторов наблюдений. И, пожалуй, самой существенной проблемой как была, так и остаётся необходимость проверки сообщений о встречах редких и очень редких видов, а также видов, чьё определение в поле затруднительно. Конечно, при массиве данных в тысячи и тысячи «видо-регистраций» мы не можем рассчитывать на проверку всех сообщений, и не станем сильно переживать о том, что вдруг кто-то спутал лазоревку и большую синицу, отмечая их на слух. Число таких ошибок исчезающе мало и не повлияет на наши представления о распространении и статусе этих видов в московском регионе. Вероятно, в базу просочились и куда-то не денутся некоторые сомнительные и даже ошибочные регистрации молодых «светлых» луней и др. т.п. Но что прикажете делать с большими белоголовыми чайками? Не все наблюдатели и не всегда уверенно сообщают о встрече серебристых чаек или хохотуний, вероятны неточности при определении больших и малых подорликов, гаичек, мелких славковых... Вот тут-то, наконец, не обойтись без включения в процесс фаунистической комиссии, которой предстоит не просто утвердить те или иные встре-

чи, если для их верификации будут какие-то материалы (фото, видео, записи голосов). Придётся составить некий свод правил того, как мы будем относиться к анализу данных о заведомо плохо определяемых видах. И, значит, того, как мы будем отражать соответствующие данные на картах и в текстах видовых очерков в атласе. Тут, конечно, не обойтись и без согласования с авторами очерков, специалистов по соответствующим группам птиц. Появился повод напомнить участникам Программы и проекта создания атласа о том, что в реальной жизни при определении птиц могут быть пограничные случаи, в которых очень трудно выбрать категорическую позицию, заявив «это точно полярная чайка» или «это точно НЕ полярная чайка». См. недавнюю публикацию Хирта Гроота Куркампа (2025, РОЖ № 34 (2533), с. 2281–2284). Полагаю, что как бы мы ни старались, некая «серая зона» для встреч, о которых в итоге высказаться даже всей комиссии определённо не получится, сохранится. И замалчивать её наличие (то есть существование непонятных и непонятых до видового уровня регистраций) вредно. Такой подход мы уже применяли при составлении списка видов птиц Московской области (Калякин и др., 2023). Но если удастся придумать более хороший вариант — примем его.

Параллельно с верификацией данных и пополнением базы данных самими последними добавками уже начата тоже очень непростая, объёмная и ответственная работа людей, согласившихся выступить в роли авторов видовых очерков. Эти тексты призваны, во-первых, облегчить читателям анализ картографического материала, а во-вторых — дополнить его разъяснениями и сведениями, которые невозможно показать на карте, в частности, указать на степень обнаруживаемости конкретных видов в разные сезоны, влияющую, конечно же, на степень реалистичности полученных данных. Первую, небольшую порцию видовых очерков мы уже получили, сопоставили и проанализировали. Это позволило немного скорректировать принятый (и тоже обсуждавшийся с коллегами) план видового очерка и разослать его авторам. Он уже не будет меняться, все дальнейшие корректировки будут происходить за счёт работы редакторов атласа и их весьма вероятных диалогов с авторами. Отмечу также, что дизайн и набор карт для каждого вида разработан, так что и этот непростой этап позади.

Мы заглянули в творческую лабораторию по созданию атласа, провели там много времени и заканчиваем её описание кратким выводом о том, что процесс идёт, что его, конечно, очень не хочется затягивать, но при этом в не меньшей степени хочется сделать атлас максимально информативным и максимально понятным читателю. Если вы заглянете на вторую страницу обложки и в который раз пробежитесь глазами по формулировке нашей главной цели, то сможете заметить, что с изданием атласа она в заметной степени окажется достигнутой. Атлас будет описывать современные состав, распространение и обилие птиц московского региона. Книгой, в которой карты распространения птиц будут выполнены с небывалой пока подробностью.

Но не атласом единым... Деятельность нашей Программы — а это, конечно, целиком и полностью деятельность её участников — шире и разнообразнее. Немало интересных новостей попало на страницы настоя-

щего номера «Московки», некоторые, надеюсь, попадут на её страницы позже. Наблюдения продолжаются, птицы постоянно подкидывают нам интересные случаи из своей жизни, новые виды продолжают пополнять авифауну Московского региона. Программы мониторинга численности обычных видов, успеха размножения белого аиста, состояния популяций гнездящихся и зимующих водоплавающих и многие другие «долгоиграющие» проекты продолжают и развиваются. Продолжаются и наши семинары, на которых раз за разом удаётся узнать что-то новое и интересное. Уверен, не станет исключением и осенний семинар.

Коснусь и двух нерадостных новостей. Лосиный остров. К сожалению, в последние месяцы и даже годы сами эти слова вызывают тревожность и даже некоторое отчаяние из-за планов прокладки дороги прямо по загородной части этой ООПТ... Мероприятие лукаво подвёрстывают под термин «капремонт», оно медленно, но всё-таки развивается, а попытки на разных уровнях противостоять осуществлению этих планов пока (?) решительных успехов не приносят. Но могу вас заверить — они продолжаются, и шансы на успех, полный или хотя бы частичный, ещё не потеряны. Не вдаваясь в подробности, должен сообщить, что, оказывается, обращения граждан, в том числе, а может быть и в первую очередь, «на самый верх» иногда дают некоторые результаты, поэтому при появлении соответствующих обращений в рассылках, на сайтах и в соцсетях действительно хорошо бы на них откликаться.

Тревожно и за «Журавлиную Родину», а именно за планы использования территории, формально не входящей в границы заказника, но очень важных для кормёжки журавлей в период существования осеннего миграционного скопления. И тут тоже приветствуется любая полезная активность, и тут не всё потеряно, «операции» по изменению планов размещения животноводческого комплекса в разгаре. Хотелось бы, конечно, сообщить о том, что какие-то успехи наметились, но пока говорить об этом было бы преждевременно и безответственно... За ситуацией нужно следить и в её улучшении нужно участвовать всеми доступными способами.

Михаил Владимирович Калякин, kalyakin@zmmu.msu.ru

Перспективы. Хотелось бы, чтобы два последних вопроса проходили по статье «перспективы», но пока нет, перспективы тут весьма туманны... Гораздо определённое можно сказать о двух инициативах, и это возвращает нас к термину «атлас». Во-первых, кажется, окончательно созрела идея о повторении проекта «Атлас птиц Москвы». Имеется в виду «старая» часть города, Москва внутри МКАД. Использование в качестве полигона для исследования этой части города и обращение к той же сетке квадратов, которая была использована в первом атласе, позволит нам не только выяснить современное состояние авифауны города, но и сравнить его с данными, собранными в 2006–2011 годах. Очень важно и интересно воочию убедиться в наметившихся за 20 лет изменениях. О формате и наполнении проекта мы ещё подумаем, хочется сделать его максимально ёмким, в частности — собрать данные о реальной численности городских птиц, более точных, чем оценка по грациям 10, 100, 1000...

И, кажется, пошёл процесс, о важности и интересности которого я говорил и писал неоднократно: начался первый после московского проект по созданию атласа птиц одного из регионов центра европейской части России — Ярославской области. Наблюдатели из Московского региона вполне могут поддержать проект своим участием, можно быть уверенным в том, что и ярославские орнитологи и любители наблюдений за птицами в ходе его реализации приумножат свои ряды. Считаю, что главное — начать, и всё получится. Чего мы и пожелаем исполнителям этого проекта!

Уверен, что упомянул не всё, повторюсь — результаты некоторых инициатив мы находим и будем находить на страницах нашего журнала. Традиционно сердечно благодарю всех участников Программы, всех авторов статей и очерков, фотографов, чьи работы делают «Московку» такой приятной и красивой, и Илью Уколова, который не только поддерживает, но и постоянно улучшает онлайн-систему сбора авифаунистических данных, ставшей прекрасным инструментом реализации множества наших проектов. Всем удач и побольше птиц.



Ведение списка видов птиц Москвы и Московской области

Обновления на сентябрь 2025 года

Михаил Калякин, Ольга Волцит

Галстучник *Charadrius hiaticula*

В аннотированном списке (Калякин и др., 2023) был указан в качестве редкого пролётного и летующего вида области. В 2025 г. 18.09 впервые отмечен в Москве внутри МКАД (И.В. Кузиков, см. заметку на с. 51).

Пестроносая крачка *Thalasseus sandvicensis*

Залётный вид. В XXI веке первая регистрация двух особей 23.05.2024 г. в Лотошинском рыбхозе (С.А. Скачков). До этого известна встреча 18.05.1996 г. в колонии озёрных чаек в Москве на Люблинских полях филътрации (Зубакин, 2001).

Михаил Владимирович Калякин, kalyakin@zmmu.msu.ru
Ольга Викторовна Волцит, voltzit@zmmu.msu.ru

Черноголовая трясогузка *Motacilla feldegg*

Залётный вид. Первая регистрация 23.05.2021 г. в окр. Купавны (Ю. Глазунова, фото в iNaturalist).

Литература

- Зубакин В.А. 2001. Об орнитологических находках и гнездовании редких видов птиц в Московской области в 1996–2000 гг. — Орнитология, 29: 293–295.
Калякин М.В., Волцит О.В., Конторщиков В.В., Зубакин В.А., Морковин А.А. 2023. Аннотированный список видов птиц Москвы и Московской области. М., 60 с.



Авифаунистические исследования в центральной Мещёре в 2025 году

Владимир Нецветаев, Михаил Невский, Илья Уколов, Сергей Симонов, Александр Сазонов, Мария Шведко

Введение

Мещёра — физико-географический регион, обширная низменность, находящаяся на территории Московской, Владимирской и Рязанской областей. С севера она ограничена долиной р. Клязьмы, с юга — долиной р. Оки ниже устья р. Москвы, с востока — долинами рек Судогда и Колпь. Низменность обрамляют, соответственно, Смоленско-Московская, Среднерусская возвышенности и Окско-Цнинский вал. Высота над уровнем моря колеблется в пределах 80–140 м. Климат территории умеренно континентальный, характеризуется тёплым летом и умеренно холодной снежной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм. Почвенный покров представлен дерново-подзолистыми, болотно-подзолистыми, болотными и аллювиальными типами почв (Мучник и др., 2019).

Мещёра представляет собой типичное полесье, обширную выровненную территорию, сформированную водно-ледниковыми процессами четвертичного оледенения Восточно-Европейской равнины. Для данной местности характерны развитые поймы рек и донные формы рельефа междуречий (Сажнев, Лычковская, 2024). Гидрографическая сеть изучаемой территории представлена реками Клязьма, Пра, Бужа, Поля, Большая Ушма, Сеньга, Цна, Ялма, а также многочисленными водоёмами ледникового, карстового и пойменного происхождения. В течение вегетационного сезона характерны регулярное весеннее половодье и паводковые явления. Регулярное затопление талыми и дождевыми водами пойменных долин — важный фактор, влияющий на структуру фитоценозов и, как следствие, на формирование сообществ птиц.

Плоский рельеф и близкое залегание водоупорного слоя обусловили наличие многочисленных болот, большинство которых были осушены в первой половине XX в. для добычи торфа. Низменность более чем на половину покрыта лесами (Невский, Нецветаев, Ровинский, 2024). Преобладающие породы — сосна, берёза, ель; также встречаются участки дубрав и чёрноольшаников.

Орнитологические исследования Мещёры проводятся с XIX в. (Ананьева и др., 2008), новый виток изучения начался в рамках Программы «Птицы Москвы и Подмосковья». С сентября 2023 г. авторы совершали регулярные выезды, в первую очередь в Орехово-Зуевский, Шатурский, Егорьевский городские округа Московской обл., Петушинский, Собинский и Гусь-Хрустальный районы Владимирской обл.

Материалы и методы

Исследование фаунистического состава производили как методами маршрутных и стационарных наблюдений, так и с помощью пассивных учётов (акустический мониторинг при помощи устройств на основе программы BirdNET-Pi).

Результаты

Приведём описание перспективных ключевых орнитологических территорий по данным за январь–сентябрь 2025 г. (см. карту на с. 4).

1. Озеро Острец и окрестный лесной массив (Орехово-Зуевский ГО, Московская обл.)

Озеро Острец — средних размеров (0,3 км²) водоём частично антропогенного происхождения (затопленные торфоразработки). Наибольший интерес представляют сосновые боры и вырубки вокруг озера.

Весной на пролёте здесь один раз встречена пара больших крохалей (*Mergus merganser*). В лесном массиве восточнее озера, возможно, гнездятся осоед (*Peris apivorus*) и чёрный коршун (*Milvus migrans*). Обычна хохлатая синица (*Lophophanes cristatus*). На пустошах к северу и северо-западу от озера, вероятно, гнездятся лесные жаворонки (*Lullula arborea*), также доказано гнездование серого сорокопута (*Lanius excubitor*).

2. Окрестности д. Губино и пос. Верея (Орехово-Зуевский ГО, Московская обл.)

Интерес представляет комплекс затопленных торфоразработок в окрестностях д. Губино и пос. Верея, а также прилегающий лесной массив и карьер у д. Тимонино.

На весеннем пролёте на обводнённых торфоразработках встречаются единичные черношейные поганки (*Podiceps nigricollis*), скопления свиязи (*Mareca penelope*). На полях у д. Губино видели небольшие скопления серых журавлей (*Grus grus*) до 10–20 птиц. Один раз наблюдали змеяда (*Circaetus gallicus*) над лесом севернее торфоразработок.

На торфоразработках, возможно, гнездятся серая утка (*Mareca strepera*), хохлатая чернеть (*Aythya fuligula*), гоголь (*Bucephala clangula*). Подтверждено гнездование красноголового нырка (*Aythya ferina*), хохотуны (*Larus cachinnans*) и серебристой чайки (*L. argentatus*). В окрестных сосновых лесах нередок глухарь (*Tetrao urogallus*).

На карьерах у д. Тимонино отмечено вероятное гнездование малого зуйка (*Charadrius dubius*), там же летние регистрации фифи (*Tringa glareola*).


3. Окрестности д. Филиппово (Орехово-Зуевский ГО, Московская обл.)

Данные территории находятся в окрестностях д. Филиппово в долине р. Сеньги, правого притока Клязьмы, на её правом берегу. В смешанных лесах преобладают ель и берёза. Зимой здесь отмечены относительно редкие виды дятлов — трёхпалый (*Picoides tridactylus*) и средний пёстрый (*Dendrocoptes medius*). Встречаются глухарь (*Tetrao urogallus*) и рябчик (*Tetrao bonasia*).

Отдельный интерес представляет дальнейшее обследование обводнённых торфоразработок к востоку и западу от д. Филиппово. Из редких птиц весной здесь отмечены белощёкая крачка (*Chlidonias hybrida*) и мордунка (*Xenus cinereus*).

4. Оз. Сольвейг и прилегающие леса (Орехово-Зуевский ГО, Московская обл.)

Большой интерес представляет комплекс водно-болотных угодий в лесном массиве между д. Заполицы



Территории, обследованные в 2025 г.

и д. Петрушино. Ключевым участком является оз. Сольвейг (фото) и болото Зиборова. Эти водоёмы имеют частично антропогенное происхождение.

На пролёте здесь встречаются шилохвость (*Anas acuta*), свиязь (*Mareca penelope*). Гнездятся лысухи (*Fulica atra*), камышницы (*Gallinula chloropus*), красногловые нырки (*Aythya ferina*), хохлатые чернети (*A. fuligula*). На окрестных болотах, возможно, гнездятся серый журавль (*Grus grus*) и большой улит (*Tringa nebularia*). На болоте Либорова существует крупная колония озёрных чаек (*Larus ridibundus*), там же гнездятся редкие виды поганок — черношейные (*Podiceps nigricollis*) и красношейные (*P. auritus*).

В лесном массиве вокруг водно-болотных угодий обычны хохлатая синица (*Lophophanes cristatus*), горихвостка-лысушка (*Phoenicurus phoenicurus*), деряба (*Turdus viscivorus*). Вероятно, гнездятся рябчик (*Tetrastes bonasia*) и глухарь (*Tetrao urogallus*). Один раз встречена кедровка (*Nucifraga caryocatactes*), возможно гнездование тетеревиатника (*Accipiter gentilis*). На вырубках в восточной части лесного массива доказано гнездование серого сорокопута (*Lanius excubitor*).

5. Луг у д. Бекетовская (Орехово-Зуевский ГО, Московская обл.)

Биотоп — низинные высокотравные луга. Отмечено вероятное гнездование дупеля (*Gallinago media*) и большого веретенника (*Limosa limosa*).

6. Рыбхоз «Цна» (Егорьевский ГО, Московская обл.)

Рыбокомбинат «Цна» расположен в центральной части Егорьевского ГО. Многочисленные пруды рыбхоза, разделённые между собой дамбами, расположены вдоль поймы р. Цны и её правосторонних притоков р. Люблевки и р. Тетеревки. Общая площадь прудов превышает 2500 га.

На обводнённых прудах останавливаются на пролёте и гнездятся множество водоплавающих и околоводных птиц. На пролёте отмечены черношейная поганка (*Podiceps nigricollis*), свиязь (*Mareca penelope*), шилохвость (*Anas acuta*), хохлатая чернеть (*Aythya fuligula*), длинноносый крохаль (*Mergus serrator*), лутук (*Mergellus albellus*), малая чайка (*Hydrocoloeus minutus*), белощёкая крачка (*Chlidonias hybrida*). Гнездятся серая утка (*Mareca strepera*), широконоска (*Spatula clypeata*), чирок-трескунок (*S. querquedula*), чирок-свиистунок (*Anas crecca*), гоголь (*Bucephala clangula*), чомга (*Podiceps cristatus*), лысуха (*Fulica atra*), камышница (*Gallinula chloropus*).

Во время весенней миграции илистые отмели спущенных прудов привлекают большое число ржанкообразных птиц, из редких пролётных куликов отмечен щёголь (*Tringa erythropus*). Гнездовое поведение отмечено для малого зуйка (*Charadrius dubius*), перевозчика (*Actitis hypoleucos*), черныша (*Tringa ochropus*), моро-



Оз. Сольвейг и примыкающее болото. Фото: В. Нецветаев



Излучина р. Клязьмы у д. Жохово.

Фото: В. Нецветаев

дунки (*Xenus cinereus*). В обширных тростниковых зарослях некоторых прудов в гнездовой период слышали пение нескольких видов камышевок, в т.ч. дроздовидной (*Acrocephalus arundinaceus*), индийской (*A. agricola*) и тростниковой (*A. scirpaceus*), токование большой выпи (*Botaurus stellaris*) и погоныша (*Porzana porzana*).

На деревьях (ива, берёза), растущих вдоль разделительных дамб, гнездится ремез (*Remiz pendulinus*). Регулярно на территории рыбхоза встречаются большая белая цапля (*Ardea alba*), большой баклан (*Phalacrocorax carbo*), орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*).

Помимо самих прудов рыбхоза интересна приустьевая часть р. Люблевки, представляющая собой залитый пойменный луг. На этой территории гнездятся чомга (*Podiceps cristatus*), сизая чайка (*Larus canus*), речная крачка (*Sterna hirundo*), чёрная крачка (*Chlidonias niger*), лысуха (*Fulica atra*). В мае дважды наблюдали серощёкую поганку (*Podiceps grisegena*). Из куликов в гнездовой период отмечены бекас (*Gallinago gallinago*) и поручейник (*Tringa stagnatilis*). На прилегающих к реке территориях расположены суходольные луга, предположительно сформировавшиеся на участке вырубленного леса. Помимо травянистого покрова, разреженно растут молодая сосна, берёза, кустарники. Весной встречены поющий лесной жаворонок (*Lullula arborea*) и токующий перепел (*Coturnix coturnix*).

В сосново-еловом лесном массиве к югу от рыбхоза обычны хохлатая синица (*Lophophanes cristatus*), московка (*Periparus ater*), горихвостка-лысушка (*Phoenicurus phoenicurus*), дёрыба (*Turdus viscivorus*).

7. Восточная часть Петушинско-Шатурского лесного массива (Петушинский р-н, Владимирская обл.; Шатурский ГО, Московская обл.)

Данные территории представляют собой обширный лесной массив между реками Клязьма, Большая Ушма и Поля. Леса по составу разнородные, преобладает сосново-берёзовый лес. Местами встречаются участки сосновых боров, в т.ч. беломошников, ельников, березняков. В долинах небольших рек чёрноольшаники. В лесном массиве также располагается множество озёр среднего и мелкого размера, наиболее изученным в орнитологическом плане является оз. Кендур. Часть локации находится на территории государственного природного комплексного заказника «Крутовский».

Из немногочисленных и редких гнездящихся птиц отмечены мухоловка-белошейка (*Ficedula albicollis*), горихвостка-лысушка (*Phoenicurus phoenicurus*), юрок (*Fringilla montifringilla*). Вероятно, гнездится трёхпалый

дятел (*Picoides tridactylus*). Обычны козодой (*Caprimulgus europaeus*), дёрыба (*Turdus viscivorus*) и хохлатая синица (*Lophophanes cristatus*). Из совообразных доказано гнездование длиннохвостой неясыти (*Strix uralensis*), вероятно гнездование воробьиного сычи́ка (*Glaucidium passerinum*) и мохноногого сы́ча (*Aegolius funereus*).

На оз. Кендур в летний период встречен орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*). Вероятно, гнездятся водяной пастушок (*Rallus aquaticus*), погоныш (*Porzana porzana*), лысуха (*Fulica atra*) и камышница (*Gallinula chloropus*). Неоднократно регистрировали серого журавля (*Grus grus*). Относительно обычны рябчик (*Tetra-
stes bonasia*) и глухарь (*Tetrao urogallus*).

8. Пойма и левобережные террасы р. Клязьмы у д. Жохово (Собинский р-н, Владимирская обл.; Шатурский ГО, Московская область)

Леса к юго-западу от д. Жохово представляют типичные для Мещёры сосновые боры. В нижнем ярусе леса многочисленны брусника, багульник и вереск. В пойме разнообразие ландшафтов более велико — есть луга, низинные болота, чёрноольшаники, дубравы (в том числе старовозрастные) (фото).

Сосновые боры в орнитологическом плане достаточно бедны и однообразны, но и здесь можно встретить редких птиц, таких как глухарь (*Tetrao urogallus*) и трёхпалый дятел (*Picoides tridactylus*). В ельнике отмечена кедровка (*Nucifraga caryocatactes*), в целом редкий для Мещёры вид. Данные ночного пассивного акустического мониторинга показали высокое разнообразие вокализирующих сов. Здесь отмечено токование неясытей — длиннохвостой (*Strix uralensis*) и серой (*S. aluco*), а также воробьиного сычи́ка (*Glaucidium passerinum*).

В пойме реки разнообразие птиц значительно повышается. На старицах Клязьмы отмечено вероятное гнездование чирка-свистунка (*Anas crecca*), чирка-трекунка (*Spatula querquedula*), гоголя (*Bucephala clangula*), водяного пастушка (*Rallus aquaticus*), погоныша (*Porzana porzana*). В пойменных дубравах отмечены поющие самцы мухоловки-белошейки (*Ficedula albicollis*). Регулярные встречи пар коршунов (*Milvus migrans*) и орланов-белохвостов (*Haliaeetus albicilla*) говорят о вероятном гнездовании этих видов на данной территории. В июне один раз видели змеяда (*Circaetus gallicus*).

На пойменных лугах, возможно, гнездятся перепел (*Coturnix coturnix*) и серый сорокопуд (*Lanius excubitor*). На реке регулярно встречаются зимородки (*Alcedo atthis*), которые гнездятся в обрывистом берегу. На пролёте зарегистрированы пуночки (*Plectrophenax nivalis*).

9. Торфоразработки у пос. Шатурторф (Шатурский ГО, Московская обл.)

Обследованы главным образом пруды торфоразработок вдоль грунтовой дороги от пос. Шатурторф до пос. 21-й.

На прудах гнездятся красноголовый нырок (*Aythya ferina*), серая утка (*Mareca strepera*). Также сформированы колонии чаек — гнездятся озёрная чайка (*Larus ridibundus*), сизая чайка (*L. canus*), хохотунья (*L. cachinnans*). Вероятно, гнездится чёрная крачка (*Chlidonias niger*). В обширных тростниковых зарослях отмечено пение соловьиного сверчка (*Locustella luscinioides*).

10. Туголесские озёра (Шатурский ГО, Московская обл.)

Озеро Свиношное находится к югу от пос. Туголесский Бор. Относительно крупный водоём площадью около 1 км². На озере предполагается гнездование красноголового нырка (*Aythya ferina*) и чёрной крачки (*Chlidonias niger*). На весенней миграции зарегистрированы такие редкие виды как малая цапля (*Hydrocoloeus minutus*) и красношейная поганка (*Podiceps auritus*). В ближайших окрестностях встречен ремез (*Remiz pendulinus*).

Озеро Мёртвое в настоящее время является комплексом обводнённых торфоразработок, частично заросших березняком. К югу от бывшего озера располагаются сосновые боры, к западу, северу и востоку — обширные торфоразработки.

В лесах обычны хохлатая синица (*Lophophanes cristatus*) и деряба (*Turdus viscivorus*). В гнездовой период встречен чеглок (*Falco subbuteo*). На торфоразработках в летнее время зарегистрированы волчок (*Ixobrychus minutus*), водяной пастушок (*Rallus aquaticus*), большой кроншнеп (*Numenius arquata*), фифи (*Tringa glareola*), большой улит (*Tringa nebularia*), чёрная крачка (*Chlidonias niger*). Вероятно, гнездятся большая выпь (*Botaurus stellaris*) и хохотунья (*Larus cachinnans*).

11. Пойма р. Ялмы и прилегающие леса (Шатурский ГО, Московская обл.)

Особый орнитологический интерес представляет территория, ограниченная р. Ялмой от д. Кулаковка на севере до Егорьевского шоссе на юге, а также прилегающие с востока леса и болота. Данная местность является ключевой не только для гнездящихся, но и для мигрирующих птиц.

Во время весенней миграции на разливах р. Ялмы отмечены шилохвость (*Anas acuta*), свиязь (*Mareca penelope*), гоголь (*Bucephala clangula*), луток (*Mergellus albellus*), малая поганка (*Tachybaptus ruficollis*). Из куликов на весеннем пролёте встречены большой кроншнеп (*Numenius arquata*), большой улит (*Tringa nebularia*) и мордунка (*Xenus cinereus*).

Весь летний период на заросших рогозом торфоразработках около с. Дмитровский Погост отмечали на кормёжке больших белых цапель (*Ardea alba*), которые, возможно, гнездятся где-то поблизости. Также в гнездовой сезон встречен орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*). Из относительно редких околотовных птиц стоит отметить вероятное гнездование водяного пастушка (*Rallus aquaticus*) и обыкновенного погоныша (*Porzana porzana*).

В лесных массивах вдоль р. Ялмы предположительно гнездятся серые журавли (*Grus grus*). Там же весной отмечено токование клинтуха (*Columba oenas*) и серой неясыти (*Strix aluco*), также были встречены слётки ушастой совы (*Asio otus*).



Низовое болото в Черустинском лесу. Фото: В. Нецветаев

12. Черустинский лес и окрестности (Шатурский ГО, Московская обл.)

Огромный лесной массив площадью около 250 км². Образован преимущественно сосново-берёзовыми лесами с вкраплениями ельников. Среди леса множество небольших зарастающих верховых болот (фото). Территория массива относится к государственному природному заказнику областного значения «Черустинский лес». Также интерес представляют оз. Филинское и луга у д. Тельмы, находящиеся в непосредственной близости от лесного массива.

В лесах обычны хохлатая синица (*Lophophanes cristatus*), деряба (*Turdus viscivorus*), рябчик (*Tetrastes bonasia*), глухарь (*Tetrao urogallus*). Возможно, гнездится трёхпалый дятел (*Picoides tridactylus*). На болотах вероятно гнездование большого улиты (*Tringa nebularia*). Относительно обычен на гнездовании серый журавль (*Grus grus*). На окраинах массива, возможно, гнездятся осоед (*Pernis apivorus*) и чеглок (*Falco subbuteo*). В сентябре на кочёвках один раз видели змееяда (*Circaetus gallicus*).

Из совообразных на территории заказника зарегистрированы длиннохвостая неясыть (*Strix uralensis*) и воробьиный сычик (*Glaucidium passerinum*).

На оз. Филинском на пролёте отмечены шилохвость (*Anas acuta*), луток (*Mergellus albellus*). Подтверждено гнездование гоголя (*Bucephala clangula*). На лугах в окрестностях д. Тельмы на кочёвках встречены полевой лушь (*Circus cyaneus*) и змееяд (*Circaetus gallicus*). Регулярно отмечают серого журавля (*Grus grus*). В гнездовой период зарегистрированы токующие пары травника (*Tringa totanus*), большого кроншнепа (*Numenius arquata*) и большого веретенника (*Limosa limosa*).

13. Клепиковские озёра, окрестные поля и дельта р. Бужи (Шатурский ГО, Московская обл.; Гусь-Хрустальный р-н, Владимирская обл.)

Клепиковские озёра — комплекс озёр, относящийся к системе рек Бужи и Пры. Общая площадь водоёмов составляет ~3500 га. Авторы обследовали подмосковную часть центрально-мещёрской озёрной системы и приустьевую часть р. Бужи.

На оз. Святом в июле зарегистрированы зимородок (*Alcedo atthis*) и большой улит (*Tringa nebularia*).

На оз. Дубовом гнездится серая утка (*Mareca strepera*), отмечено вероятное гнездование свиязи (*M. penelope*), хохлатой чернети (*Aythya fuligula*). В тростниковых зарослях, вероятно, гнездятся водяной

пастушок (*Rallua aquaticus*), погоныш (*Porzana porzana*) и соловьиный сверчок (*Locustella luscinioides*). Обнаружены небольшие колонии крачек — белокрылых (*Chlidonias leucopterus*) и белощёких (*Ch. hybrida*). Регулярно встречаются пары чёрных коршунов (*Milvus migrans*) и орланов-белохвостов (*Haliaeetus albicilla*).

В ближайших окрестностях озера в летний период зарегистрированы большой кроншнеп (*Numenius arquata*) и большой веретенник (*Limosa limosa*). Вероятно гнездование ремеза (*Remiz pendulinus*). В окружающих лесных массивах, вероятно, гнездится большой подорлик (*Clanga clanga*). На полях между деревьями Зименки и Шеино вероятно гнездование перепела (*Coturnix coturnix*).

В окрестностях с. Пышлицы на весеннем пролёте отмечены золотистые ржанки (*Pluvialis apricaria*), в сентябре — крупные скопления серого журавля (*Grus grus*) размером до 220 птиц. Зимой встречены пуночки (*Plectrophenax nivalis*). Отмечено возможное гнездование серого сорокопута (*Lanius excubitor*).

Приведём также перечень некоторых редких птиц, встреченных на изучаемой территории с января по сентябрь 2025 г. Список редких видов составлен на основе данных Красной книги Московской области (2018), Красной книги Владимирской области (2018), списка редких гнездящихся видов птиц Нечернозёмного центра России (Калякин и др., 2025) и аннотированного списка видов птиц Москвы и Московской области (Калякин и др., 2023). В списке указан статус видов для центральной Мещёры.

Малая поганка (*Tachybaptus ruficollis*). Очень редкий возможно гнездящийся вид. КК МО (1 категория), КК ВО (4 категория). Токование отмечено 1.04 (BirdNET-Pi) на разливах р. Ялмы в окрестностях с. Дмитровский Погост.

Черношейная поганка (*Podiceps nigricollis*). Редкий гнездящийся вид. КК ВО (3 категория). Пролётная птица отмечена 28.04 на торфоразработках у пос. Верея; 13.08 встречена в рыбхозе «Цна». 4–5 пар достоверно гнездятся на болоте Зиборова, пара птиц встречена на оз. Сольвейг.

Красношейная поганка (*P. auritus*). Редкий пролётный, очень редкий гнездящийся вид. КК МО (1 категория), КК ВО (1 категория). Пролётная птица отмечена 4.05 на оз. Свиношном; 1–2 пары достоверно гнездятся на болоте Зиборова, также встречена пара птиц на оз. Сольвейг (см. статью на с. 43).

Серощёкая поганка (*P. grisegena*). Редкий пролётный, очень редкий возможно гнездящийся вид. КК МО (1 категория). Взрослая птица держалась с 6 по 28.05 в рыбхозе «Цна».

Большой баклан (*Phalacrocorax carbo*). Немногочисленный пролётный и летующий вид. Летующие птицы регулярно встречаются на прудах рыбхоза «Цна».

Волчок (*Ixobrychus minutus*). Редкий гнездящийся вид. КК МО (3 категория), КК ВО (4 категория). С помощью устройств пассивного акустического мониторинга зарегистрированы позывки на торфоразработках к востоку от оз. Мёртвого 5.07 и на заболоченном участке в Черустином лесу 19.07. Возможно, стоит предполагать гнездование вида на Туголесской озёрно-болотной системе.

Большая белая цапля (*Ardea alba*). Относительно обычный пролётный и летующий, редкий гнездящийся вид. Зарегистрирована 22.06 у оз. Дубового (Мария

Сырцова, inaturalist.org); 6 и 12.07 в пойме р. Ялмы в окрестностях с. Дмитровский Погост; 27.07 отмечена на оз. Святом Клепиковской озёрной системы. С мая по август птицы также встречались в рыбхозе «Цна».

Белый аист (*Ciconia ciconia*). Редкий пролётный вид. КК МО (5 категория), КК ВО (1 категория). Над полем между пос. Черусти и пос. Пустоша 18.05 наблюдали 3 птиц, вероятнее всего, кочующих.

Лебедь-шипун (*Cygnus olor*). Редкий пролётный, очень редкий гнездящийся вид. КК ВО (1 категория). Встречен в рыбхозе «Цна» 30.03.

Серая утка (*Mareca strepera*). Немногочисленный гнездящийся вид. КК МО (3 категория), КК ВО (4 категория). Пару видели 17.05 на оз. Свиношном М. и У. Пахлевановы (ru-birds.org); 22.06 несколько пар с выводками отмечены на оз. Дубовом; 6.07 выводок на Шатурторфских торфоразработках. Также гнездится в рыбхозе «Цна».

Связь (*M. penelope*). Обычный пролётный, редкий гнездящийся вид. На пролёте встречается повсеместно на озёрах и обводнённых торфоразработках. На оз. Глушице в пойме р. Клязьмы отмечена 3.05; 6.05 пару видели в рыбхозе «Цна»; 22.06 — пару на оз. Дубовом.

Шилохвость (*Anas acuta*). Обычный пролётный, очень редкий гнездящийся вид. КК МО (1 категория). На пролёте встречена на оз. Дубовом 16 и 22.03; на оз. Сольвейг — 30.03; 4.04 — на торфоразработках у пос. Северная Грива (Игорь Васильев, inaturalist.org). Пара, по-видимому, пролётных птиц отмечена 26.04 на оз. Филинском.

Красноголовый нырок (*Aythya ferina*). Относительно обычный гнездящийся вид. Пара встречена на оз. Свиношном 18.05; где 3.07 М. и П. Пахлевановы отметили выводок (ru-birds.ru). На болоте Зиборова пару видели 28.05, а 24.06 там же отмечен выводок. На Шатурторфских торфоразработках выводки зарегистрированы 6.07.

Хохлатая чернеть (*A. fuligula*). Относительно обычный гнездящийся вид. Пару наблюдали на оз. Свиношном 4 и 22.05; там же 3.07 видели выводок (М. и П. Пахлевановы, ru-birds.ru). На оз. Сольвейг пары отмечены 28.05 и там же выводки 29.06. Возможное гнездование отмечено на оз. Дубовом 22.06.

Гоголь (*Bucephala clangula*). Относительно обычный гнездящийся, немногочисленный зимующий вид. На зимовке зарегистрирован на р. Клязьме 2–7.02 (BirdNET-Pi).

Пара встречена на р. Клязьме 3.05; 29.06 пары на оз. Сольвейг. Выводки отмечены в рыбхозе «Цна» 28.05, а на Губинских торфоразработках 8.06; 12.07 выводок на оз. Филинском.

Луток (*Mergellus albellus*). Редкий пролётный вид. Встречен на оз. Филинском 29.03. В апреле, мае и августе одиночных птиц наблюдали в рыбхозе «Цна».

Большой крохаль (*Mergus merganser*). Редкий пролётный, очень редкий гнездящийся вид. КК ВО (1 категория). Пара, по-видимому, пролётных птиц встречена на оз. Острец 24.03.

Длинноносый крохаль (*M. serrator*). Редкий пролётный вид. Встречен в рыбхозе «Цна» 6.05.

Скопа (*Pandion haliaetus*). Редкий пролётный, очень редкий, возможно гнездящийся вид. КК МО (1 категория), КК ВО (1 категория). Одиночных птиц регистрировали на торфоразработках у Северной Гривы 6.05 (Игорь Васильев, inaturalist.org) и над оз. Святым

в черте г. Шатуры 10.05 (Д. Асоцкий, ru-birds.ru). Также кормящаяся птица отмечена над прудами рыбхоза «Цна» 13.08.

Осоед (*Pernis apivorus*). Относительно обычный гнездящийся вид. КК МО (3 категория). На изучаемой территории встречается регулярно, преимущественно в смешанных лесах: 9.05 в Черустином лесу (А. Баранова, Д. Губер, ru-birds.ru); 16.06 брачные крики в лесном массиве к юго-западу от г. Рошалья (BirdNET-Pi); 3.07 в подходящем для гнездования биотопе в окрестностях пос. Туголесский Бор (М. и П. Пахлевановы, ru-birds.org); 19.07 тревожные крики и 21.07 пара в лесном массиве к югу от д. Тюрвищи (В. Русол, ru-birds.org).

Полевой лунь (*Circus cyaneus*). Немногочисленный гнездящийся вид. КК МО (3 категория), КК ВО (2 категория). На пролёте отмечен 29.03 у д. Кулаковки; 26.04 — в подходящем для гнездования биотопе у оз. Филинского, а 6 и 8.09 у д. Тельмы.

Луговой лунь (*C. pygargus*). Немногочисленный гнездящийся вид. КК МО (3 категория). 17.05. и 3.07 пару видели у д. Васюковки, Шатурский ГО (М., У. и П. Пахлевановы, ru-birds.ru); 25.05 пара отмечена к северу от д. Губино; 28.05 у д. Тельмы; 1.06 у д. Жохово, 15.08 там же (fikus836, inaturalist.org); 22.06 самка у оз. Дубового.

Змееяд (*Circaetus gallicus*). Очень редкий гнездящийся вид. КК МО (0 категория), КК ВО (1 категория). 18.04 одиночная птица летела над лесом у Губинских торфоразработок; 23.06 одного видели в пойме р. Клязьмы (Natalia Melnikova, inaturalist.org); 3.07 — в окрестностях пос. Туголесский Бор (М. и У. Пахлевановы, ru-birds.ru); 6.09 одиночная птица пролетела над д. Тельма.

Большой подорлик (*Clanga clanga*). Редкий гнездящийся вид. КК МО (1 категория), КК ВО (2 категория). 22.06 пара держалась на острове на оз. Дубовом; 6.09 одиночная птица кормилась на поле у д. Тельмы; 7.09 пролетел над д. Старо-Черкасово.

Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*). Очень редкий гнездящийся, немногочисленный зимующий вид. КК МО (1 категория), КК ВО (1 категория). На зимовке отмечен в дельте р. Бужа 26.01 (В. Русол, ru-birds.ru) и в пойме р. Клязьмы 4, 9 и 15.02.

Отдельные птицы встречаются на всей изучаемой территории, в основном у крупных водоёмов. Птиц регулярно отмечали в пойме р. Клязьмы и в рыбхозе «Цна»; 19.03 у д. Губино (М. Пахлеванова, ru-birds.ru); 20.04 над оз. Муромским (Виктория, inaturalist.org); 22.06 пару видели над оз. Дубовым.

Чёрный коршун (*Milvus migrans*). Обычный гнездящийся вид. КК МО (5 категория). Встречается практически повсеместно на открытых местах. Гнездование вероятно в пойме р. Клязьмы, в рыбхозе «Цна», в окрестностях оз. Свиношного; 22.06 не менее трёх пар видели на оз. Дубовом.

Глухарь (*Tetrao urogallus*). Относительно обычный гнездящийся и зимующий вид. Регистрируется как визуально, так и по следам пребывания (помёт, перья и т.д.). На зимовке неоднократно отмечен в лесных массивах надпойменных террас р. Клязьмы в окрестностях пос. Мишеронский, пос. Бакшеево и д. Жохово. Также отмечен 9.02 в лесном массиве у д. Заполицы (А. Баранова, Д. Губер, А. Кац, ru-birds.ru) и 27.02 в Черустином лесу (В. Белинский, ru-birds.ru).

Следы пребывания найдены 2.03 в лесах у д. Петрушино и д. Заполицы (В. Русол, А. Баранова, Д. Гу-



Серый журавль у с. Пышлицы, 7.09.2025 г. Фото: М. Невский

бер, М. Петрова, ru-birds.ru); 1.04 самка отмечена у д. Филиппово (Игорь Васильев, inaturalist.org); 4–5 и 13.04 несколько вокализирующих птиц встречены у пос. Красная гора; 26.04 несколько птиц у пос. Туголесский Бор (М. и У. Пахлевановы, ru-birds.ru). В гнездовой период также регулярно встречается в лесном массиве у пос. Северная Грива. Подтверждённое гнездование (скорлупа яиц) зафиксировано 2.05 в окрестностях пос. Бакшеево.

Перепопел (*Coturnix coturnix*). Относительно обычный гнездящийся вид. 27.05 токование слышали в долине р. Люблевки у рыбхоза «Цна». С конца мая по середину июня регулярно регистрировали в окрестностях пос. Черусти (BirdNET-Pi). 1.06 токование отмечено в пойме р. Клязьмы у д. Жохово; 21 и 22.06 — в полях в окрестностях оз. Дубового. В полях у д. Тельмы и с. Дмитровский Погост зарегистрирован 6 и 7.07 (BirdNET-Pi).

Серый журавль (*Grus grus*). Относительно обычный гнездящийся вид. КК МО (3 категория), КК ВО (3 категория). В лесу у оз. Острец отмечен 3.04 (И. Баженова, ru-birds.ru); 5 и 6.04 крики слышали на болотах в Черустином лесу; 27–30.04 дуэтные крики у г. Рошалья (BirdNET-Pi); 3 и 4.05 неоднократные регистрации в лесах бассейна р. Большой Ушмы; 29.06 пару видели над оз. Сольвейг; 5.07 пара встречена в Крутовском заказнике (Игорь Васильев, inaturalist.org); 26.07 отмечены крики у оз. Мёртвого (BirdNET-Pi). Гнездовая группировка лесоболотного комплекса крайнего востока области, по-видимому, является самой многочисленной в Московской области.

Также в гнездовой период регулярно отмечен на полях у д. Тельмы и с. Дмитровский Погост; 15 и 24.08 несколько птиц встречены в пойме р. Клязьмы у д. Жохово (fikus836, inaturalist.org). Самые многочисленные осенние предотлётные скопления формируются на полях у с. Пышлицы (фото), где 6–08.09 отмечены от 130 до 220 птиц.

Водяной пастушок (*Rallus aquaticus*). Относительно обычный гнездящийся вид. КК МО (3 категория), КК ВО (4 категория). Регистрируется в основном по голосу: 29–30.03 брачные крики в пойме р. Ялмы у с. Дмитровский Погост (BirdNET-Pi); 13.04 на низовом болоте в Черустином лесу; 3 и 04.05 на старицах р. Клязьмы к юго-западу от д. Жохово и на оз. Кендур (BirdNET-Pi); 17.05 в Крутовском заказнике (И. Чуглаев, ru-birds.ru); 22.06 брачные крики не менее 5 самцов на оз. Дубовом; 24.07 на оз. Святом Клепиковской озёрной системы (BirdNET-Pi).

Золотистая ржанка (*Pluvialis apricaria*). Немногочисленный пролётный вид. 26.04 отмечена на полях у с. Пышлицы (veb74, inaturalist.org).

Малый зуёк (*Charadrius dubius*). Немногочисленный гнездящийся вид. Пара отмечена в рыбхозе «Цна» 28.05; 29.06 бесполое на карьерах у д. Тимонино, Орехово-Зуевский ГО.

Фи́фи (*Tringa glareola*). Очень редкий гнездящийся, редкий летующий вид. КК МО (1 категория), КК ВО (3 категория). Встречи: 6 и 28.05 пролётные птицы в рыбхозе «Цна»; 28.05 у с. Пустоша (BirdNET-Pi); 29.06 на карьерах у д. Тимонино; 6.07 в долине р. Ялмы у с. Дмитровский Погост (BirdNET-Pi). Отдельные летующие птицы встречались до конца июля.

Большой улит (*T. nebularia*). Редкий гнездящийся, относительно обычный летующий вид. КК МО (1 категория). Несколько птиц видели на лугах у д. Тельмы 26.04 (veb74, inaturalist.org). С конца апреля по середину июня зарегистрированы регулярные позывки на лугах у с. Пустоша (BirdNET-Pi). 3.05 отмечен в пойме р. Клязьмы; 3 и 04.05 в долине р. Сеньги, Крутовский заказник (А. Лисовский, ru-birds.ru); 9.05 брачные крики слышались на болоте на окраине Черустинского леса (А. Баранова, Д. Губер, ru-birds.ru); 28.05 позывки на болоте у оз. Сольвейг. Отдельные летующие птицы встречались до середины августа.

Травник (*T. totanus*). Редкий гнездящийся вид. КК МО (3 категория). Голос записан 31.03 в долине р. Ялмы у с. Дмитровский Погост (BirdNET-Pi); 6 и 28.05 встречен в рыбхозе «Цна»; 26.04 токующие пары отмечены близ д. Тельмы; 24.05 токование отмечено на лугах у с. Пустоша (BirdNET-Pi).

Поручейник (*T. stagnatilis*). Редкий гнездящийся вид. КК МО (3 категория), КК ВО (3 категория). Встречен 28.05 в рыбхозе «Цна».

Щёголь (*T. erythropus*). Редкий пролётный вид. Встречен 6 и 28.05 в рыбхозе «Цна».

Мородунка (*Xenus cinereus*). Редкий гнездящийся вид. КК МО (2 категория), КК ВО (3 категория). Токование отмечено 26.04 на торфоразработках у д. Филипповской; 28.05 токование в рыбхозе «Цна», там же 21.06 встречена пара птиц в подходящем для гнездования биотопе (nosenco_av, inaturalist.org); 7.07 зарегистрирован в долине р. Ялмы у с. Дмитровский Погост (BirdNET-Pi).

Дупель (*Gallinago media*). Редкий гнездящийся вид. КК МО (1 категория). Токование отмечено 21.05 на лугу у д. Бекетовской.

Большой кроншнеп (*Numenius arquata*). Редкий гнездящийся вид (см. обзорную статью Зубакина и др., 2024). КК МО (1 категория), КК ВО (3 категория). Позывки над Черустиным лесом зарегистрированы 13.04; токование на торфоразработках у пос. Северная Грива 24.04 (Игорь Васильев, inaturalist.org). Токующая пара встречена близ д. Тельмы 26.04, там же отмечен 26.07 (BirdNET-Pi). В июне неоднократно встречался на полях у д. Зименки, ГО Шатура; 22.06 группа птиц отмечена над оз. Дубовом (Мария Сырцова, inaturalist.org); 9.07 регистрации в долине р. Ялмы у с. Дмитровский Погост (BirdNET-Pi).

Большой веретенник (*Limosa limosa*). Редкий гнездящийся вид. КК МО (1 категория), КК ВО (3 категория). Токующие пары отмечены 26.04 близ д. Тельмы; 21.05 пара на лугу у д. Бекетовской; 22.06 группа птиц над оз. Дубовом (Мария Сырцова, inaturalist.org).

Малая чайка (*Hydrocoloeus minutus*). Редкий гнездящийся вид. КК МО (1 категория), КК ВО (3 катего-

рия). Встречена в рыбхозе «Цна» 6.05; 18.05 отмечена на оз. Свиношном.

Серебристая чайка (*Larus argentatus*). Обычный пролётный, редкий гнездящийся вид. Встречена на оз. Дубовом 16 и 22.03. В течение всего сезона отмечены регулярные встречи в рыбхозе «Цна». Гнездование подтверждено на Губинских торфоразработках.

Хохотунья (*L. cachinnans*). Редкий пролётный и гнездящийся вид. Встречена на оз. Дубовом 22.03. В течение всего сезона регулярно встречалась в рыбхозе «Цна». Гнездование подтверждено на Губинских торфоразработках; 6.07 отмечен выводок на Шатурторфских торфоразработках. Подробнее см. статью М.А. Шведко (2025).

Белокрылая крачка (*Chlidonias leucopterus*). Редкий гнездящийся вид. КК МО (2 категория), КК ВО (2 категория). В 2024 г. была обнаружена крупная колония в дельте р. Бужи и на оз. Святом (Нецветаев, Ровинский, 2024). Не менее 10 гнездящихся пар отмечены на оз. Дубовом 21.05, 28.05 и 22.06. Птицы гнездились отдельными группами по 1–3 пары. Также встречены 22.06 на оз. Святом Клепиковской озёрной группы (ytro_sedoe, inaturalist.org).

Белощёкая крачка (*Ch. hybrida*). Редкий гнездящийся вид (Шведко, 2020). КК МО (1 категория). Встречена в рыбхозе «Цна» 6.05; 19.05 на торфоразработках у д. Филиппово (Игорь Васильев, inaturalist.org). 28.05 и 22.06 10–20 гнездящихся пар отмечены на оз. Дубовом (фото). Также встречены 22.06 на оз. Святом Клепиковской озёрной системы (ytro_sedoe, inaturalist.org).

Клинтух (*Columba oenas*). Немногочисленный гнездящийся вид. КК МО (2 категория), КК ВО (3 категория). Пара птиц встречена 21.03 у д. Ново-Черкасово, ГО Шатура; 29.03 отмечено токование в лесном массиве у с. Дмитровский Погост (А. Меркулова, inaturalist.org).

Кольчатая горлица (*Streptopelia decaocto*). Редкий возможно гнездящийся вид. Токование отмечено 24.07 у базы «Коренец» на оз. Святом Клепиковской озёрной системы (BirdNET-Pi); 13.08 одиночную птицу видели в д. Суханово, Егорьевский ГО (фото).

Сплюшка (*Otus scops*). Очень редкий возможно гнездящийся вид. КК МО (3 категория), КК ВО (4 категория). Токование зарегистрировано 9.06 в окрестностях г. Рошала (BirdNET-Pi).

Мохноногий сыч (*Aegolius funereus*). Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид. Токование отмечено 16 и 17.02 в Крутовском заказнике (BirdNET-Pi). Молодая птица сфотографирована в окрестностях пос. Северная Грива (annlion, inaturalist.org).

Воробьиный сычик (*Glaucidium passerinum*). Относительно обычный гнездящийся и зимующий вид. Вероятно, гнездится на террасах р. Клязьмы: токование отмечали в течение всего февраля на левом берегу (BirdNET-Pi), кроме того, 3.05 в сумерках самец вокализировал в лесном массиве к северу от пос. Мишеронский. Токование также отмечено в Черустином лесу 17 и 18.03 (BirdNET-Pi).

Ястребиная сова (*Surnia ulula*). Очень редкий возможно гнездящийся вид. КК МО (1 категория), КК ВО (4 категория). Токование отмечено 23.08 в хвойном лесу в Крутовском заказнике (А. Лисовский, ru-birds.ru).

Длиннохвостая неясыть (*Strix uralensis*). Относительно обычный гнездящийся и зимующий вид. КК МО (5 категория). На левом берегу р. Клязьмы по голо-су отмечена 11–12.02 и 22.02. Самец токовал 17–18.03 в лесном массиве к востоку от пос. Рязановский, 18.03



Белощёкая крачка на оз. Дубовом, 28.05.2025 г.

Фото: М. Невский



Кольчатая горлица в д. Суханово, 13.08.2025 г.

Фото: С. Симонов

также отмечено токование в Черустином лесу (BirdNET-Pi). В лесном массиве к северу от пос. Мишеронский 4.05 авторы наблюдали пару неясителей у гнезда, в тот же день одиночная птица отмечена в Крутовском заказнике (А. Лисовский, ru-birds.ru).

Зимородок (*Alcedo atthis*). Редкий гнездящийся вид. КК МО (1 категория), КК ВО (3 категория). Авторами 3.05 отмечена пара зимородков, посещающих место гнездования на правом берегу р. Клязьмы.

Золотистая щурка (*Merops apiaster*). Очень редкий гнездящийся вид. КК ВО (3 категория). Средствами пассивного акустического мониторинга зарегистрирована 24.05 в окрестностях с. Дмитровский Погост и 29.05 к югу от с. Пустоша.

Удод (*Upupa epops*). Редкий гнездящийся вид. КК МО (3 категория). 29.05 отмечен в окрестностях д. Ворovo (sofronov_alexey, inaturalist.org).

Зелёный дятел (*Picus viridis*). Относительно обычный гнездящийся и зимующий вид. КК МО (2 категория), КК ВО (3 категория). Регулярно встречается в окрестностях рыбхоза «Цна», в долине р. Клязьмы и р. Большой Ушмы.

Седой дятел (*P. canus*). Обычный гнездящийся и зимующий вид. КК МО (5 категория), КК ВО (5 категория). Встречается повсеместно на изучаемой территории.

Средний пёстрый дятел (*Dendrocopos medius*). Редкий гнездящийся и зимующий вид. КК МО (3 категория), КК ВО (4 категория). Средствами пассивного акустического мониторинга зарегистрирован 6, 11 и 12.02 на левобережье р. Клязьмы.

Трёхпалый дятел (*Picoides tridactylus*). Редкий гнездящийся вид. КК МО (1 категория), КК ВО (3 категория). Неоднократно отмечен в лесном массиве севернее пос. Мишеронский — 3 и 07.05 зафиксирована характерная дробь в окрестностях оз. Кендур (BirdNET-Pi); 5.07 авторами встречена пара и, возможно, молодая птица в 5,5 км от озера. В Черустином лесу одиночных птиц наблюдали 27.02 (В. Белинский, ru-birds.ru) и 28.05. Также известны единичные встречи вне вышеперечисленных локаций.

Лесной жаворонок (*Lullula arborea*). Относительно обычный гнездящийся вид. КК МО (1 категория), КК ВО (3 категория). Характерные биотопы — молодые сосняки, вырубки и залежи, зарастающие сосной. Весной и летом 2025 г. отмечены неоднократные встречи в окрестностях пос. Новый Снопок. Пение также слышали 21.03 на верховом болоте к востоку от пос. Рязановский (BirdNET-Pi), 6.05 в окрестностях рыбхоза «Цна» и 18–20.05 на пустошах к западу от с. Дмитровский Погост.

Луговой конёк (*Anthus pratensis*). Относительно обычный пролётный, очень редкий гнездящийся вид. КК МО (2 категория), КК ВО (3 категория). Отмечен по голосу 5.04 в окрестностях д. Филиппово; 4.05 поющую птицу наблюдали на левом берегу р. Клязьмы к востоку от пос. Городищи (И. Баженова, ru-birds.ru).

Серый сорокопуд (*Lanius excubitor*). Относительно обычный пролётный и зимующий, редкий гнездящийся вид. КК МО (3 категория), КК ВО (3 категория). Наиболее высокая плотность гнездования вида в Московской обл. наблюдается именно на территории Мещёрской низменности. В пойме р. Клязьмы к югу от д. Жохово 3.05 наблюдали одиночного сорокопуда в подходящем биотопе, 1.06 там же отмечена пара; 25.06 в окрестностях пос. Авсюнино встречен нераспавшийся выводок из 6 молодых птиц. Также 3.07 слётки встречены на рубках к северо-востоку от пос. Новый Снопок.

Кедровка (*Nucifraga caryocatactes*). Редкий возможно гнездящийся вид. КК МО (3 категория), КК ВО (4 категория). Возможно гнездование в лесном массиве к востоку от д. Войнова-Гора, отмечены 10 и 11.05 у оз. Горбатого (В. Русол, ru-birds.ru). Кочующие птицы встречены 9.02 на левом берегу Клязьмы к западу от д. Жохово и 16.08 у оз. Сольвейг (Д. Губер, А. Кац, А. Баранова, ru-birds.ru, eBird.org).

Соловьиный сверчок (*Locustella luscinioides*). Редкий гнездящийся вид. КК ВО (4 категория). Несколько пар гнездятся в тростниковых зарослях на затопленных торфоразработках к югу от пос. Шатурторф, 6.07 там отмечено пение. Средствами пассивного акустического мониторинга отмечено пение 6.07 в пойме р. Ялмы и 20.07 на берегу оз. Дубового.

Обыкновенный сверчок (*L. naevia*). Редкий гнездящийся вид. КК ВО (5 категория). Пение слышали 12.06 у д. Васютино, Орехово-Зуевский ГО; 6.07 в полях у д. Парфеновской, ГО Шатура.

Индийская камышевка (*Acrocephalus agricola*). Очень редкий вероятно гнездящийся вид. Пара птиц отмечена в рыбхозе «Цна» 28.05.

Тростниковая камышевка (*A. scirpaceus*). Очень редкий гнездящийся вид. КК ВО (4 категория). Поющий самец встречен в рыбхозе «Цна» 28.05.

Мухоловка-белошейка (*Ficedula albicollis*). Редкий возможно гнездящийся вид. КК ВО (4 категория). Ближайшее место подтверждённого гнездования — Дединово-Белоомутская пойма р. Оки. Авторами 3.05 (фото) отмечено пение нескольких птиц в дубравах левобережья р. Клязьмы (Собинский р-н, Владимирская



Мухоловка-белошейка в пойме р. Клязьмы, 3.05.2025 г.

Фото: В. Нецветаев



Ремез подвида *R. p. caspius* у д. Погостище, 21.05.2025 г.

Фото: М. Невский

обл.) и 4.05 пение в берёзовом лесу в долине р. Большой Ушмы (Петушинский р-н, Владимирская обл.).

Горихвостка-лысушка (*Phoenicurus phoenicurus*). Относительно обычный гнездящийся вид. Поющие птицы отмечены у д. Тимонино 26 и 29.06; в лесном массиве близ оз. Сольвейг 28.05, в течение второй половины весны и начала лета у пос. Туголесский Бор (М., У. и П. Пахлевановы, Д. Губер, А. Кац, ru-birds.ru), 6 и 28.05 у рыбхоза «Цна».

Ремез (*Remiz pendulinus*). Немногочисленный гнездящийся вид. КК МО (5 категория), КК ВО (4 категория). В Мещёрской низменности распространён sporadично, ассоциирован с крупными водоёмами. Гнездование отмечено в рыбхозе «Цна» 28.05. Пение слышали на оз. Свиношном (М. и У. Пахлевановы, ru-birds.ru). На берегу оз. Дубового 21 и 28.05 отмечен поющий самец подвида *R. p. caspius* (фото), 22.06 там же наблюдали молодых птиц (ytro_sedoe, inaturalist.org).

Хохлатая синица (*Lophophanes cristatus*). Обычный гнездящийся вид. Ассоциирован с хвойными лесами, преимущественно сосновыми. В осенне-зимний период нередко встречается в смешанных стаюках с другими синицами.

Юрок (*Fringilla montifringilla*). Обычный пролётный, очень редкий возможно гнездящийся вид. КК ВО (4 категория). Поющие самцы отмечены 2.05 в хвойном лесу к северу от пос. Бакшеево.

Обсуждение

К настоящему времени большая часть Орехово-Зуевского, Егорьевского и Шатурского городских округов Московской обл. и Петушинского, Собинского, Гусь-Хрустального районов Владимирской обл. изучены удовлетворительно. Тем не менее, важно продолжать постоянные наблюдения на этих территориях для выявления полного состава авифауны и мониторинга динамики численности видов птиц.

Благодарности

Авторы благодарны М.В. Калякину, О.В. Волцит и Кс.П. Семёновой за руководство, помощь и координацию Программы «Птицы Москвы и Подмосковья». Также мы благодарим всех наблюдателей, чьи данные были использованы в этой работе.

Литература

- Ананьева С.И., Бабкина Н.Г., Бабушкин Г.М., Барановский А.В., Запаринный И.В., Иванчев В.П., Лобов И.В., Марочкина Е.А., Митин Е.И., Сальников С.В., Фиолина Е.А., Хлебосолов Е.И., Хлебосолова О.А., Чельцов Н.В., Шемякина О.А. 2008. Птицы Рязанской Мещеры. Под ред. Е.И. Хлебосолова. Рязань, 208 с.
- Зубакин В.А., Свиридова Т.В., Шведко М.А., Ерёмкин Г.С., Шамина К.Ю. 2024. Современное распространение и численность большого кроншнепа *Numenius arquata* в Московской области: итоги инвентаризации мест гнездования вида в 2022-2023 гг. — Рус. орнитол. журн, 33 (2449): 3636–3651.
- Калякин М.В., Волцит О.В., Конторщиков В.В., Зубакин В.А., Морковин А.А. 2023. Аннотированный список видов птиц Москвы и Московской области. М., 60 с.
- Калякин М.В., Шариков А.В., Мосалов А.А., Быков Ю.А., Волцит О.В., Гринченко О.С., Зубакин В.А., Иванчев В.П., Конторщиков В.В., Косенко С.М., Костин А.Б., Кошелев Д.В., Кузнецов А.В., Мельников В.Н., Мищенко А.Л., Недосекин С.В., Романов В.В., Свиридов Д.А., Свиридова Т.В., Сергеев М.А., Суханова О.В., Те Д.Е., Фиолина Е.А., Чудненко Д.Е., Швецов О.В. 2025. Редкие виды птиц Центрального Нечерноморья: состояние на 2024 год. — Орнитология, 49: 174–185.
- Красная книга Владимирской области. 2018. Тамбов, 428 с.
- Красная книга Московской области. Издание третье, переработанное и дополненное. 2018. Московская область, 810 с.
- Мучник Е.Э., Конорева Л.А., Казакова М.В., Соболев Н.А. 2019. Лихенобиота национальных парков «Мещера» (Владимирская область, Россия) и «Мещерский» (Рязанская область, Россия). — Nature Conservation Research. Заповедная наука, 4 (1): 64–82.
- Невский М.А., Нецветаев В.А., Ровинский А. 2024. Опыт орнитологического обследования Мещеры. — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 40: 13–17.
- Нецветаев В.А., Ровинский А. 2024. О гнездовании белокрылой крачки в нижнем течении р. Бужи. — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 40: 42–43.
- Сажнев А.С., Лычковская И.Ю. 2024. Влияние речных разливов на формирование сообществ хортобионтных жесткокрылых (Coleoptera) пойменных лугов юго-востока Мещерской низменности (Рязанская область, Россия). — Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смирновича. Вып. 35. С. 5–22.
- Шведко М.А. 2020. О гнездовании белошёртой крачки в Московской области в 2020 году. — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 32: 47–48.
- Шведко М.А. 2025. Гнездование хохотуньи *Larus cachinnans* в Московской области и ее современный статус в регионе. — Рус. орнитол. журн., в печати

Владимир Андреевич Нецветаев, tsvetkov1741@gmail.com

Михаил Андреевич Невский, Илья Иванович Уколов, Сергей Борисович Симонов, Александр Валентинович Сазонов, Мария Алексеевна Шведко



Гнездование вяхиря на Воробьёвых горах в Москве

Николай Морозов, Григорий Александренков, Ксения Колтышева

В Западной и Центральной Европе вяхирь (*Columba palumbus*) давно стал олицетворением процесса синантропизации диких видов птиц. Он сильно выиграл от соседства своих исконных лесных местообитаний с пахотными землями, особенно с посевами зерновых культур, гороха, рапса и подсолнечника, а также от посадки искусственных лесополос в безлесных ландшафтах. К тому же во 2-й четверти XIX века в Западной Европе (есть основания предполагать, что в Париже) впервые было зафиксировано гнездование этого вида в городских лесных массивах, которое явилось предвестием масштабного, продолжающегося до сих пор процесса освоения им городов в пределах значительной части гнездового ареала. В ходе процесса, именуемого синурбизацией, многие городские популяции со временем достигали повышенной плотности гнездования (по сравнению с загородными лесными ландшафтами) и обретали другие специфические черты, например, склонность некоторой части пар гнездиться на зданиях (Tomiałojć, 1976). Однако, что касается биотопического распределения в гнездовой период на территории Советского Союза, в отечественных сводках XX века вяхиря продолжали характеризовать как настоящую лесную птицу (Мекленбурцев, 1951; Мальчевский, Пукинский, 1983; Котов, 1993 и др.). Начало синурбизации в европейской части СССР — в посёлках Калининградской обл. (Лыков, 2009; Астафьева и др., 2011; Лыков и др., 2012), в Горном Крыму (Костин, 2020), Черновцах (Скильский и др., 1997), Бресте (Шокало С., Шокало Б., 1992, приводится по: Сахвон, Гричик, 2022), Воронеже (Нумеров и др., 2013) и, возможно, Белгороде (Лыков, 2025) — датируется серединой или концом 1980-х гг., если не считать случаи гнездования в ещё более ранние десятилетия (Астафьева и др., 2011).

В основном заселение вяхирем городов Калининградской обл. началось, по-видимому, в 1990-е гг. (центральной части Калининграда — с 1990 г., Светлогорска, по всей видимости, раньше) (Лыков, 2009; Астафьева и др., 2011; Астафьева, Гришанов, 2012; Лыков, Гришанов, 2018), Украины (вслед за западом страны, также центральных и восточных областей, например, Киевской обл., в частности, самого Киева) (Скильский и др., 1997; Сеник, Хорняк, 2003; Редчук, Костюшин, 2011; Шупова, 2020) и европейской части России помимо Калининградской обл. (южнее 55 параллели, см. ниже) — со 2-й половины 1990-х или в 2000-е гг., Беларуси (вслед за крайним западом страны, также центральных областей) — с конца 2000-х до начала 2010-х гг. (Bea et al., 2011; Сахвон, 2016; Sakhvon, Kövér, 2020; Сахвон, Гричик, 2022). Процесс протекал, по-видимому, с разной скоростью в разных регионах, интенсивнее всего — в Калининградской обл., где вяхирь освоил не только Калининград (Лыков, 2009; Астафьева и др., 2011; Лыков, Гришанов, 2018; Гришанова и др., 2020), но и многие другие города (Астафьева, Гришанов, 2012). В Беларуси вплоть до конца 2000-х гг. наблюдалось лишь постепенное увеличение численности вяхиря в Бресте и Гродно, но затем «ареал» городских группировок стал довольно быстро расширяться на восток (Bea et al., 2011; Сахвон,

2016; Sakhvon, Kövér, 2020; Сахвон, Гричик, 2022). К концу 2000-х гг. восточная граница распространения «сверхплотных» городских популяций вяхиря в Прибалтийском регионе проводилась вдоль западных границ Литвы, Беларуси и Украины (Ольштын, Варшава, Калининград, Брест, Львов, Черновцы), тогда как в Клайпеде, Каунасе, Вильнюсе, Риге, Минске, Гродно, Несвиже и Киеве наблюдалась начальная стадия синурбизации (Bea et al., 2011). Однако в Беларуси уже к середине 2010-х гг. границу распространения хорошо сформировавшихся группировок вяхиря стало возможным проводить ещё приблизительно на 300 км восточнее — по линии Гродно, Лида, Минск, Борисов, Барановичи, Житковичи, Столин (Сахвон, 2016). К 2021 г. городские группировки вяхиря не были обнаружены только на северо-востоке Беларуси, в частности, в Витебске и Могилёве (Сахвон, Гричик, 2022).

До 2000-х–2010-х гг. в большинстве областей европейской части России (кроме Калининградской) вяхирь редко гнезвился или не гнезвился в экологических границах городов. В северных и восточных областях в гнездовой период он оставался лесным видом, в более южных и западных продолжал осваивать древесные насаждения в сельскохозяйственных и урбанизированных ландшафтах (Гришанов, 2020). Группировки гнездящихся птиц, находящиеся преимущественно на ранних, но также и на предпоследней, стадиях синурбизации, были обнаружены южнее 55 параллели: во Владикавказе (Белик, 2021 со ссылкой на личн. сообщ. Д.С. Шевцова), Кисловодске, Ессентуках, Железноводске (Бобенко, 2009; Маловичко и др., 2021), Краснодаре (Емтыль и др., 2011; Лыков, 2024), Белгороде (Лыков, 2025), Боброве (Соколов, 2012), Воронеже (Нумеров и др., 2013), Орле (Свиридов, 2023; Лыков, Свиридов, 2024), Туле (Самойлова, Аралов, 2021), Рязани (Барановский, Иванов, 2016), Самаре (Павлов и др., 2024) и Ульяновске (Москвичёв, 2024). За исключением Воронежа (Нумеров и др., 2013) и Белгорода (Лыков, 2025), во всех этих городах они начали формироваться в 2000-е или 2010-е гг. Вероятно, синурбизация вида началась и в ряде других городов, например, в Брянске и Калуге (вряд ли раньше 2010-х гг., см. Bea et al., 2011; Лыков, 2021). Признаки начала синурбизации были отмечены также в восточной части ареала номинативного подвида — в Зауралье (Галишева, 2010; Гашек, Попов, 2022) и на юге Западной Сибири (Свириденко, 2024). В странах Средней Азии, где гнездится другой подвид *C. p. casiotis*, также зафиксировано начало этого процесса (Карпов, Березовиков, 1994; Митропольский, 2008).

В Подмоскovie с давних пор вяхирь был обычен (хотя Е.С. Птушенко и А.А. Иноземцев (1968) отмечали сокращение его численности к 1940-м гг.), но в самой Москве как гнездящийся вид — очень редок, а в некоторые десятилетия отсутствовал, хотя продолжал встречаться на пролёте (Птушенко, Иноземцев, 1968; Благосклонов, 1976; Самойлов, Морозова, 2001; Ерёмкин, 2004; Атлас птиц Москвы и Подмоскovie, 2006; Атлас птиц города Москвы, 2014; Калякин, Волцит, 2022а). К.Н. Благосклонов (1976) констатировал, что с середины 1960-х

гг. вяхирь стал появляться в парках Москвы чаще, чем в предшествующие десятилетия, когда он был очень редок даже на её окраинах, и связывал это с увеличением численности вида в Подмоскovie. В дальнейшем в некоторых местах на территории столицы, в основном на её периферии, например, в Битцевском лесу и Кунцевской даче, гнездились отдельные пары, однако широкого освоения вяхирем древесных насаждений города не произошло (Самойлов, Морозова, 2001). Главным препятствием могло стать формирование в Москве в 1960-е и в начале 1970-х гг. многочисленной городской популяции серой вороны (*Corvus cornix*), а в период с конца 1970-х до начала 1990-х гг. также группировки тетеревиатника (*Accipiter gentilis*). С другой стороны, в Калининграде городские популяции серой вороны и сороки (*Pica pica*) не смогли воспрепятствовать быстрому формированию внушительной популяции вяхиря, которое произошло в 1990-е–2000-е гг., после ~70-летнего периода его начальной синантропизации на окружающих город территориях (Астафьева и др., 2011; Лыков, Гришанов, 2018). Довольно высокая облесённость Московской обл., невысокая плотность гнездования вида в Подмоскovie и застройка пахотных земель вблизи Москвы, наконец, отдалённость от городских популяций в Центральной Европе также не благоприятствовали активному освоению этим голубем столицы (о значении этих и других факторов в заселении вяхирем разных городов см. Tomiałojć, 1976, 1999; Астафьева, Гришанов, 2012; Fey et al., 2015).

До 2022 г. прямых доказательств гнездования вяхиря на территории внутри Московской кольцевой автодороги (МКАД) не появлялось на протяжении 34 лет. Последние случаи были зафиксированы в 1987 г. в Тропарёвском лесопарке и в 1983 и 1984 гг. в Алёшинском лесу (Самойлов, Морозова, 2001). Вяхирь был занесён в 1-е издание Красной книги города Москвы (далее — ККМ) (Самойлов, Морозова, 2001) в качестве исчезнувшего после 1960 г. на гнездовании вида, но исключён из 2-го её издания (Авилова и др., 2011), поскольку сведений о его гнездовании в городе в 2001–2010 гг. не поступало, а восстановление в условиях Москвы, учитывая тенденции её развития, казалось невозможным. В 3-е издание ККМ вяхирь был возвращён, главным образом, в связи с доказанным и предполагаемым гнездованием на присоединённых к Москве новых территориях, в том числе в посёлках, а также с вероятным гнездованием в 2011–2020 гг. на некоторых старых «полуостровных» территориях на северо-западе и юге города за пределами МКАД. Кроме того, 19.04.2019 г. две птицы, одна из которых недолго токовала, наблюдались, по информации А.А. Строгановой, на территории внутри МКАД — в Ландшафтном заказнике «Тёплый Стан» (Калякин, Волцит, 2022а; база данных ru-birds.ru). Одна птица провела зиму 2018/2019 гг. в Терлецком парке (Захарова, Подвинцева, 2019).

После выхода 3-го издания ККМ — с 2021 по 2025 гг. — общее число сообщений о встречах вяхиря с марта по август включительно в границах Москвы, включая ТиНАО, но также и внутри МКАД, существенно увеличилось по сравнению с предыдущим десятилетием (ru-birds.ru). Появились новые доказательства гнездования в посёлках ТиНАО примерно в 21–44 км от МКАД (например, Балаев, 2023 и ссылка на информацию С.Б. Симонова о гнездовании вяхиря в 2022 г. в селе Богоявление в Троицком АО). За пределами МКАД проникновение вяхиря в населённые пункты происходило, конечно, не только в границах Новой Москвы, но и

в Московской обл. (см. статью В.В. Конторщикова с соавторами на с. 18). Например, 15.06–13.07.2025 г. автор регулярно отмечал воркование и полёты вида посреди СНТ «Жаворонки (южное)» рядом с достраиваемым пос. Равновесие, в 390–500 м от опушки ближайшего леса, в Одинцовском ГО в 18,3 км от МКАД. В эти же сроки воркование (другой птицы?) наблюдалось и в СНТ «Жаворонки северное» по другую сторону Можайского шоссе.

Начиная с 2022 г., наряду с возросшим количеством сообщений, указывающих на возможное или вероятное гнездование, стали появляться прямые доказательства размножения вяхиря в 1–2 местах внутри МКАД ежегодно. Имеются в виду встречи слётков (информация А.В. Голубевой и В.А. Моисейкина за 2022 г. о лётном выводке, который докармливала взрослая птица, в ГБС, ru-birds.ru и фото на <https://www.inaturalist.org/observations/133118985>) или находки гнёзд (сообщения В.А. Вишневого за 2023 г. о гнезде с насиживающей птицей на территории музея-заповедника «Царицыно», ru-birds.ru; А.А. Кудрявцева и П.А. Богомазова за 2024 г. по Коломенскому, см. заметку на с. 41; И.В. Кузикова за 2025 г. о строящемся гнезде в Серебряном Бору, ru-birds.ru).

Воробьёвы горы на протяжении последних 2,5 десятиков лет не были обделены вниманием орнитологов (Конторщиков, 2009; Кадетов и др., 2010; Калякин, 2011, 2014 и др.; Новикова, 2018; Морозов, 2023; Калякин, Брунова, 2024; Н.С. Морозов, неопubl. данные за весенне-летние периоды 2000–2004, 2009–2012 и 2017–2025 гг.; Н.С. Морозов, В.В. Худяков, неопubl. данные за 2013–2016 гг.; Г.Э. Александренков, К.Д. Колтышева, неопubl. данные за 2020–2025 гг.). До 2018 г. включительно никаких оснований предполагать гнездование там вяхиря не было. Однако с 2019 г. этот вид, в том числе его воркование, ежегодно отмечали в весенне-летние периоды в северной (Ботанический сад и его окр.), а в некоторые годы и в восточной (около ГАИШ) частях территории МГУ. Сведения о встречах вяхирей в 2019 и 2020 гг. не вошли в 3-е издание ККМ (2022), поскольку были «обнародованы» несколько позже (Морозов, 2023). Подчеркнём, что вяхири поселялись в 0,3–1 км от центральной части Главного здания МГУ, не смотря на то, что на ней уже много лет (Калякин, 2011, 2014; Сорокин и др., 2011; Калякин, Волцит, 2022б), в том числе в последние годы (наблюдения авторов), живут сапсаны (*Falco peregrinus*), для которых голуби, как известно, являются излюбленной добычей.

В 2021 и 2022 гг. в Ботаническом саду МГУ (27 га) токование вяхиря неоднократно слышали в районе альпинария, а также несколько раз наблюдали птиц на пруду альпинария, где они пили воду. Недолгое воркование слышали также у фонтанов севернее Главного здания МГУ 31.05.2022 г. Наиболее поздние встречи в эти два года пришлись на 4 и 13.07.2022 г. (по одной птице, Ботанический сад). Вероятно, в период 2019–2022 гг. вяхири уже пытались гнездиться на территории МГУ или в её окрестностях.

В дальнейшем гнездование удалось доказать. Весной 2023 г. воркование и полёты вяхиря снова отмечали в Ботаническом саду МГУ и его ближайших окрестностях. По сообщению А.П. Михайленко, вяхирь летал в скверик по ул. Академика Хохлова между зданием Биологического факультета и Ботаническим садом, чтобы кормиться желудями дуба красного. А.П. Михайленко также показал нам фото «целующейся» на дереве пары вяхирей, снятое сотрудницей сада в альпинарии в 4-й или 5-й

пятнадцатидневке апреля. Кроме того, 17.04 воркование вяхири неоднократно звучало в 1,2–1,4 км юго-восточнее Ботанического сада — в глубине лесного массива ГАИШ (7,7 га). Летом 2023 г. (дату восстановить не удалось) молодая и взрослая птицы были встречены в островке леса (4,6 га) между Аллеей учёных и дендрарием Ботанического сада МГУ, где они бродили по земле.

В 2024 г. с 6.04 по 28.09 вяхирей неоднократно отмечали, по воркованию и визуально, в Ботаническом саду и в лесопарковых массивах северо-восточнее и восточнее него не далее 0,5 км. Поначалу большинство встреч приходилось на Ботанический сад (до 28.04, также 3.05). В дендрарии (9,8 га) недалеко от Университетского проспекта 7.04 на лиственных деревьях был обнаружен сначала самец, издавший воркующий звук, а затем и самка, к которой самец вскоре присоединился. Птицы сидели открыто на крупной ветви в средней части кроны и чистили оперение (17:40–18:01 и далее; есть видео), не выказывая особого беспокойства из-за присутствия человека. Позже, 27 и 28.04, пара держалась в альпинарии. Самец токовал, а самка сидела на конструкции из веток, похожей на заготовку для гнезда. «Заготовка» располагалась на сосне Коха на высоте 7,6 м, примерно в 0,5 м от ближайшего из двух стволов. Возможно, поначалу вяхири собирались здесь загнестись, но в итоге оставили это место. Судя по всему, они переместились в расположенный рядом с Ботаническим садом крупный лесопарковый массив «Большой газон МГУ» (о котором см. ниже), где то одиночных птиц, то пару наблюдали 29.04, неоднократно с 11 по 30.05, а 1 и 5.06 зафиксировали воркование, причём 1.06 — одновременно двух самцов в разных точках на расстоянии ~300 м друг от друга. В июле вяхирь был отмечен лишь раз (21.07) в Ботаническом саду, в августе и сентябре — по три раза, только одиночные птицы: 8.08 на «Большом газоне», остальные встречи (17 и 18.08, 8, 22 и 28.09) — в Ботаническом саду, в частности, 22.09 там видели молодую птицу. С октября 2024 г. до весны 2025 г. встреч вяхири не было.

В 2025 г. в Ботаническом саду МГУ и его окрестностях гнездились предположительно (как минимум) 2 пары. Первые встречи произошли 10.03: одиночный вяхирь замечен в полёте сначала примерно в 250 м северо-восточнее, а спустя 1 час над плодовым садом Ботанического сада, откуда залетел в дендрарий и уселся на дерево. Затем вяхирь отмечен в Ботаническом саду 17, 22, 23, 26 и 30.03. Воркование в первый раз было зафиксировано в дендрарии 22.03, а затем 23.03, причём во втором случае уже спустя 3–4 мин там же вяхири заметили в другом месте приблизительно в 150 м (то ли, что ворковал?), где он пил воду из частично оттаявшей лужи на дне небольшого спущенного пруда (фото 1). В период с апреля до 3.07 в Ботаническом саду и его окрестностях регулярно наблюдали по 1–2 птицы (фото 2). Воркование в апреле и мае чаще всего слышали в дендрарии, но также к востоку от Ботанического сада, на расстояниях до 500–600 м (7.05).

Кроме того, четыре раза в дендрарии видели по три птицы одновременно. Днём 11.04 они летали друг за другом. Утром 20.04 примерно в 80 м от Университетского проспекта, после недолгого воркования на дереве одной птицы, отмечены в полёте с хлопком крыльями два вяхири, вслед за которыми летел третий. В итоге две из этих трёх птиц уселись на деревья в 120–140 м друг от друга и заворковали одновременно. Позже, когда воркование прекратилось, одна из птиц улетела из

Ботанического сада за Университетский проспект. После часового перерыва один вяхирь снова заворковал в глубине дендрарии, появился оттуда в сопровождении другой птицы, затем стал один перемещаться по Ботаническому саду. Места его воркования в это утро оказались «разбросаны» на расстояния примерно до 370 м. А.П. Михайленко (личное сообщение) как-то весной видел трёх птиц, которые кормились на земле. А 5.06 друг за другом с дерева на дерево летали то ли три, то ли четыре птицы.

Там же, в дендрарии, 2.05 наблюдали вяхири, который отламывал тонкие веточки (фото 3) и носил их на высоту не менее 18 м в крону старого дуба черешчатого, растущего на краю оврага (~ 55°42'33.18" с.ш., 37°31'42.81" в.д.). Саму постройку разглядеть не удалось, информацией об итоге строительства и исходе этой попытки гнездования авторы не располагают.

Гнездо предположительно другой пары (утверждать этого нельзя, поскольку судьба гнезда в дендрарии не известна) было найдено в начале июня не в Ботаническом саду, а в сопредельном лесопарковом массиве «Большой газон МГУ» площадью ~31 га, который расположен между Университетским и Мичуринским проспектами, ул. Косыгина и Университетской площадью. В нём также отмечали вяхири, в том числе их воркование, а 3.06 ворковали одновременно два самца. В древостое этого леса, посаженного в 1950-е гг., преобладают липа мелколистная (аллеи, ряды, кольца) и клён остролистный, обычны берёза повислая и лиственница сибирская (тоже высаженные преимущественно рядами), а также тополь и ясень пенсильванский. В нижнем ярусе древостоя много клёнов остролистного и ясенелистного, а также яблони и кое-где даже груши, которые сохранились на участках прежних фруктовых садов. «Большой газон МГУ», по сути, соединяет Ботанический сад с лиственным лесом, покрывающим склон высокого правого берега р. Москвы.

Это гнездо находилось примерно в 470 м от гнезда в дендрарии, в глубине «Большого газона» (~ 55°42'41.67" с.ш., 37°32'05.06" в.д.) в липовой аллее, окаймляющей неширокую (13 м) просеку с натоптанной дорожкой и скамейками, в 50 м от большой поляны (160–170 м × 25–35 м). Оно располагалось на высоте 18,3 м на живой липе мелколистной (высотой ~22 м, диаметр ствола на ур. груди 30,5 см), в верхней половине кроны, в 1 м от несколько наклонённой в сторону просеки верхней части ствола, на почти горизонтальной, не очень толстой, искривлённой живой ветви, от которой отходят ветви 2-го порядка. Гнездо было обнаружено 2.06 (8:40–10:20) на завершающем этапе строительства. Иногда то поодаль, то неподалёку от гнездового дерева звучало воркование, время от времени были слышны хлопки крыльев и треск обламываемых веточек. Самец несколько раз отламывал сухие веточки в кронах соседних лип (фото 4), но, судя по полётам из крон к земле на расстояния в несколько десятков метров, он искал материал также на земле. До середины июля автор проверял гнездо с земли шесть раз по вечерам, но лишь 17 и 29.06 удалось застать, а точнее рассмотреть взрослую птицу на гнезде. Кроме того, 17.06 были отмечены перелёты вблизи гнездового дерева, по-видимому, обоих родителей, а 29.06 — попискивание птенцов. Разглядеть и заснять на видео по крайней мере одного из птенцов удалось 5.07 (растущие маховые, куцый хвост), а 15.07 с земли были видны один (фото 5), а в какой-то момент оба оперившихся птенца.



Фото 1. Вяхирь на дне спущенного пруда, дендрарий Ботанического сада МГУ, Воробьёвы горы, 23.03.2025 г.

Фото: Н.С. Морозов

Наблюдения за гнездом и в его окрестностях вечерами 18 и 21.07 не выявили признаков присутствия птиц. По срокам можно предположить, что это была не первая попытка гнездования этой пары в текущем году. В период наших наблюдений на Воробьёвых горах с 28.07 по 17.09 вяхири (одиночную птицу) отмечали лишь дважды, 9 и 31.08, в дендрарии Ботанического сада.

Б.Л. Самойлов и Г.В. Морозова (2001) в 1-м издании ККМ акцентировали внимание на случае гнездования вяхирей рядом с гнездом чеглоков (*Falco subbuteo*), которые обеспечивали защиту участка от ворон. В северной части территории ГАИШ 18.05.2019 г. вяхирь также ворковал недалеко от гнезда чеглока. Собственно говоря, в период 2015–2022 гг. на протяжении как минимум 7 из 8 лет (у нас недостаточно данных за 2021 г.) чеглоки поселялись на Воробьёвых горах либо на территории МГУ (успешно гнездились в лесу ГАИШ в 2017–2020 гг.), либо, видимо, северо-восточнее Университетского проспекта (в том числе, возможно, как раз на территории «Большого газона МГУ»), откуда поздно вечером, в глубоких сумерках, прилетали охотиться над плодовым садом и опушкой дендрария Ботанического сада (Морозов, 2023). В 2023 г. гнездо чеглока находилось между дендрарием Ботанического сада и Аллеей учёных МГУ — в том самом островке леса, в котором летом того же года были встречены разгуливающие молодой и взрослый вяхири (см. выше). В 2024 г. на «Большом газоне МГУ» вяхири в мае, а также 1.06 и 8.08 держались главным образом в окрестностях гнезда чеглоков. Наконец, в 2025 г. в другой части «Большого газона» успешное гнездо вяхирей также располагалось на индивидуальной территории этих соколов. Время от времени их голоса звучали во время каждого посещения наблюдателем данного места, чаще всего — в 50–200 м к северо-западу от него. Именно там, примерно в 120 м от гнезда вяхири, 14–15.06 взрослый чеглок был отмечен с добычей. Пара чеглоков продолжала беспокоиться в этом месте, по меньшей мере, до 9.08, а в целом над «Большим газоном», северной и восточной частями территории МГУ чеглоки держались как минимум до 17.09.

Склонность вяхири гнездиться «под покровительством» чеглока может быть малозаметной в средней полосе европейской части России и в других регионах вследствие факультативности этих отношений, немногочисленности обоих видов и несовпадений в их биотопических предпочтениях. Однако в западной части ареала номинативного подвида вяхири она была подтверждена



Фото 2. Пара, дендрарий Ботанического сада МГУ, Воробьёвы горы, 25.04.2025 г.

Фото: Ю.С. Канявина

более весомыми, чем указания на отдельные случаи соседства (Collar, 1978), материалами, целенаправленно собранными в Нидерландах (Bijlsma, 1984) и Северной Италии (Bogliani et al., 1992, 1999), причём в таких ландшафтах, в которых связь этого голубя с чеглоком проявляется особенно сильно. По всей видимости, гнездящиеся вяхири иногда используют в качестве «покровителей» и некоторых других хищных птиц, например, обыкновенную пустельгу (*Falco tinnunculus*) (Bang et al., 2005; Zbyryt, 2012; Мищенко и др., 2013 и др.). Вопрос о подлинности этих межвидовых ассоциаций обсуждался одним из авторов ранее (Морозов, 2002). В дальнейшем стоит обратить особое внимание на возможное значение «наличия покровителей» при выборе мест гнездования вяхирем в условиях нашего региона. Чеглок в этом качестве может быть «удобен» вяхириям в том числе поздними сроками своего размножения.

На фоне ситуации в предыдущие десятилетия, значительное число встреч вяхири в гнездовой период и ежегодные случаи гнездования внутри МКАД в последние годы (ru-birds.ru) свидетельствуют либо об увеличении численности вида в Московском регионе, либо о начале его синурбизации в Москве, либо о сочетании этих двух процессов.

Авторы выражают признательность А.П. Михайленко за сведения о встречах вяхири, Ю.С. Канявиной, Ю.В. Лебедеву, О.С. Уланцевой и М.Д. Хрисанфову за



Фото 3. Вяхирь добывает строительный материал, дендрарий Ботанического сада МГУ, Воробьёвы горы, 2.05.2025 г.
Фото: Ю.В. Лебедев



Фото 5. Оперившийся птенец вяхиря в гнезде, лесопарк «Большой газон МГУ», Воробьёвы горы, 15.07.2025 г.
Фото: Н.С. Морозов



Фото 4. Вяхирь пробует отломить засохшую веточку липы для гнезда, лесопарк «Большой газон МГУ», Воробьёвы горы, 2.06.2025 г.
Фото: Н.С. Морозов

предоставленные фото, О.В. Волцит за подборку сведений о случаях доказанного гнездования вяхиря в Москве из базы данных ru-birds.ru и других источников, В.А. Вишневскому, А.В. Голубевой и И.В. Кузикову за уточнение деталей их наблюдений.

Литература

- Авилова К.В., Волцит О.В., Морозова Г.В., Самойлов Б.Л. 2011. Птицы. — Красная книга города Москвы. 2-е издание, переработанное и дополненное. Отв. ред. Б.Л. Самойлов, Г.В. Морозова. М. С. 99–252.
- Астафьева Т.В., Гришанов Г.В. 2012. Вяхирь *Columba palumbus* L. в городах Калининградской области. — Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные науки, 7: 52–59.
- Астафьева Т.В., Гришанов Г.В., Лыков Е.Л. 2011. История формирования и современное состояние городской популяции вяхиря *Columba palumbus* L. в Калининграде. — Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные науки, 7: 51–58.
- Атлас птиц Москвы и Подмосковья. 2006. Сост. М.В. Калякин, О.В. Волцит. София–Москва, 372 с.
- Атлас птиц города Москвы. 2014. Ред.-сост. М.В. Калякин, О.В. Волцит, Х. Гроот Куркамп. М., 332 с.
- Балаев А. 2023. О синантропизации и гнездовании вяхиря в Новой Москве, посёлок Ново-Спасское. — Московка. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 38: 42–44.
- Барановский А.В., Иванов Е.С. 2016. Гнездящиеся птицы города Рязани (Атлас распространения и особенности биологии). Рязань, 367 с.
- Белик В.П. 2021. Птицы Южной России: В двух томах. Т. 1. Неворобьиные — Non-Passerines. Материалы к кадастру. Ростов-на-Дону–Таганрог, 812 с.
- Благоосклонов К.Н. 1976. Некоторые новые и редкие гнездящиеся птицы Москвы. — Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический, 81 (4): 15–23.
- Бобенко О.А. 2009. Экология вяхиря (*Columba palumbus*) в Ставропольском крае. — Вестник Оренбургского государственного университета, 2: 111–116.
- Галишева М.С. 2010. Гнездование вяхиря *Columba palumbus* в населённом пункте Свердловской области. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири, 15: 37–38.
- Гашек В.А., Попов Е.А. 2022. Синантропизация вяхиря в Челябинской области. — Фауна Урала и Сибири, 1: 68–74.
- Гришанов Г.В. 2020. Вяхирь *Columba palumbus*. — Атлас гнездящихся птиц европейской части России. Ред.-сост. М.В. Калякин, О.В. Волцит. М. С. 426–428.
- Гришанов Ю.Н., Гришанов Г.В., Астафьева Т.В. 2020. Массовое гнездование вяхиря *Columba palumbus* на зданиях в Калининграде. — Рус. орнитол. журн., 29 (1950): 3263–3271.
- Емтыль М.Х., Иваненко А.М., Лохман Ю.В. 2011. Синантропизация некоторых видов птиц в городской черте г. Краснодара. — Актуальные вопросы экологии и охраны природы южных регионов России и сопредельных территорий. Матер. XXIV Межресп. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Отв. ред. М.В. Нагалецкий. Краснодар. С. 50–51.
- Ерёмки Г.С. 2004. Редкие виды птиц г. Москвы и ближнего Подмосковья: динамика фауны в 1985–2003 гг. — Беркут, 13 (2): 161–182.
- Захарова Н.Ю., Подвинцева С.Ю. 2019. Вяхирь *Columba palumbus* на зимовке в Терлецком парке Москвы. — Рус. орнитол. журн., 28 (1776): 2500–2501.
- Кадетов Н.Г., Кадетова А.А., Куранова Г.А. 2010. Птицы Воробьёвых гор (квадрат М-5) — Птицы Москвы: 2009 год, квадрат за квадратом. Труды Программы «Птицы Москвы и Подмосковья». Т. 5. М. С. 145–150.
- Калякин В.Н. 2011. Чем интересны сапсаны и другие пернатые хищники, обитающие на территории МГУ. — Жизнь Земли. Землеведение: история, достижения, перспективы. Вып. 33. М. С. 67–72.
- Калякин В.Н. 2014. Кратко о результатах наблюдений 2001–2014 гг. за некоторыми пернатыми хищниками Москвы и Подмосковья. — Московка. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 20: 42–54.
- Калякин М., Брунова М. 2024. О питании сапсана в Москве. — Московка. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 40: 40–41.
- Калякин М.В., Волцит О.В. 2022а. Вяхирь *Columba palumbus* Linnaeus, 1758. — Красная книга города Москвы. 3-е издание, переработанное и дополненное. Отв. ред. Н.А. Соболев. М. С. 149.

- Калякин М.В., Волцит О.В. 2022б. Сапсан *Falco peregrinus* Tunstall, 1771. — Красная книга города Москвы. 3-е издание, переработанное и дополненное. Отв. ред. Н.А. Соболев. М. С. 119.
- Карпов Ф.Ф., Березовиков Н.Н. 1994. Вяхирь (*Columba palumbus* L.) — новый гнездящийся вид г. Алма-Аты. — *Selevinia*, 2 (4): 34.
- Контрощиков В.В. 2009. Птицы Гагаринского района (квадрат Н-5). — Птицы Москвы: 2008 год, квадрат за квадратом. Труды Программы «Птицы Москвы и Подмоскovie». Т. 4. М. С. 156–162.
- Костин С.Ю. 2020. Каталог птиц Крыма. Симферополь, 244 с.
- Котов А.А. 1993. Отряд Голубеобразные — *Columbiformes*. — Птицы России и сопредельных регионов: Рябкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Сорокообразные. Отв. ред. С.Г. Приклонский. М. С. 47–181.
- Лыков Е.Л. 2009. Биология гнездования вяхиря в условиях города (на примере Калининграда). — *Беркут*, 18 (1–2): 54–68.
- Лыков Е.Л. 2021. Происхождение городских популяций птиц: географическая экспансия или независимое формирование (на примере четырёх видов)? — *Орнитология*, 45: 36–53.
- Лыков Е.Л., Гришанов Г.В. 2018. Атлас гнездящихся птиц Калининграда. Калининград, 320 с.
- Лыков Е.Л., Свиридов Д.А. 2024. О формировании городской популяции вяхиря (*Columba palumbus* L.) в г. Орле. — *Вестник Томского государственного университета. Биология*, 66: 122–141.
- Лыков Е.Л., Астафьева Т.В., Гришанов Г.В. 2012. Нетипичное расположение гнёзд вяхиря *Columba palumbus* в населённых пунктах Калининградской области. — *Рус. орнитол. журн.*, 21 (761): 1234–1236.
- Маловичко Л.В., Юферева В.В., Тельпов В.А., Юферев Д.П. 2021. Распространение и динамика синантропизации вяхиря *Columba palumbus* в Ставропольском крае. — *Юг России: экология, развитие*, 16 (3): 33–46.
- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий: история, биология, охрана. Т. 1. Л., 480 с.
- Мекленбурцев Р.Н. 1951. Отряд Голуби — *Columbae* или *Columbiformes*. — Птицы Советского Союза. Т. 2. Ред. Г.П. Дементьев, Н.А. Гладков. М. С. 3–70.
- Митропольский М.Г. 2008. Камышница *Gallinula chloropus* и вяхирь *Columba palumbus* — новые гнездящиеся птицы города Ташкента. — *Рус. орнитол. журн.*, 17 (455): 1837–1839.
- Мищенко А.Л., Федосов В.Н., Тильба П.А., Суханова О.В., Межнев А.П. 2013. Численность и экология вяхиря (*Columba palumbus*) в разных регионах Европейской России. — *Вестник охотоведения*, 10 (2): 167–176.
- Морозов Н.С. 2002. Межвидовые ассоциации и организация населения гнездящихся птиц в лесах умеренного пояса. 3. Ассоциации, формирующиеся при ведущем участии неколонизальных видов. — *Успехи современной биологии*, 122 (2): 156–182.
- Морозов Н.С. 2023. Дополнительные материалы к Красной книге города Москвы. — *Московка. Новости программы Птицы Москвы и Подмоскovie*, 37: 3–7.
- Москвичёв А.Н. 2024. Первые признаки синантропизации вяхиря в Ульяновске (Среднее Поволжье). — Птицы трансформированных территорий: сборник научных статей и материалов Всероссийской научной конференции, Иваново, 25–26 января 2024 г. Иваново. С. 190–193.
- Новикова М.А. 2018. Состояние орнитофауны ботанического сада МГУ (Воробьёвы горы) за период 2012–2018 гг.: вклад и взаимное влияние города и сада. — Материалы Всероссийской (с международным участием) конференции «Вклад особо охраняемых природных территорий в экологическую устойчивость регионов: современное состояние и перспективы», Костромская область, город Кологрив, 20–21 сентября 2018 г. Кологрив. С. 206–210.
- Нумеров А.Д., Венгеров П.Д., Киселев О.Г., Борискин Д.А., Ветров Е.В., Киреев А.В., Смирнов С.В., Соколов А.Ю., Успенский К.В., Шилов К.А., Яковлев Ю.В. 2013. Атлас гнездящихся птиц города Воронежа. Воронеж, 360 с.
- Павлов И.С., Ремезова Н.В., Надежина Ю.С., Фололеева Д.С. 2024. Урбанизация вяхиря в г. Самара. — Птицы трансформированных территорий: сборник научных статей и материалов Всероссийской научной конференции, Иваново, 25–26 января 2024 г. Иваново. С. 221–224.
- Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М., 461 с.
- Редчук П.С., Костюшин В.А. 2011. Некоторые данные по синантропизации вяхиря в Киевской области. — *Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали 4-й Міжна-род. наук. конф. Дніпропетровськ*. С. 304–306.
- Самойлов Б.Л., Морозова Г.В. 2001. Вяхирь *Columba palumbus* Linnaeus, 1758. — Красная книга города Москвы. Ред. Б.Л. Самойлов, Г.В. Морозова. М. С. 152–153.
- Самойлова А.Д., Аралов А.В. 2021. Изучение мест гнездования вяхиря *Columba palumbus* L. в Туле. — *Известия ТулГУ. Естественные науки*, 2: 42–46.
- Сахон В.В. 2016. История формирования и современное состояние синурбизированных группировок вяхиря (*Columba palumbus*) в Беларуси. — *Бранта*, 19: 73–80.
- Сахон В.В., Гричик В.В. 2022. Особенности гнездования вяхиря (*Columba palumbus* L. 1758) в урбанизированных и естественных ландшафтах Беларуси. — *Сибирский экологический журнал*, 5: 529–537.
- Свириденко Б.Ф. 2024. Вяхирь *Columba palumbus* в Омской области. — *Рус. орнитол. журн.*, 33 (2473): 4843–4849.
- Свиридов Д.А. 2023. Успешное гнездование вяхиря *Columba palumbus* на жилом многоквартирном доме в центре Орла. — *Рус. орнитол. журн.*, 32 (2338): 3848–3850.
- Сеник М.А., Хорняк М.М. 2003. Сучасні зміни в орнітофауні м. Львова. — *Беркут*, 12 (1–2): 9–13.
- Скильский И.В., Бучко В.В., Годованец Б.И. 1997. О формировании нового экологического типа вяхиря в Северной Буковине. — *Беркут*, 6 (1–2): 49–51.
- Соколов А.Ю. 2012. О синантропизации вяхиря в Прибитюжье. — Мониторинг редких и уязвимых видов птиц на территории Центрального Черноземья. Ред. А.Д. Нумеров, П.Д. Венгеров. Воронеж. С. 236–239.
- Сорокин А.Г., Бородин А.И., Михайлова Н.Н. 2011. Реализация программы реинтродукции сапсана (*Falco peregrinus peregrinus*) в Москве. — Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках. № 20. Научн. ред. В.А. Остапенко. М. С. 70–85.
- Шокало С.И., Шокало Б.И. 1992. Заселение вяхирем парковых ландшафтов Бреста. — Охрана и воспроизводство птиц пригородных лесов и зеленых насаждений. Львов. С. 111–112.
- Шупова Т.В. 2020. Синантропизация вяхиря киевской популяции. — Орнитологические исследования в странах Северной Евразии. Тез. XV Международной орнитол. конф. Северной Евразии, посвященной памяти академика М.А. Мензбира (165-летию со дня рождения и 85-летию со дня смерти). Отв. ред. М.В. Калякин, А.Б. Поповкина. Минск. С. 513.
- Bang J., Jensen B., Sunde P. 2005. Wood pigeons breeding in open land associate with Kestrel *Falco tinnunculus* nests. — *Bird Study*, 52 (1): 93–95.
- Bea A., Svazas S., Grishanov G., Kozulin A., Stanevicius V., Astafieva T., Olano I., Raudonikis L., Butkauskas D., Sruoga A. 2011. Woodland and urban populations of the woodpigeon *Columba palumbus* in the eastern Baltic region. — *Ardeola*, 58 (2): 315–321.
- Bijlsma R.G. 1984. Over de broedassociatie tussen Houtduiven *Columba palumbus* en Boomvalken *Falco subbuteo*. — *Limosa*, 57 (4): 133–139.
- Bogliani G., Tiso E., Barbieri F. 1992. Nesting association between the Woodpigeon (*Columba palumbus*) and the Hobby (*Falco subbuteo*). — *J. Raptor Research*, 26 (4): 263–265.
- Bogliani G., Sergio F., Tavecchia G. 1999. Wood pigeons nesting in association with hobby falcons: advantages and choice rules. — *Animal Behaviour*, 57 (1): 125–131.
- Collar N.J. 1978. Association of nesting wood pigeons and hobbies. — *British Birds*, 71 (11): 545–546.
- Fey K., Vuorisalo T., Lehtikoinen A., Selonen V. 2015. Urbanisation of the wood pigeon (*Columba palumbus*) in Finland. — *Landscape and Urban Planning*, 134: 188–194.
- Lykov E.L. 2024. Urban population of the Common Wood Pigeon in Krasnodar. — *Ornis Hungarica*, 32 (2): 138–153.
- Lykov E.L. 2025. The Current State of the Urban Population of the Common Wood Pigeon (*Columba palumbus* L.) in Belgorod, Russia. — *Acta zoologica bulgarica*, 77 (2): 219–230.

Sakhvon V., Kövér L. 2020. Distribution and habitat preferences of the urban Woodpigeon (*Columba palumbus*) in the north-eastern breeding range in Belarus. — *Landscape and Urban Planning*, 201: 103846.

Tomiałojć L. 1976. The urban population of Woodpigeon *Columba palumbus* Linnaeus, 1758, in Europe – its origin, increase and distribution. — *Acta Zoologica Cracoviensis*, 21 (18): 585–631.

Tomiałojć L. 1999. A long-term study of changing predation impact on breeding woodpigeons. — *Advances in vertebrate pest management*. Eds: D.P. Cowand, C.J. Feare. Furth. P. 205–218.

Zbyryt A. 2012. Gniazdowanie grzywacza *Columba palumbus* w bliskim sąsiedztwie pustułki *Falco tinnunculus*. — *Ornis Polonica*, 53 (4): 297–300.

Николай Сергеевич Морозов, morozovn33@gmail.com

Григорий Эдуардович Александренков, grigori2006@gmail.com

Ксения Дмитриевна Колтышева, k-koltysheva@mail.ru



О синантропизации вяхиря в Московской области

Виталий Конторщиков, Ольга Гринченко, Татьяна Свиридова, Александр Шариков, Татьяна Мас-сальская, Татьяна Ковинька, Анна Евсеева, Егор Пылёв, Алексей Севрюгин, Андрей Хромов

Вяхирь (*Columba palumbus*) — преимущественно лесной вид (Tomiałojć, 1976; Cramp, 1985; Котов, 1993). В населённых пунктах, в т.ч. в городах, он начал гнездиться в Центральной Европе в первой половине XIX века. С тех пор число синантропных поселений этого вида росло, область их распространения постепенно расширялась (Tomiałojć, 1976; Saari, 1997; Гришанов, 2020; Sattler, 2020; Лыков, 2021).

Л. Томялоич (Tomiałojć, 1976) выделил для вяхиря четыре стадии синантропизации. На 1-й стадии птицы в небольшом числе гнездятся в крупных слабо урбанизированных парках больших городов, маленьких городках, пригородах, деревнях и посёлках. На 2-й стадии вяхири гнездятся в городских парках и на кладбищах уже с более высокой плотностью, чем в окрестных лесах. На 3-й стадии они нередко гнездятся в городах также и в зонах жилой застройки, на улицах. Наконец, на 4-й стадии птицы довольно часто гнездятся на улицах, в том числе нередко на зданиях, многочисленны в городских парках.

В России городские популяции вяхиря на 4-й стадии синантропизации в настоящее время существуют, по-видимому, только в городах Калининградской обл., где они сформировались в основном в 1990–2000-е гг. (Астафьева и др., 2011), а ближайšie к Московской обл. находятся в Беларуси и в Украине, где синантропизация вида тоже происходила в конце XX и начале XXI веков (Редчук, Костюшин, 2011; Сахвон, 2016; Лыков, 2021; Лыков, Свиридов, 2024). Отдельные признаки синантропизации вида отмечены в начале XXI века и гораздо восточнее — в Смоленске, Брянске, Орле, Твери, Калуге, Туле, Московской и Воронежской областях, Рязани и даже в Свердловской обл. (Соколов, 2012; Лыков, 2021; Самойлова, Аралов, 2021; Лыков, Свиридов, 2024), но здесь процесс, по-видимому, находится только на начальных этапах формирования городских популяций, также как на Северном Кавказе и в Предкавказье (Маловичко и др., 2021; Гизатулин, 2024). Однако в г. Орле городская популяция уже достигла 3-й стадии формирования (Лыков, Свиридов, 2024).

В Москве и Московской обл. сейчас, как это было в основном и раньше, вяхирь населяет главным образом разнообразные леса и перелески, чаще по соседству с полями и лугами, предпочитая смешанные леса с

елью и сосной (например, Птушенко, Иноземцев, 1968; Самойлов, Морозова, 2001; Конторщиков и др., 2014; Калякин, Волцит, 2022). Со второй половины 2010-х гг. в публикациях, социальных сетях и других сообщениях все чаще стали встречаться упоминания о встречах и гнездовании вяхиря в населённых пунктах столичного региона вне лесных массивов (Забугин, 2018; Артамонов, 2019; Лыков, 2021; Калякин, Волцит, 2022; Балаев, 2023; Морозов, 2023; Кудрявцев, Богомазов, см. статью на с. 41).

Случаи гнездования вяхиря в населённых пунктах в столичном регионе изредка отмечали и раньше (например, Самойлов, Морозова, 2001; Лыков, 2021), что неудивительно, поскольку в Москве и Подмосковье поселения людей, особенно дачные участки, иногда имеют облик леса с отдельными строениями. Но в конце 2010-х гг. и, особенно, в начале 2020-х гг. число таких наблюдений резко возросло.

Мы хотели бы поделиться наблюдениями за вяхирем, сделанными во время наших многолетних исследований птиц на севере Московской обл. в Дмитровском, Талдомском и Сергиево-Посадском районах — с 1980-х гг. и в Можайском р-не — с 1990-х гг. В том числе мы вели непрерывные наблюдения в деревнях Костенево — с 1994 г., Дмитровка — с 2001 г. (обе деревни находятся в Талдомском р-не), на дачных участках к северо-западу от с. Орудьево (Дмитровский р-н) — с некоторыми перерывами с 1981 по 2017 гг., в д. Копытово (Можайский р-н) — с 1993 г.

На севере области вяхирь всегда был обычным видом (Конторщиков и др., 2014). В 1990–2000-е гг. его численность здесь, по нашим данным, заметно выросла, а спектр местообитаний расширился: вяхири в этот период и позже гнездились не только в смешанных лесах, но также в высокой древесно-кустарниковой растительности на пойменных низинных болотах, по берегам водоёмов, на зарастающих торфоразработках, чего раньше в Московской обл., по-видимому, не отмечали (Птушенко, Иноземцев, 1968; Михеев, 2018). До 2010-х гг. гнездование вяхиря в деревнях или на дачных участках мы не наблюдали.

На Орудьевских дачных участках при почти ежегодных наблюдениях в 1981–2009 гг. токующих вяхирей не отмечали, также как и в июне 2013 г. При следующем посещении этих мест в 2017 г. вяхирь токовал на

одном участке 15 и 16.06. Позже наблюдения здесь не проводили.

В Костеневе и Дмитровке вяхири ежегодно токовали и гнездились поблизости от деревень на опушках леса и в перелесках, но в самих деревнях токующие птицы до 2014 г. не встречались.

В Костеневе токующего вяхиря впервые услышали в 2017 г. — самец токовал в самой деревне с 2.06 по 26.07, наблюдали пару, а 26.07 видели спаривание. В последующие годы токование в деревне отмечали в 2021 г. (1 самец с 1.06 по 1.08), 2022 г. (1 самец с 14.04 по 5.07; пара предположительно гнездилась в высоких вёхлах в деревне), 2023 г. (по 1–2 токующих самца с 24.04 по 16.06), 2024 г. (1 самец с 20.04 по 24.07, в т.ч. видели и пару), 2025 г. (самец токовал по меньшей мере с конца апреля по 27.07; 26.04 обнаружено жилое гнездо вяхиря на иве в старом гнезде сороки, 8.05 в нём было 2 яйца).

В Дмитровке впервые токующий вяхирь отмечен в саду на краю деревни 12 и 16.07.2014 г., но, по-видимому, он здесь держался недолго, постоянно токующих птиц в Дмитровке в тот год мы не слышали. В 2019, 2022 и 2023 гг. в деревне регулярно с мая по июль токовал по меньшей мере один самец (17.06.2023 г. в саду видели пару), в 2024 и 2025 гг. — по 2–3 самца, видели пары и токовые полёты, в т.ч. 20.04.2024 г. обнаружили гнездо в деревне на липе на высоте около 6 м, с 12 по 16.07.2025 г. в Дмитровке держалась лётная молодая птица. Токующих птиц в Дмитровке отмечали с 14.04 (в 2024 г.) по 18.07 (в 2023 г.). В 2015–2018 и 2020–2021 гг. токующие вяхири были очень обычны у Дмитровки, и не исключено, что они токовали и в самой деревне, но достоверно это не было установлено.

В других местах на севере Московской обл. вяхирей в населённых пунктах мы стали встречать с 2018 г., когда 25–27.05 в д. Минино птицы строили на яблоне гнездо (в июне в гнезде были птенцы; токующего самца в этой деревне отмечали и все последующие годы). В 2021 г. гнездо найдено 23.05 в д. Ельцыново (на иве на высоте 3 м, с 1 птенцом), токование слышали в д. Измайлово (17.04). В 2022 г. самец токовал 16.04 в д. Ельцыново, в 2023 г. — 22.04 в д. Сквородино. В 2024 г. 12.06 на окраине д. Бучево нашли гнездо с 2 крупными птенцами, токующих самцов отмечали в деревнях Полубарское (13.04), Сквородино (23.04) и Мотовилово (9.07); пару птиц видели на заброшенном участке на краю д. Лютиково. В 2025 г. гнезда вяхиря находили 26.04 — в д. Павловское (на ели у маленького пруда на деревенском участке, 1 яйцо), 10.06 — в д. Есаулово (на сосне, под гнездом нашли двух мёртвых птенцов), 18.06 — на краю д. Курилово (пустое); пара птиц предположительно гнездилась в д. Бородино (наблюдение 3.06); отмечен ток на дачных участках в окр. с. Темпы (в предыдущие годы птиц там не встречали; личн. сообщ. Е.А. Халиулиной).

Если суммировать все перечисленные выше наблюдения, то на севере области в 2014–2025 гг. число известных нам случаев предположительного или достоверного гнездования вяхиря в населённых пунктах составит (число предполагаемых пар): в 2014 г. — 1 пара, в 2015 и 2016 гг. — 0, 2017 г. — 2, 2018 г. — 1, 2019 г. — 2, 2020 г. — 1, 2021 и 2022 гг. — по 4, 2023 г. — 4–5, 2024 и 2025 гг. — по 9–10 пар.

Таким образом, в этот период отмечен рост числа гнездящихся в населённых пунктах вяхирей. Можно предположить, что с 2017 г. это явление становится более распространённым и регулярным, а с 2021 г. или,

может быть, в 2024–2025 гг. произошёл резкий рост числа таких случаев.

В Можайском р-не у д. Копытово в 1990–2020-е гг. вяхирь тоже всегда гнезвился в небольшом числе поблизости от деревни на опушках леса и в перелесках. Наши регулярные наблюдения охватывали несколько деревенских участков на северо-западном краю этой деревни общей площадью порядка 2 га. К этой территории примыкали небольшие облесённые овраг и болото. В 2017 г. 3.06 впервые отметили токование самца на краю самой деревни. В 2018 г. 5.07 самец недолго токовал в переулке в деревне, 12.07 там же держались 2–3 птицы, а 5.08 птица токовала поблизости на краю деревни.

В 2019 и 2020 гг. на рассматриваемой территории в деревне уже определённо гнездились 1–2 пары, в 2021 г. — 2–3 пары, 2022 г. — 1–2 пары, 2023 г. — 2–3 пары, 2024 и 2025 гг. — по 2 пары. Хотя некоторые из этих пар могли гнездиться формально не в самой деревне, а у её границы, но токование происходило и в деревне тоже.

Токующих самцов в д. Копытово слышали с 30.03 (в 2025 г.) по 22.07 (в 2021 г.; фрагмент тока — 5.08.2018 г.). Также неоднократно видели пары и токовые полёты. Найдены два гнезда — на ели на высоте около 10 м (гнездились предположительно в 2019 г.; возможно, на этой же ели птицы гнездились также и в 2024 г.) и на сосне на высоте около 5 м (гнездились в 2024 г.). В 2024 г. 12.05 на одном из деревенских участков отмечены сразу две пары, которые предположительно гнездились в двух высоких елях на расстоянии 80–90 м друг от друга.

В других местах Можайского р-на вяхиря в населённых пунктах мы отмечали только в 2021–2024 гг.: в 2021 г. 9.07 самец токовал на краю д. Кусково, в 2022 г. 14.07 птица долго сидела у ели в д. Сивково, в 2023 г. 8.04 самец токовал на ферме в пос. лесхоза Юрлово, 20.05 вяхирь лез в ель в д. Плешаково, где у него, возможно, было гнездо; в 2024 г. 3.07 1–2 самца токовали на дачах к юго-западу от с. Борисово, две птицы беспокоились в самом селе у высоких елей.

Если суммировать эти наблюдения, то в Можайском р-не число выявленных нами достоверно или предположительно гнездившихся в населённых пунктах пар составит: в 2017 и 2018 гг. — по 1, 2019 и 2020 гг. — по 1–2, 2021 г. — 3–4, 2022 г. — 2–3, 2023 и 2024 гг. — по 4–5, 2025 г. — 2.

Добавим, что к востоку от Можайского р-на в с. Жаворонки и окрестностях И.В. Кузиков (2008) в 1997–2008 гг. не отмечал вяхиря в населённых пунктах, но примерно с 2023 г. по меньшей мере один токующий самец постоянно держался в одном месте на дачах у села (О.А. Гвоздева, личн. сообщ.).

Таким образом, в местах наших наблюдений — на севере и юго-западе Московской обл. — вяхирь начал регулярно встречаться в населённых пунктах с 2017 г., заметный рост числа таких встреч произошёл с 2021 г.

Во всех местах птицы придерживались хорошо озеленённых участков, где были высокие деревья.

С учётом других известных нам наблюдений, можно предположить, что заметный рост численности вяхиря в населённых пунктах в Московском регионе начался в самом конце 2010-х гг. и стал особенно заметен в начале 2020-х гг. Очевидно, сейчас в Москве и Московской обл. мы наблюдаем синантропизацию вяхиря на её первой стадии (по: Tomiałojć, 1976).

На фоне общего процесса синантропизации вяхиря почти по всему его ареалу вряд ли уместно гово-

речь о каких-то особых предпосылках этого процесса в Московской обл., но отметим, что в наших краях этому должны были способствовать, наряду с другими причинами, распространение в сельских поселениях высоких деревьев, в том числе хвойных, в связи с тем, что многие деревенские участки стали по сути дачами для горожан (см. статью на с. 60).

Авторы благодарят О.А. Гвоздеву, А.А. Кудрявцева, А.В. Макарова и Е.А. Халиулину за ценные сообщения, наблюдения и помощь в работе.

Литература

- Артамонов В.Б. 2019. Вяхири в мемориальной зоне Бутовского полигона. — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 30: 57–58.
- Астафьева Т.В., Гришанов Г.В., Лыков Е.Л. 2011. История формирования и современное состояние городской популяции вяхири *Columba palumbus* L. в Калининграде. — Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные науки. Вып. 7, с. 51–58.
- Балаев А.Н. 2023. О синантропизации и гнездовании вяхири в Новой Москве, посёлок Ново-Спаское. — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 38: 42–44.
- Гизатулин И.И. 2024. Инвазия европейской синантропной популяции вяхири *Columba palumbus* в городе Грозный Чеченской Республики. — Российский журнал биологических инвазий, 3: 67–74.
- Гришанов Г.В. 2020. Вяхири *Columba palumbus*. — Атлас гнездящихся птиц Европейской части России. Ред.-сост. М.В. Калякин, О.В. Волцит. М., с. 426–428.
- Забугин В.В. 2018. Гнездование вяхири. — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 28: 57–58.
- Калякин М.В., Волцит О.В. 2022. Вяхири *Columba palumbus* Linnaeus, 1758. — Красная книга города Москвы. 3-е издание, переработанное и дополненное. Отв. ред. Н.А. Соболев. М., с. 149.
- Контрощиков В.В., Гринченко О.С., Свиридова Т.В., Волков С.В., Шариков А.В., Хромов А.А., Зубакин В.А., Кольцов Д.Б., Коновалова Т.В., Смирнова Е.В., Иванов М.Н., Макаров А.В., Севрюгин А.В. 2014. Птицы Журавлиной рощи и окрестностей: распространение и численность. — Вестник Журавлиной рощи. Выпуск 2. М., с. 5–170.
- Котов А.А. 1993. Вяхири — *Columba palumbus* Linnaeus, 1758. — Птицы России и сопредельных регионов: Рябкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Сорообразные. Отв. ред. С.Г. Приклонский. М., с. 50–65.
- Кузиков И.В. 2008. Материалы по фауне птиц окрестностей посёлка Жаворонки Одинцовского района Московской области. — Фауна и экология птиц Подмосковья. Труды программы «Птицы Москвы и Подмосковья». Т. 3, с. 38–58.

- Лыков Е. Л., Свиридов Д.А. 2024. О формировании городской популяции вяхири (*Columba palumbus* L.) в г. Орле. — Вестник Томского государственного университета. Биология. Вып. 66, с. 122–141.
- Лыков Е.Л. 2021. Происхождение городских популяций птиц: географическая экспансия или независимое формирование (на примере четырёх видов)? — Орнитология, 45: 36–53.
- Маловичко Л.В., Юферева В.В., Тельпов В.А., Юферев Д.П. 2021. Распространение и динамика синантропизации вяхири *Columba palumbus* в Ставропольском крае. — Юг России: экология, развитие, 16 (3): 33–46.
- Михеев А.В. 2018. Позвоночные животные Приволжско-Дубнинского государственного заповедника. — Экосистемы: экология и динамика, 2 (3): 79–168.
- Морозов Н.С. 2023. Дополнительные материалы к Красной книге города Москвы. — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 37: 3–7.
- Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М., 461 с.
- Редчук П.С., Костюшин В.А. 2011. Некоторые данные по синантропизации вяхири в Киевской области. — Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали 4-й Міжнарод. наук. конф. Дніпропетровськ, с. 304–306.
- Самойлов Б.Л., Морозова Г.В. 2001. Вяхири *Columba palumbus* Linnaeus, 1758. — Красная книга города Москвы. Отв. ред. Б.Л. Самойлов, Г.В. Морозова. М., с. 152–153.
- Самойлова А.Д., Аралов А.В. 2021. Изучение мест гнездования вяхири *Columba palumbus* L. в Туле. — Известия ТулГУ. Естественные науки. Вып. 2, с. 42–46.
- Сахон В.В. 2016. История формирования и современное состояние синурбизированных группировок вяхири (*Columba palumbus*) в Беларуси. — Бранта, 19: 73–80.
- Соколов А.Ю. 2012. О синантропизации вяхири в Прибитюжье. — Мониторинг редких и уязвимых видов птиц на территории Центрального Черноземья. Воронеж, с. 242–246.
- Cramp S (ed). 1985. The Birds of The Western Palearctic. Vol. IV. 960 p.
- Saari L. 1997. Woodpigeon *Columba palumbus*. — The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. E.J.M. Hagemeyer, M.J. Blair (Editors). London, p. 384–385.
- Sattler T. 2020. Common Woodpigeon *Columba palumbus*. — European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanese P., Marti D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G. & Foppen R.P.B. Barcelona, p. 184–185.
- Tomiałojć L. 1976. The urban population of the Woodpigeon *Columba palumbus* Linnaeus, 1758, in Europe — its origin, increase and distribution. — Acta Zoologica Cracoviensia, XXI (18): 585–632.

Виталий Владимирович Контрощиков, Государственный Дарвиновский музей, vitkont@yandex.ru

Ольга Сергеевна Гринченко, Татьяна Владимировна Свиридова, Александр Викторович Шариков, Татьяна Сергеевна Массальская, Татьяна Сергеевна Ковинька, Анна Михайловна Евсеева, Егор Михайлович Пылёв, Алексей Владимирович Севрюгин, Андрей Анатольевич Хромов



Учёты водоплавающих птиц

Видовой состав и численность водоплавающих птиц в Москве летом 2025 года

Ксения Авилова, Анастасия Поповкина

Традиционный учёт водоплавающих птиц Москвы в 2025 г. состоялся в обычные для этого мероприятия сроки, то есть с середины июня по начало августа, хотя сообщения о встречах выводков начали поступать задолго до его начала, с конца зимы. Выражая благодарность всем, кто счёл необходимым сообщить об этом лично координатору, что всегда особенно ценно, хотим

отметить, что сосчитать, даже в границах Москвы, все выводки такого фонового вида, как кряква (*Anas platyrhynchos*), к сожалению, невозможно, и мы такой цели не ставим. Наша задача — оценить общий уровень численности и ход размножения в соответствии с условиями текущего сезона, для чего мы проводим учёт в отрезок времени, который захватывает и ранние, и




Рис. 1. Ход средних суточных температур с ноября 2024 по апрель 2025 гг.

поздние выводки, хотя какие-то «хвосты» не могут не оказаться за пределами учётного периода. И ваши сообщения очень помогают об этом не забывать. Вторая проблема — оценка успеха размножения, иными словами — сколько птенцов выросло до лётного состояния из тех, что попались на глаза маленькими пуховиками? Помочь ответить на этот вопрос может только постоянное наблюдение за каждым выводком. Понятно, что это вряд ли возможно, по крайней мере, для кряквы. Оценить успех размножения можно косвенно — сравнив число молодых и взрослых птиц или число птенцов в выводках разного возраста, например, пуховиков и оперённых птенцов, как делают в охотничьих хозяйствах. Более подробно об этом можно прочитать в статье К.В. Авиловой (2016). В текущем сезоне состоялся уже 37-й летний учёт водоплавающих птиц Москвы, итогами которого мы и хотим с вами поделиться.

Участники 37-го летнего учёта водоплавающих птиц 2025 г.: В.П. Авдеев, Л. Аверьянова, К.В. Авилова, А. Алтышева, Д.И. Асоцкий, И. Ач, Н.А. Бондарева, Г.М. Виноградов, С.В. Волков, А.В. Гришин, Д. Губер, Л.Н. Губина, Д.В. Давыдов, Е. Евменчикова, С.Л. Елисеев, Г.С. Ерёмкин, К.В. Ивановский, А.В. Кац, В.В. Конторщиков, И.В. Кузиков, М. Кузнецов, А.А. Лапин, О.Н. Лапина, Л.М. Ломоносова, Г. Луппо, Е.Л. Лыков, Н.В. Мологина, В.Г. Мизяк, С.Н. Николаев, А. Панфилова, В. Панфилова, И.М. Панфилова, Е.Л. Певницкая, А.Б. Поповкина, В.А. Путилов, И.С. Сметанин, М.Ю. Соловьёв, А.А. Строганова, Т.В. Хоханова, Н.В. Чернышев. Студенты биофака МГУ: О.А. Воронцова, Г.Г. Голобоков, Э.С. Торосян, И.О. Трофимова, В.Р. Тарабрин; студенты МВА имени К.И. Скрябина: А.А. Кулькова, Али Аджи Май Абдерамане; группа от «Мосволонтёра» из 27 человек.

Обзор результатов учёта начнём традиционно с описания погодных условий. Сравним ход температур текущего и предыдущего года по данным метеонаблюдений МГУ и Госкомгидромета. Среднемесячная температура января в 2025 г. составила 0,1°C, т.е. больше 0°, что отмечено едва ли не впервые за всю историю метеонаблюдений. В 2024 г. она была отрицательной

–10,1°C. Аномально тёплой погода была и в начале февраля, но уже в I декаде похолодало, и среднемесячная температура февраля составила –2,2°C (в прошлом году –4,5°C). Особенностью 2025 г. стал очень ранний переход среднесуточной температуры воздуха через 0°C, который произошёл 27.02, тогда как в 2024 г. — 12.03. То есть весна текущего года была более ранней, чем прошлого. Осень 2024 г. была длиннее, чем в 2023 г.: переход среднесуточной температуры через 0°C состоялся 23.11, а не 17-го, как в 2023 г. Благодаря этому продолжительность морозного периода сократилась до 97 дней, то есть на 10 дней по сравнению с сезоном 2023–2024 гг. (рис. 1).

Хотя март 2024 г. был аномально тёплым со среднесуточной температурой 1,6°C, в текущем году он оказался ещё теплее (4,2°). Апрель, наоборот, в 2025 г. был хоть и тёплым (8,8°C), но прохладнее, чем в предыдущем году (10,8°C). Наиболее показательной, как и в прошлом году (Авилова, Поповкина, 2024), оказалась погодная аномалия в мае. Майские похолодания отмечают в Москве всё чаще. Текущий год не стал исключением: 8–10.05 в Москве и Московской обл. отмечены заморозки до –5°C как результат влияния полярной климатической ложбины. Температура воздуха опустилась на 3–7° ниже средних значений, прошли дожди с мокрым снегом, скорость ветра достигала 12–17 м/с. Это в очередной раз произошло в период массового майского вылупления утят кряквы.

В 2025 г. в Москве были отмечены 12 гнездящихся видов водоплавающих птиц (таблица). Число размножающихся видов постепенно растёт (рис. 2), а их состав меняется. Из всех гнездившихся в этом сезоне видов пять являются интродуцентами: огарь (*Tadorna ferruginea*), пеганка (*T. tadorna*), мандаринка (*Aix galegicula*), чёрный лебедь (*Cygnus atratus*) и лебедь-шипун (*C. olor*). Лебеди размножались под присмотром людей, но всё же самостоятельно, что бывает далеко не каждый год, особенно у австралийских чёрных лебедей. Пара пеганок привела выводок на малый пруд на старой территории зоопарка, но все птенцы погибли, став жертвой территориальной пары огарей, у которых

Таблица. Численность гнездящихся водоплавающих птиц летом 2024 и 2025 гг.

Вид	Птенцов		Взрослых		Выводков (семейных групп)	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Кряква	1899	3035	3221	2935	470	487
Огарь	1156	1071	— ¹	— ¹	185	148
Пеганка	?	5	5	2	2	1
Хохлатая чернеть	110	76	43	70	25	16
Красногловый нырок	20	12	10	18	7	8
Широконоска	24	9	4	3	3	2
Мандаринка	22	3	13	6	4	1
Камышница	142	125	83	60	53	47
Лысуха	169	173	112	108	42	46
Чомга	202	192	166	172	85	81
Лебедь-шипун	7	4	39	48	2	1
Чёрный лебедь	5	0	2	2	1	0
Чирок-свистунок	0	1	3	1	0	1
Черношейная поганка	0	5	2	4	0	2


¹ Не определено

Рис. 2. Рост числа гнездящихся в Москве видов водоплавающих птиц с 1998 по 2025 гг.



Рис. 3. Динамика летней численности кряквы в 1998–2025 гг.

тоже был выводок на этом пруду. Ещё два птенца вылупились у пары пеганок, загнездившейся на Леоновском пруду (обе взрослые птицы лишены способности к полёту). Птенцов растили в полувольных условиях, а после подъёма на крыло обе молодые птицы улетели. Одну из них видели 29.07 на берегу р. Яузы в 1,2 км ниже Леоновского пруда (<https://www.inaturalist.org/observations/302046981>); дальнейшая их судьба неизвестна. Ещё два вида, каролинка (*Aix sponsa*) и нильский гусь (*Alopochen aegyptiaca*), встречаются в Москве вне зоопарка единично и пока не размножаются. Последний уже давно успешно осваивает города Западной Европы (Fouque et al., 2011; Alonso et al., 2022). Если они начнут гнездиться в Москве, это может привести к появлению в городе новых интродуцентов.

С другой стороны, летом 2025 г., как и в 2024 г., не встречено не только ни одного выводка гоголя (*Bucephala clangula*), но и ни одной взрослой птицы. Как обычно, в Москве доминировала кряква. Размножение началось необычно рано, даже учитывая раннее наступление весны. На почти полностью покрытом льдом Большом Чертановском пруду 6.02 обнаружилась самка кряквы с двумя маленькими утятами в окружении ворон (О. Гринченко, А. Макаров). Судьба выводка неизвестна, трудно представить себе, что он смог выжить в таких услови-

ях. По сообщению сотрудников зоопарка, 2.03 вольная кряква привела на Большой пруд выводок утят. По дороге утята провалились в колодезь канализации, но были оттуда извлечены и посажены в брудер на дорастивание, а утка осталась на свободе. По сообщению В.А. Кирьякулова, 11.03 на Яузе в центре Москвы самка кряквы водила 5 маленьких утят. По сообщению Л. Губиной и Т. Турской, на Химке в Покровском-Стрешневе 10.03 обнаружена кряква с 13 маленькими утятами. Этот выводок впоследствии видели неоднократно, и число птенцов в нём уменьшалось с каждым днём (Д. Давыдов, Г. Ерёмкин, Л. Губина, Т. Турская); 22.03 в выводке остались 2 птенца (А. Шиенок), и сомнительно, что они выжили.

Суммарная численность кряквы в этом сезоне осталась практически прежней, снизившись на 3,5%, то есть в пределах статистической погрешности (рис. 3). В 2024 г. она сократилась на 19%, в 2023 г. — на 6,8%. Хотя численность взрослых птиц оказалась выше прошлогодней, общее число птенцов в период учёта было на 37% меньше, чем в предыдущем сезоне, и это без учёта возможного отхода утят младшего возраста после того, как их обнаружили и пересчитали. Откладка яиц началась в I декаде марта, это наиболее ранние сроки за весь период наблюдений. Об этом свидетельствуют и встречи отдельных выводков, появившихся ещё до




Рис. 4. Декады перехода среднесуточной температуры через 0°C и начало кладки у кряквы с 1998 по 2025 гг.

начала массового размножения. Можно отметить необычную сближенность сроков наступления весны и начала кладки у кряквы (рис. 4). Обычно ранней весной эти события разделяет довольно длинный промежуток, необходимый для успешной подготовки к размножению. Необычная картина, видимо, говорит о том, что в городских условиях при отсутствии сезонных миграций самки могут подготовиться к размножению ещё до наступления устойчивого потепления. Находки самых ранних выводков (см. выше) подтверждают это предположение. В конце лета, особенно жаркого, в последние годы поступают сообщения о мёртвых утках. К счастью, этим довольно дождливым летом информации о погибших птицах было гораздо меньше, чем в прошлые годы, тем не менее см. сообщение М.А. Аргир на с. 44. Это ещё раз подтверждает непричастность подкормки уток хлебом к их гибели на прудах в конце лета.

У московских огарей в 2025 г. сезон гнездования также начался заметно раньше, чем в предыдущие годы, хотя, казалось бы, погодные условия должны оказывать на фенологию их размножения меньшее влияние, чем на сроки размножения крякв. Первый извест-

ный нам выводок появился на Богдановском пруду 5.05. Это самая ранняя дата вылупления птенцов у огаря в Москве за всю историю наших наблюдений с середины 1990-х гг. Единичные выводки появлялись в прошлые годы 10–11.05; такие случаи были редки и сильно выбивались из сроков гнездования всей остальной размножающейся части популяции. В 2025 г. столь ранний выводок не был исключением: на следующий день появились ещё два, и практически каждый день стали приходить сообщения о встречах новых выводков. При этом период гнездования у огарей в 2025 г. оказался необычно растянутым: выводки продолжали появляться вплоть до второй половины июня. Число выросших в городе огарят немного превысило прошлогоднюю цифру (таблица), но прирост оказался не столь велик, как в прошлые годы.

Как и в 2024 г., мы провели масштабное обследование Московской области и территорий Москвы за МКАД. В 2025 г. осмотрены 373 водоёма — на 60 больше, чем в 2024 г.; огари с птенцами обнаружены на 41 из них. На многих водоёмах, где были выводки в 2024 г. и раньше, их не было. В то же время появились новые



Рис. 5. Динамика численности хохлатой чернети в 1998–2025 гг.



Рис. 7. Динамика численности камышиницы в 1998–2025 гг.



Рис. 6. Динамика численности красноголового нырка в 1998–2025 гг.




Рис. 8. Динамика численности лысухи в 1998–2025 гг.

места гнездования за МКАД, и поставлен очередной рекорд по дальности места гнездования — в г. Наро-Фоминске, в 66 км к юго-западу от Московского зоопарка и в 45 км от известного ранее наиболее дальнего места гнездования на юго-западе области (г. Одинцово). По сведениям местных жителей, огари прилетали туда весной и в предыдущие 2–3 года, но птенцы появились в этом году впервые. Общее число птенцов за МКАД в 2025 г. было почти в 2 раза меньше, чем в 2024 г. (243 и 417, соответственно). Семейных групп тоже было меньше, но разница не столь существенная (43 и 50); 2025 год значительно отличался от предыдущего по среднему числу птенцов в выводке: 5,6 и 8,3, соответственно. Такие же различия, хотя и не столь разительные, выявились и для семейных групп огарей в Москве: среднее число птенцов в них в 2024 г. было 7,3, а в 2025 — 6,2. Два огаря, окольцованные в ноябре 2023 г. в Московском зоопарке, встречены в пос. Челюскинском (Е. Перминова) и в г. Лобне (А. Лапин).

В одном из гнезд огаря под крышей здания в 1-м Боткинском проезде вылупился гибридный птенец — «крягарь». Он вырос в объединённом выводке огарей на пруду в Ходынском парке. Гибриды огаря и кряквы появляются в этом месте уже несколько лет, начиная как минимум с 2020 г.

После снижения в 2024 г. численность выводков хохлатой чернети (*Aythya fuligula*) существенно выросла (рис. 5), хотя ещё далека от максимальной, наблюдавшейся в 2009–2011 гг. Выводки отмечены на р. Москве выше Строгинского моста (С. Николаев, Д. Давыдов), у Серебряного Бора и на Строгинском затоне (И. Кузиков, Г. Ерёмки), на Большом Голицынском пруду ЦПКИО (Д. Асоцкий), на Чёрном Люберецком озере





Рис. 9. Динамика численности чомги в 1998–2025 гг.

(И. Панфилова), на прудах в Крылатском и на Гребном канале (Е. Лыков, А. Василевская). Численность гораздо более консервативного, чем хохлатая чернеть, красноголового нырка (*A. ferina*) осталась на прежнем уровне (рис. 6), выводки сосредоточены на остатках иловых площадок Люберецких очистных сооружений (И. Панфилова). Численность широконоска (*Anas clupeata*) остаётся очень низкой, но стабильной — 1–3 вывода в год. В 2025 г. отмечены три вывода: два — на р. Москве (С. Николаев, Д. Давыдов), один — на остатках иловых площадок Люберецких очистных сооружений (И. Панфилова). Медленно, но верно растёт число выводков мандаринки. В этом году оно достигло четырёх (С. Елисеев, А. Алтышева, А. Кочубей, С. Волков, Т. Хоханова). Появились они только на прудах за пределами Московской кольцевой автодороги: в усадь-



Краснозобая гагара, Кусково, 21.06.2025 г.

Фото: В.П. Авдеев



Молодая камышница на р. Химке.

Фото: А.В. Гришин



Широконоска с выводком на р. Москве. Фото: Д.В. Давыдов



Смешанный выводок из пяти утят кряквы и двух хохлатой чернети на Воробьевской набережной р. Москвы, 16.07.2025 г.

Фото: Д.И. Асоцкий

бе Архангельское-Тюриково и на пруду на р. Чермянке в пос. Нагорное. Число выводков камышницы (*Gallinula chloropus*) (рис. 7) в 2025 г. рекордное, особенно если учесть, что из-за скрытности их может быть несколько больше, чем удаётся подсчитать. Камышницы гнездятся на Нижнем Царицынском пруду (Н. Бондарева), на р. Городне и в Ближних Прудищах (Г. Ерёмкин), на прудах и р. Химке в Покровском-Стрешневе, в Серебряном Бору на Бездонке, на Лебедянском пруду (Н. Бондарева) и Чёрном Люберецком озере (И. Панфилова), на реках Битце, Наверашке и её притоке Пустой Наверашке (В. и А. Панфиловы), на р. Яузе и Джамгаровских прудах (Н. Бондарева, М. Кузнецов), в Капотне (К. Ивановский), на Кузьминских прудах и в некоторых других местах. Численность лысухи (*Fulica atra*) по сравнению с прошлым годом стабилизировалась (рис. 8), основные места встреч её выводков — Нижний Царицынский, Серебряно-Виноградный и Лебедянский пруды (Н. Бондарева), Чёрное Косинское и Чёрное Люберецкое озёра (И. Панфилова, Л. Ломоносова), пруд на ручье Коровий Враг (С. Елисеев), пруды в Крылатском (Е. Лыков), оз. Бездонка в Серебряном Бору, пруды парка Терлецкое. Отдельные выводки отмечены и в других местах. Численность чомги (*Podiceps cristatus*) выросла весьма незначительно (рис. 9). Основные места регистрации выводков — в первую очередь Царицынские и Борисовский пруды (Н. Бондарева, 31 выводок), откуда и началось её быстрое распространение по Москве. На прудах востока Москвы: Серебряно-Виноградном, Лебедянском, Терлецких, Кусковских, на

Косинских озёрах в этом сезоне отмечены не меньше 30 выводков (И. Панфилова, Л. Ломоносова, В. Конторщиков, Е. Евменчикова, Н. Бондарева), на юго-востоке Москвы выводки были отмечены на Нижнем Люблинском пруду, на р. Москве в окрестностях Перервинской плотины, на западе Москвы — на Большом Мещерском пруду (А. Строганова), на водоёмах Крылатского (Е. Лыков).

Высокая плотность птиц на городских водоёмах и активность многочисленных крякв, а также выпуск на водоёмы домашних уток приводят к появлению смешанных выводков. Например, в парке имени Горького Д. Асоцкий наблюдал утят чернети в выводке кряквы, а в парке Царицыно в выводке кряквы оказались явные потомки домашних уток.

На Большом Дворцовом пруду в Кускове во второй половине июня (как минимум с 16 до 24.06) держалась краснозобая гагара (*Gavia stellata*). Естественно, столь экзотическая для Москвы птица стала «объектом притяжения» бёрдвотчеров: не меньше четырёх десятков фотографий появилось на платформе iNaturalist и в разных соцсетях.

Год в целом можно считать удачным для водоплавающих птиц Москвы. Видовое богатство гнездящихся водоплавающих птиц составило 12 видов, в том числе на 42% — за счёт видов-интродуцентов.

Численность выводков фонового вида, кряквы, в текущем сезоне осталась практически на уровне про-



Мандаринки: самки обычной и светлой окраски на пруду р. Чермянки. Фото: С.Л. Елисеев

шлогодней и не выросла, несмотря на раннее наступление весны.

Число выводков камышниц (53) можно считать рекордным. Численность остальных видов, как малочисленных (хохлатая чернеть, красноголовый нырок, широконоска), так и более многочисленных (лысуха, чомга) не проявила тенденции к снижению.

Среди интродуцентов продолжился рост численности огарей, намечился рост численности мандаринок, появились два выводка у полувольных лебедей-шипун, впервые за время наблюдений успешно гнездилися чёрный лебедь.

Ксения Всеволодовна Авилова, wildlife@inbox.ru
Анастасия Борисовна Поповкина, tadorna@mail.ru



Чомга с выводком 25.07.2025 г. в Терлецком парке.

Фото: А.Б. Поповкина

Благодарим за информацию и энтузиазм всех участников, без которых наши знания о жизни птиц, в том числе водоплавающих, были бы неполными. Приглашаем всех на зимний учёт в третье воскресенье января.

Литература

- Авилова К.В. 2016. Жизненный цикл и динамика численности городской популяции кряквы в Москве. — Зоологический журнал, 95 (12): 1427–1440.
- Авилова К.В., Поповкина А.Б. 2024. Видовой состав и численность водоплавающих птиц в Москве летом 2024 года. — Московская, 40: 5–11.
- Alonso H., Núñez A.A., Albuquerque J. M., Gerales. 2022. The breeding population of the Egyptian Goose *Alopochen aegyptiaca* in the city of Lisbon. — AIRO, 30: 22–31.
- Fouque C., Benmergui M., Bulliffon F., Schricke V. 2011. The Egyptian Goose (*Alopochen aegyptiaca*) in France. — Казарка, 14: 124–137.



Прилёт птиц весной 2025 года

Хирт Гроот Куркамп (сост.)

Данный обзор суммирует первые сообщения в 2025 г. о встречах 107 видов, гнездящихся в Москве и в Московской области или относящихся к категории пролётных. Данные получены от индивидуальных наблюдателей и из базы данных программы ПМиП «Онлайн дневники наблюдений» (<http://ru-birds.ru>), базы данных eBirds (<https://ebird.org>), iNaturalist (<https://www.inaturalist.org/>), сводки СОПР («Весна: день за днём — 2025», сост. М.А. Шведко, М.Б. Дёров, М. Блиникова, М.А. Невский, Г.С. Ерёмкин), базы данных eBird (<https://ebird.org>) и рассылки birdnewsmoscow и, безусловно, не полны. Автор не имел возможности проверить достоверность всех сообщений.

Наблюдатели

В.П. Авдеев, Л. Аверьянова, К.В. Авилова, А. Аксаментов, Г.Э. Александренков, С. Апполонов, И.М. Ардатов, В.Б. Артамонов, В.Ю. Архипов, Д.И. Асоцкий, И.Д. Баженова, А.Н. Балаев, А. Баранова, С.В. Бахмарин, Е. Бац, В.А. Белинский, В.В. Беляева, И. Беляков, М. Блиникова, О.А. Блинова, О. Божинова, А. Бондарев, Н.А. Бондарева, Е. Борисов, Е.П. Боровская,

Ю. Брандт, М.Ю. Будин, С. Валиев, А.А. Василевская, И. Васильев, О. Векова, М.В. Великанов, А.М. Великанова, Л.С. Великодный, Г.М. Виноградов, В.А. Вишневский, Ю. Власова, И. Воинов, О.В. Волцит, П.М. Волцит, А.М. Гельметдинов, В.С. Герасимова, Б. Ги, С. Голованова, А.В. Голубева, М. Гончаренко, А.И. Гончаров, А. Горбань, М. Горбунова, О. Горецкая, А. Горин, С. Грачёва, К. Григорьев, Т. Григорьева, О.С. Гринченко, В.А. Грицышин, Е.Е. Грицышина, Д. Губер, Л.Н. Губина, Е. Гурдина, Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов, А. Дановский, И.В. Двуреков, М.Б. Дёров, Ю. Диярова, А.Д. Докучаева, М.Л. Долматова, А. Елисеев, С.Л. Елисеев, Г.С. Ерёмкин, А.А. Жеглов, О. Завадская, Г. Замедлин, А. Захаров, П. Зинченко, Е.Н. Золотов, В.А. Зубакин, А. Зубрилова, А. Зуева, А.И. Иванов, А. Иванова, К.В. Ивановский, Ю. Калашников, Д.М. Калинин, В.И. Калинина, В.Д. Калининченко, М.В. Калякин, И.В. Калякина, С. Карасева, А.В. Кац, К. Кердивар, Е. Килина, А.В. Кириллов, Г.Е. Кириллов, О. Кириллов, А.Н. Киселёв, В. Кицес, Д. Кичман, Е. Коберская, Е.А. Коблик, К.И. Ковалёв, М.В. Ковылов, В. Козичев, Д. Козлов, Т. Колесникова, С. Колочинский, К. Колтышева, М.И. Комракова, Д.А. Конов, В.В. Конторщиков, О. Корабельникова,

А.С. Кореньяк, Е. Коркунова, А.Б. Костин, Т. Косых, Д. Кочетков, Д. Крупышева, Т. Кудрявцева, С. Кудряшов, И.В. Кузиков, Р. Кузнецов, А. Кузьмин, М.В. Кузьмин, У.В. Лалак, А. Лапшина, Г. Ларин, А. Левина, К. Леонова, Л.М. Ломоносова, В.Д. Лупанов, С. Лысенков, Е. Максимова, Д. Малов, А. Малофеев, С. Малышева, Е. Мамаева, Н. Маркина, Е.Н. Марченко, Н.В. Мастеркова, И. Матершев, А.А. Меркулова, А.П. Мещерякова, Е. Миронова, С. Михеева, Г. Мищенко, А. Младенчиков, В.А. Моисейкин, Н.С. Морозов, А.С. Мостовая, В. Мочалов, В. Музяк, О.О. Набровенков, Е. Насевелец, С.О. Насонова, М.А. Невский, И.Ю. Неслуховский, Е. Нефёдова, В.А. Нецветаев, В.С. Нигородова, Я. Никитин, М.Е. Никонова, Н. Новикова, С.Ю. Новосёлова, А.В. Носенко, В. Носенко, О. Обухова, А. Овчинников, И. Озеров, Н.В. Остапова, А. Павлова, А.В. Павлушкин, О. Панина, В. Панов, А. Панова, Т.С. Пантелеев, И.М. Панфилова, П.Ю. Пархаев, Г.А. Патрушева, М.Б. Пахлеванова, П.Ф. Пахлеванова, Д. Пашенко, Е.Л. Певницкая, В.А. Перов, М.Д. Перова, В. Петров, М.Е. Петрова, М.А. Печёнкин, Е. Полевая, С.В. Попов, Ю.А. Попова, А. Постовая, В. Потопаева, А. Потапова, О. Пронькин, Ф. Пудовиков, Е.М. Пылёв, О.С. Ракитянская, П. Расстегаев, А. Ровинский, С. Русаков, В.А. Русол, Д. Рысев, К. Саакян, И. Савранский, М.В. Садыкова, А.В. Сазонов, О. Сайфуллин, А.А. Салов, И. Саломатина, А. Салтыкова, Р. Саржант, О. Светличная, В. Седых, А.В. Семёнов, Кс.П. Семёнова, А. Сенкин, В. Сергейчук, Н. Сидорова, С.Б. Симонов, С.А. Скачков, К. Соварцева, Ю.П. Соколов, А. Сторчак, Н. Сыров, К.В. Танаев, Н. Тарасик, Д.Е. Те, Н. Темирова, И.С. Третьякова, Е.Г. Триггер, С. Тюменцева, И.И. Уколов, М.В. Уланова, С.В. Федоринов, М.Г. Федосеева, М. Филатов, С. Филимонов, Е. Филимонова, И.Р. Фирсов, Л. Хасянова, Т.В. Хоханова, М. Хрисанфов, А.А. Хромов, Н.А. Хрусталёва, Я. Цай, А. Цицинова, С.А. Черепушкин, М. Чернова, И. Чугляев, М. Чураева, Н. Чурикова, С. Чурочкин, М.С. Шамин, К.Ю. Шамина, К. Шарло, М.А. Шведко, Е.В. Швыдун, Е. Шеваль, В. Шипилов, А.В. Шипилова, А. Юрьева, Т.Р. Язаров, Э. Якупова, Д. Ямбаев и др.

Всем большое спасибо!

Результаты

В списке в хронологическом порядке указаны даты первых встреч для каждого вида (как правило, до 5; больше — в тех случаях, когда последующие сообщения содержат интересную дополнительную информацию о характере пребывания), место встречи и число птиц. Для точек в Московской обл. указано название округа, для некоторых наиболее посещаемых точек (Виноградовской поймы, Лотошинского и Бисеровского

рыбхозов, Дединовской поймы и др.) название округа приведено только один раз, затем опущено. Названия округов опущены также для одноимённых объектов. Сокращения: М — Москва, НАО — Новомосковский административный округ, ТАО — Троицкий административный округ, ГО — городско округ, МО — муниципальный округ, ГБС — Главный ботанический сад РАН, ЗБС — Звенигородская биологическая станция МГУ.

Чтобы уменьшить объём текста, названия городских и муниципальных округов указаны сокращённо: БАЛ — Балашиха, БОГ — Богородский, БРО — Бронницы, ВОС — Воскресенск, ДОЛ — Долгопрудный, ДОМ — Домодедово, ДУБ — Дубна, КАШ — Кашира, КЛИ — Клин, КОЛ — Коломна, КОР — Королёв, КРА — Красногорск, ЛЕН — Ленинский, ЛОБ — Лобня, ЛОС — Лосино-Петровский, ЛЮБ — Люберцы, МЫТ — Мытищи, НАР — Наро-Фоминский, ОДИ — Одинцовский, ОРЕ — Орехово-Зуевский, ПАВ — Павлово-Посадский, ПОД — Подольск, ПУШ — Пушкинский, СЕРПОС — Сергиево-Посадский, СЕРПУХ — Серпухов, СОЛ — Солнечногорск, СТУ — Ступино, ТАЛ — Талдом, ФРЯ — Фрязино, ХИМ — Химки, ЧЕР — Черноголовка, ЩЁЛ — Щёлково, ВОЛ — Волоколамский, ДМИ — Дмитровский, ЕГО — Егорьевск, ЗАР — Зарайск, ИСТ — Истра, ЛОТ — Лотошино, ЛУХ — Луховицы, МОЖ — Можайский, РАМ — Раменский, РУЗ — Рузский, СЕРПРУД — Серебряные Пруды, ЧЕХ — Чехов, ШАТ — Шатура, ШАХ — Шаховская.

Фамилия наблюдателя указана, если она известна. К сожалению, это не всегда возможно, особенно с данными от eBird.

Для каждого вида в скобках указана самая ранняя дата встречи в Москве и области за период с 1999 по 2024 гг. (по данным программы ПМИП и предыдущих обзоров прилёта в Московке/Новостях Программы ПМИП). В случае особых различий между Москвой и областью (напр. в Москве зимует, в области нет) это также указано в скобках. Необычно ранние сообщения (в тот же день или раньше самой до сих пор известной ранней даты) выделены жирным шрифтом.

В 2025 г. следующие виды были отмечены раньше, чем когда-либо в период 1999–2024 гг.: белый аист, широконоска, малый подорлик, чеглок, перепел, серый журавль, погоныш, малый зуёк, кулик-сорока, черныш, поручейник, перевозчик, турухтан, бекас, большой кроншнеп, большой веретенник, чёрная крачка, белая трясогузка, дроздовидная камышевка, славка-черноголовка, малая мухоловка, белобровик и ремез.

Хронология прилёта показана в таблице.

Большая выпь

Botaurus stellaris (24.03.2007)

28.03 1 у Верзилово, СТУ (Салов)

29.03 1 в Лосином острове, КОР (Максимова)

29.03 2 в Лотошинском р/х, ЛОТ (Авдеев)

30.03 1 там же (Губина, Новосёлова)

30.03 1 в Верхнеяузских болотах, МЫТ (Гончаров)

31.03 1 в МО Луховицы (Ковылов)

3.04 1 в Лотошинском р/х (Голубева, Моисейкин)

5.04 2 там же (Авдеев)

5.04 1 у Тимофеево, СОЛ (Г. Кириллов)

Волчок

Ixobrychus minutus (13.04.2021)

3.05 1 самец у Коломны (Калинин, Калинина)

4.06 1 в Сколково, М. (Баранова)

4.06 12 токующих у Заболотского оз., СЕРПОС (Конторщиков)

7.06 1 у г. Озёры, КОЛ (Авдеев)

8.06 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)

8.06 3 в Сколково, М. (Губер, Кац)

10.06 2 там же (Баранова, Петрова)

10.06 9 токующих у Заболотского оз., СЕРПОС (Гринченко, Конторщиков)

Серая цапля

Ardea cinerea (круглый год)

2.03 1 в Куркино, М. (Голубева, Моисейкин)

4.03 1+ на колонии в Дубне (Великанов)

5.03 1 в Куркино, М. (Швыдун)

8.03 1 в Царицыно, М. (eBird)
9.03 2 в Бисеровском р/х/озе, БОГ (Никитин)
9.03 1 птица в заказнике Поляница, ТАО (Петрова)

Белый аист

Ciconia ciconia (17.03.2021)

14.03 в Северном, ТАЛ (Хромов)
29.03 1 на гнезде у Фёдоровского, МОЖ (Контрощиков)
29.03 пара на гнезде в Карачарово, ВОЛ (Новосёлова)
29.03 пара на гнезде у Становище, ВОЛ (Новосёлова)
29.03 пара на гнезде у Куликово, ВОЛ (Новосёлова)
29.03 1 в Кульпино, ВОЛ (Авдеев)
29.03 1 у Шишково, ВОЛ (М. Кузьмин)
29.03 у Теряево, ВОЛ (Швыдун, Голубева, Моисейкин)
29.03 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)
30.03 2 на гнезде в Куркино, ШАХ (Калякина)
30.03 2 на двух гнёздах в Спасе, ВОЛ (Калякина)
30.03 1 на гнезде в Рюховском, ВОЛ (Калякина)
30.03 1 в Соснино, ВОЛ (Скачков)
30.03 2 в Коняшино, ВОЛ (Скачков)
30.03 пара на гнезде в Кашино, ВОЛ (Новосёлова)
31.03 1 в Соснино, ВОЛ (Петров)
1.04 пара на гнезде в Кашино, ВОЛ (Губина, Малышева)
1.04 2 в Шишково, ВОЛ (Губина, Малышева)
1.04 1 в Калеево, ВОЛ (Губина, Малышева)

Чирок-трескунок

Anas querquedula (12.03.2009/2019)

15.03 2 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
18.03 пара на Яузе у Чугунного моста, МЫТ (А. Кузьмин)
21.03 9 в Дединовской пойме, ЛУХ (Губина, Малышева)
21.03 1 в Лосином острове, МЫТ (eBird)
21.03 1 у Нагатинской наб., М. (Д.В. Давыдов)
22.03 10 в Виноградовской пойме, ВОС (eBird)
22.03 5 на оз. Дубовом, ШАТ (Невский)
22.03 2 в Дединовской пойме (Невский, Нецветаев)
22.03 5 у Погостище, ШАТ (Невский, Нецветаев)
23.03 2 на Верхнеюзских болотах, МЫТ (eBird)
23.03 1 самец у Подмоклово, СЕРПУХ (Дёров)
23.03 2 у Молоково, ЛЕН (Бондарева, Петрова)

Широконоска

Anas clypeata (2.03.2023)

1.03 1 на р. Сукромке в Мытищах (Губер)
8.03 1 там же (Авдеев)
9.03 1 там же (Кац)
20.03 1 самец на р. Яузе в Мытищах (Гончаров)
22.03 1 там же (Губер, Кац)
22.03 1 самец на р. Сукромке в Мытищах (Хрусталёва)
29.03 у Верзилово, СТУ (Салов)
29.03 4 у Бронниц, РАМ (Федоринов)
30.03 3 в Дединовской пойме (Никитин)

Скопа

Pandion haliaetus (22.03.2014)

29.03 1 у Большого Брянцево, ПОД (Великодный, А. Кириллов, О. Кириллов, Ларин)
5.04 1 в Лотошинском р/х (Авдеев, Музяк)
5.04 1 в Измайловском парке, М. (Черепушкин)
8.04 1 в ТиНАО, М. (Балаев)
9.04 1 в Виноградовской пойме (Сидорова)
11.04 1 там же (Белинский)
12.04 1 там же (Баранова, Губер, Кац, Невский, Петрова)
13.04 2–3 там же (Белинский, Бондарева)
13.04 1 в Бисеровском р/х (Голубева)

Осоед

Pernis apivorus (1.05.2021)

3.05 1 у Заслонино, МОЖ (Шамина)
6.05 1 в Лотошинском р/х (Голубева)

8.05 1 там же (Ковалёв)
8.05 1 у Шишково, ВОЛ (Авдеев)
9.05 1 у Чисмен, ВОЛ (Пылёв)
10.05 2 в зоне отдыха Битца, М. (Симонов)
11.05 1 у Ланьшинского карьера, СЕРПУХ (Калининченко, Никитин, Симонов)

Чёрный коршун

Milvus migrans (15.03.2023)

20.03 1 в аэропорту Домодедово (Пантелеев)
23.03 1 у Молоково, ЛЕН (Бондарева, Петрова)
23.03 1 в Рузском МО (Григорьев)
24.03 у Верзилово, СТУ (Салов)
25.03 в Раменском мун. окр. (Сидорова)
27.03 1 у Лубнинки, РАМ (Шамин)
28.03 4 у Остафьево, НАО (Новикова)
28.03 у Верзилово, СТУ (Салов)

Луговой лунь

Circus pygargus (30.03.2002)

17.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
19.04 1 там же (Балаев)
19.04 1 у Шишково, ВОЛ (Авдеев, Горещкая, Губина)
19.04 1 в Лотошинском р/х (Никитин, Сергейчук)
20.04 1–2 в Дединовской пойме (Авдеев, Губина, Ковалёв)
20.04 1 в ГО Коломна (Долматова)
20.04 1 в Виноградовской пойме (Великанов, Д.В. Давыдов)
21.04 2 там же (Попов)
22.04 1 у Константиново, СЕРПОС (Левина, Нигородова)

Полевой лунь

Circus cyaneus (1.03.2008)

7.03 1 в ГО Кашира (Балаев)
8.03 2 у Виноградово, ВОС (Зинченко, Лупанов, Пылёв)
8.03 1 в ГО Ступино (Салтыкова)
9.03 1 у Тарасково, КАШ (Губина, Григорьева, Шведко, Язаров)
10.03 1 самка у Бисеровского р/х (Шведко)
12.03 у Черкизово, КОЛ (М. Пахлеванова)
15.03 1 самец, 1 самка у Ворыпаево, ПОД (Д.В. Давыдов)

Болотный лунь

Circus aeruginosus (11.03.2014)

18.03 1 на Яузе у Чугунного моста, МЫТ (А. Кузьмин)
23.03 1 на Верхнеюзских болотах МЫТ (А. Кириллов, Лупанов)
28.03 1 в Лотошинском р/х (Сидорова)
29.03 1 там же (Голубева, Моисейкин, Швыдун)
29.03 1 в Сергиево-Посадском ГО (Мизяк)
29.03 1 в Мытищах (Панина)
30.03 1 в Лотошинском р/х (Губина)
30.03 1 самец у Шишково, ВОЛ (Новосёлова)
30.03 1 в Яхромской пойме, ДМИ (eBird)

Канюк

Buteo buteo (круглый год)

1.03 1 в Мытищах (Гончаров)
5.03 в ГБС, М. (Голубева, Моисейкин)
5.03 1 у Сергиева Посада (Салов)
6.03 в Дединовской пойме (Голубева, Моисейкин)
7.03 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)
7.03 1 у Балашихи (Шведко)
7.03 1 у Сергиева Посада (Салов)
8.03 1 у Тарбушево, КОЛ (Асоцкий)
8.03 1 у Макаровки, РАМ (Шамин, Шамина)
8.03 1 у Борисово, РАМ (Шамин, Шамина)
8.03 у Таболово, ЛЕН (М. и П. Пахлевановы)
8.03 1 у Грибаново, КРА (Новосёлова)

8.03 1 у Ивановки, ОДИ (Новосёлова)
 8.03 1 у Спасского, КЛИ (Д.В. Давыдов)
 8.03 у Елгозино, КЛИ (Голубева, Моисейкин)
 8.03 1 у Шепелево, СЕРПОС (Садыкова)

Малый подорлик

Aquila pomarina (2.04.2023)

1.04 1 у Бирево, КЛИ (Боровская, Русол)
 12.04 в Лотошинском р/х (Левина)
 14.04 1 в ТиНАО (Саакян)
 18.04 1–2 у Максимово, ЛОТ (Нецветаев)
 19.04 2–3 у Волково, ЛОТ (Невский, Нецветаев)
 19.04 2 в Виноградовской пойме (Гончаров)

Большой подорлик

Aquila clanga (14.03.2002)

5.04 1–2 в Журавлиной родине, ТАЛ / СЕРПОС (Великанов, Губина, Д.В. Давыдов, Мамаева, Тригер, Шведко)
 11–15.04 1 в Лотошинском рыбхозе (Голубева)
 19.04 1 у Ольшан, ЛУХ (Конов)
 20.04 4–6 в Дединовской пойме (Авдеев, Губина, Ковалёв)
 26.04 2 там же (Федосеева)
 26.04 3 в Лотошинском р/х (Авдеев, Ковалёв, Пархаев)
 26.04 1 у Шишково, ВОЛ (Ковалёв, Пархаев)

Чеглок

Falco subbuteo (6.04.2003)

31.03 1 (по голосу; запись) в Останкинском парке, М. (eBird)
 25.04 1 в Рублёво, М. (Герасимова)
 26.04 1 в Лотошинском р/х (Авдеев, Ковалёв, Пархаев)
 3.05 в окр. Сипягинского пруда, ТАО (Корабельникова)
 4.05 3 в Лотошинском р/х (Авдеев)
 5.05 1 там же (Постовая, Пылёв, Ямбаев)
 5.05 2 на Воробьёвых горах, М. (Виноградов)
 5.05 1 в Медведково, М. (Хрусталёва)

Перепел

Coturnix coturnix (30.04.2004/2007/2008/2015)

24.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 26.04 1 там же (Павлушкин)
 2.05 3 у Верховляни, СТУ (Насонова, Салов)
 6.05 у Сергиева-Посада (Салов)
 7.05 1 у Орехово-Зуева (М. Пахлеванова)
 13.05 1 у Воронино, СЕРПОС (Насонова, Салов)

Серый журавль

Grus grus (20.03.2010)

17.03 1 у Рязановского, ЕГО (Невский)
 21.03 2 там же (Невский, Нецветаев)
 22.03 3 у Тельмы, ШАТ (Невский, Нецветаев)
 22.03 1 у Константиново, СЕРПОС (Меркулова)
 23.03 5 там же (Конторщиков)
 24.03 2 в Дединовской пойме (Шамин, Шамина)
 24.03 8 в Виноградовской пойме (Марченко)
 24.03 34 в Лосином острове, КОР (Ковылов)

Погоньш

Porzana porzana (8.04.2024)

7.04 1 у Бужаниново, СЕРПОС (Салов)
 16.04 1 у Каверино, ВОЛ (Русол)
 19.04 у Жёрновки, СЕРПУХ (Салов, Насонова)
 19.04 1 южнее Дубровки, ОРЕ (Баженова)
 19.04 2 у Максимово, ЛОТ (Нецветаев)
 19.04 1 у Осаново, ШАТ (Ракитянская, Будин)
 20.04 у Тарасково, КАШ (Салов, Насонова)
 20.04 1 у Шорново, РУЗ (Г. Кириллов)
 20.04 2 у Максимово, ЛОТ (Нецветаев)
 20.04 1 мёртвая птица, Битца, М. (СОПР)
 21.04 1 у Макаровки, РАМ (Шамин, Шамина)
 21.04 2 у Максимово, ЛОТ (Нецветаев)

Коростель

Crex crex (27.04.2000/2013)

3.05 1 у Коломны (Калинин, Калинина)
 5.05 1 у Протвино, СЕРПУХ (Фирсов)
 6.05 1 у Старого Бобренево, КОЛ (Сидорова)
 7.05 1 в Виноградовской пойме (Никитин)
 7.05 у Орехово-Зуева (М. Пахлеванова)
 7.05 1 у Коломны (Саломатина, Сидорова)
 8.05 1 у Каргашино, СЕРПУХ (Дёров)
 8.05 2 у Щеглятьево, ДОМ (Дёров)
 8.05 3 у Большого Алексеевского, СТУ (Шамина)
 8.05 1 в Виноградовской пойме (Шипилова)
 8.05 2 у Богачёво, ОДИ (Г. Кириллов)
 8.05 1 у Луцино, ОДИ (Авилова)
 8.05 1 у Глухово, КРА (Губина)
 8.05 2 у Красногорска (Григорьев)
 8.05 1 у Бурцевских прудов, М. (Губер)

Лысуха

Fulica atra (круглый год)

1.03 1 у пос. Фабрики им. 1 Мая, М. (Гельметдинов)
 1.03 38–50 в Мытищах (Гончаров, Губер)
 4.03 2 на р. Яузе в Ростокино, М. (Кудрявцева)
 8.08 там же (Кудрявцева)
 8.03 2 в Мытищах (Яуза) (Виноградов)
 8.03 10–22 в Мытищах (Сукромка) (Авдеев, Гончаров)
 9.03 3 у наб. Марка Шагала, М. (Русаков)
 9.03 6 в Крылатском, М. (Сазонов)
 9.03 20 в Мытищах (Кац)
 10.03 1 в Царицыно, М. (Дановский)
 10.03 6 в Крылатском, М. (Патрушева)
 10.03 2 на р. Яузе в Ростокино, М. (Кудрявцева)

Камышница

Gallinula chloropus (круглый год)

3.03 на р. Яузе в Свиблово, М. (Голубева, Моисейкин)
 8.03 2 в Мытищах (Сукромка) (Гончаров)
 22.03 1 на р. Яузе в Свиблово, М. (Авдеев)
 23.03 1 на Верхнем Джамгаровском пруду, М. (Хрусталёва)
 28.031 в Красногорске (Григорьев)
 28.03 на Верхнеязузских болотах, МЫТ (Голубева)

Малый зуёк

Charadrius dubius (5.04.2024)

5.04 1 в Озёрах, КОЛ (Киселёв)
 5.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
 9.04 у Парфентьево, КОЛ (Долматова)
 10.04 1 в Сколково, М. (Борисов)
 10.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 13.04 в Бисеровском р/х (Голубева)
 13.04 2 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Калининченко)
 14.04 2 там же (Губина, Малышева)
 15.04 4 у Большого Брянцево, ПОД (Пронькин)
 15.04 1 у Слободы, ЛЕН (Калининченко)
 15.04 в Лотошинском р/х (Голубева, Моисейкин)

Чибис

Vanellus vanellus (3.03.2024)

5.03 2 у Поярково, ХИМ (Садыкова)
 7.03 10 (пролёт) в Осеево, ЛОС (Шведко)
 7.03 4 у Луговой, ЛОБ (Перова)
 7.03 в ЗАО, М. (Соварцева)
 8.03 1 у Подмоклово, СЕРПУХ (Дёров)
 8.03 7 в Виноградовской пойме (Зинченко, Лупанов, Пылёв)
 8.03 18 у Жирошкино, РАМ (Шамин, Шамина)
 8.03 5 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)

8.03 15 у Ильинского, КРА (Новосёлова)
 8.03 1 у Ивановки, ОДИ (Новосёлова)
 8.03 50 у Дятлово, КЛИ (Д.В. Давыдов)
 8.03 в ГО Клин (Населевец)
 8.03 у Калеево, ВОЛ (Голубева, Моисейкин)
 8.03 50 в Волоколамском мун. окр. (Голубева, Д.В. Давыдов)
 8.03 7 в ТиНАО (Балаев)
 9.03 1 у Куркино, ШАХ (Калякин, Калякина)
 9.03 2 у Фомкино, ШАХ (Калякин, Калякина)
 9.03 3 в Бисеровском р/х (Никитин)
 9.03 4 у Тарасково, КАШ (Губина, Григорьева, Шведко, Язаров)
 9.03 8 в Виноградовской пойме (Зубакин)
 9.03 у Ильинского, КРА (Голубева, Моисейкин)
 9.03 4 у Новосиньково, ДМИ (Д.В. Давыдов)
 9.03 2 у Костенёво, ТАЛ (Уколов)
 9.03 1+ в Журавлиной родине (Гринченко)
 9.03 в окр. Фрязино (Шипилов)
 9.03 в ТиНАО (Балаев)

Кулик-сорока

Haematopus ostralegus (31.03.2024)

27.03 1 у Дубны (iNaturalist)
 5.04 2 у Подмоклово, СЕРПУХ (Дёров)
 5.04 2 у Ланьшинского карьера, СЕРПУХ (Дёров)
 5.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
 8–10.04 2 у Рыжовского пруда, ТАО (Балаев, Дёров и др.)
 10.04 у Подмоклово, СЕРПУХ (Дёров)
 13.04 1 у Шишково, ВОЛ (Авдеев)
 18.04 1 у Жёрновки, СЕРПУХ (Насонова)

Черныш

Tringa ochropus (27.03.2004/2023)

22.03 1 в окр. г. Озёры, КОЛ (Киселёв)
23.03 1 у Ловцово, СТУ (Салов)
24.03 1 в Виноградовской пойме (Никитин)
 28.03 у Ловцово, СТУ (Салов)
 29.03 у Верзилово, СТУ (Салов)
 29.03 1 у Дмитровского Погоста, ШАТ (Уколов)
 29.03 1 у Юрцово, ЕГО (Кердивар, Лапшина, Остапова, Потопаева, Черепушкин)
 29.03 1 у Соболево, ОРЕ (Д.В. Давыдов, Меркулова, Насонова, Салов)
 29.03 в Лосином острове, КОР (Беляков)
 29.03 2 у Лесодолгоруково, ИСТ (Семёнова)
 29.03 1 у Овсянниково, ДМИ (Садыкова)

Фифи

Tringa glareola (3.04.2004)

17.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 19.04 1 там же (Балаев)
 19.04 1 у Шишково, ВОЛ (Никитин, Сергейчук)
 20.04 2–5 у Большого Брянцево, ПОД (Калининченко, Павлушкин)
 20.04 в Лотошинском р/х (Голубева, Моисейкин)
 21.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Пронькин)
 22.04 2 там же (Калининченко, Симонов)
 22.04 в Лотошинском р/х (Голубева, Моисейкин)

Большой улит

Tringa nebularia (25.03.2015)

31.03 1 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
 1.04 1 там же (Калининченко)
 3.04 3 там же (Д.В. Давыдов, Косых)
 3.04 в Лотошинском р/х (Голубева, Моисейкин)
 5.04 1 в Виноградовской пойме (Гончаров)
 5.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Пронькин)
 9.04 в Покровском-Стрешнево, М. (Беляков)

Травник

Tringa totanus (14.03.2020)

23.03 в ГО Воскресенск (Долматова)
 24.03 2 в Виноградовской пойме (Никитин)
 24.03 12 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов, Нефёдова)
 26.03 2 у Научного городка, ЛОБ (Перова)
 26.03 в ГО Воскресенск (Саломатина)
 26.03 1 в Братеевской пойме, М. (Д.В. Давыдов)
 26.03 в ГО Подольск (Уланова)
 27.03 22 у Большого Брянцево, ПОД (Губина)
 27.03 у Константиново, СЕРПОС (Голубева)
 29.03 1 у Акатово, ЕГО (Лапшина, Никитин, Остапова, Потопаева, Черепушкин)
 29.03 3–8 у Большого Брянцево, ПОД (Ларин и др.)
 29.03 6 у Научного городка, ЛОБ (Перов, Перова)
 29.03 1 у Щёлково (Шведко)

Поручейник

Tringa stagnatilis (7.04.2024)

6.04 1 в Лотошинском р/х/озе (Никитин)
7.04 там же (Никитин)
 15.04 там же (Голубева, Моисейкин)
 16.04 3 там же (eBird)
 18.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Набровенков)
 18.04 1 у Шишково, ВОЛ (Нецветаев)
 19.04 1 там же (Губер, Кац)
 19.04 15 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 19.04 4 в Лотошинском р/х (Авдеев)
 19.04 1 у Грибаново, ЛОТ (Невский, Нецветаев)
 19.04 2 у Петраково, ДМИ (Конторщиков)
 20.04 2–4 в Виноградовской пойме (Белинский, Д.В. Давыдов, Потопаева, Черепушкин)
 20.04 1 там же (Белинский, Брандт, Власова, Карасева, Никитин, Потопаева)
 20.04 1–5 у Большого Брянцево, ПОД (Калининченко, А. Носенко, Павлушкин, Симонов)
 20.04 2–5 в Лотошинском р/х (Зуева, Килина, Лупанов)
 20.04 1 там же (Ларин)
 20.04 1 у Шишково, ВОЛ (Долгоруков, Остапова, Попова)

Перевозчик

Actitis hypoleucos (30.03.2024)

26.03 у Верзилово, СТУ (Салов)
 1.04 1 у Леонтьево, СТУ (Салов)
 7.04 1 у Иглово, ОДИ (А. Меркулова)
 13.04 1 в Виноградовской пойме (Бондарева)
 14.04 1 в Клину (Докучаева)
 15.04 2 у Аксиньино, ОДИ (Д.В. Давыдов)
 15.04 1 в Тимирязевском парке, М. (Кузиков, Набровенков)

Мородунка

Xenus cinereus (14.04.2002)

17.04 3 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 19.04 2 у Петраково, ДМИ (Конторщиков)
 20.04 1 в Лотошинском р/х (Ларин)
 21–25.04 2–4 у Большого Брянцево, ПОД (Голованова, Губина, Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов, Калининченко, Левина, Пронькин, Симонов)
 26.04 1 у Дорофеево, ОРЕ (Невский)

Турухтан

Philomachus pugnax (7.04.2001/2024)

26.03 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
29.03 7 в Дединовской пойме (Никитин)
1.04 в Виноградовской пойме (Зубакин)
2.04 в Бисеровском р/х (Саломатина)
4.04 1 в Виноградовской пойме (Шипилова)

5.04 1 там же (Левина, Нигородова)

6.04 1 в Лотошинском р/х/озе (Никитин)

12.04 10 в Виноградовской пойме (Баранова, Губер, Кац, Невский, Петрова)

Бекас

Gallinago gallinago (23.03.2014)

22.03 у р. Скалба, ПУШ (Тюменцева)

24.03 1 у Санниково, ИСТ (Меркулова)

25.03 1 у Озерецкого, ДМИ (Садыкова)

27.03 1 у Большого Брянцево, ПОД (Губина, Уланова)

27.03 1 в Лосином острове, МЫТ (Гончаров)

28.03 2 в ГО Ступино (Салтыкова)

29.03 1 в Виноградовской пойме (Конов)

29.03 1 у Соболево, ОРЕ (Д.В. Давыдов, Меркулова, Насонова, Салов)

29.03 2 у Драньково, ЕГО (Насонова, Салов)

29.03 1 у Овсянниково, ДМИ (Садыкова)

29.03 1 у Лесодолгоруково, ИСТ (Семёнова)

Дупель

Gallinago media (26.03.2014)

18.04 2 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)

19.04 5 в Виноградовской пойме (Гончаров)

20.04 3 там же (Д.В. Давыдов, Никитин, Черепушкин)

20.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Калининченко)

20.04 1 в Мнёвниках, М. (Сазонов)

20.04 2 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)

22.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Калининченко, Симонов)

24.04 1 там же (Д.В. Давыдов)

25.04 там же (Голубева)

2.05 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)

Вальдшнеп

Scolopax rusticola (10.03.2015)

14.03 1 на ул. Вавилова, М. (сообщ. Д.В. Давыдов)

17.03 1 в парке Долгие Пруды, М. (Д.В. Давыдов)

22.03 2 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)

24.03 у Верзилово, СТУ (Салов)

26.03 там же (ru-birds)

26.03 1 у Лупаново, ДМИ (Уколов)

26.03 в Лосином острове, КОР (Ковылов)

27.03 у Верзилово, СТУ (Салов)

27.03 1 у Малыгино, ТАО (Д.В. Давыдов)

27.03 5 у Репотино, ШАХ (Петров)

28.03 у Верзилово, СТУ (Салов)

28.03 1 у Митенино, НАР (Коркунова)

28.03 1 у р. Язузы в Ростокино, М. (Великодный)

Большой кроншнеп

Numenius arquata (30.03.2014)

29.03 10 в Дединовской пойме (Кердивар, Лашина, Никитин, Остапова, Потопаева, Черепушкин)

29.03 1 у Тиунцево, МОЖ (Конторщиков)

29.03 в Лотошинском р/х (Коновалов)

1.04 8 у Кочкорево, СТУ (Салов)

3.04 в Лотошинском р/х (А. Голубева)

4.04 в Дединовской пойме (Долматова)

4.04 у Константиново, СЕРПОС (Голубева)

5.04 в окр. г. Озёры, КОЛ (Киселёв)

5.04 9 в Виноградовской пойме (Левина, Нигородова)

5.04 1 у Сергиева-Посада (Салов)

5.04 1–3 у Константиново, СЕРПОС (Великанов, Векликанова, Д.В. Давыдов, Мамаева, Тригер, Шведко)

5.04 5 у Бобошино, СЕРПОС (ru-birds)

5.04 2 в Журавлиной родине (Великанов, Векликанова, Д.В. Давыдов, Мамаева, Тригер, Шведко)

Большой веретенник

Limosa limosa (6.04.2014/2024)

29.03 в Лотошинском р/х (Коновалов)

31.03 1 в Виноградовской пойме (Никонорова)

1.04 3 в Лотошинском р/х (Губина, Малышева)

3.04 там же (Голубева)

5.04 6–8 у Константиново, СЕРПОС (Великанов, Векликанова, Губина, Д.В. Давыдов, М. Кузьмин, Мамаева, Тригер, Шведко)

6.04 5 в Лотошинском р/х (Никитин)

12.04 12–15 в Виноградовской пойме (А. Баранова, Белинский, Губер, Кац, Невский, Петрова)

12.04 20 в Лотошинском р/х (Губина, Д.В. Давыдов, Шведко, Шурыгина, Язаров)

12.04 12 у Белой Колпи, ШАХ (Шамин, Шамина)

13.04 200 в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Калининченко)

13.04 18 в Виноградовской пойме (Бондарева)

13.04 6–50 в Лотошинском р/х (Авдеев, Филатов)

Озёрная чайка

Larus ridibundus (круглый год)

2.03 1+ в ЮБАО, М. (Горбунова, Калининченко, Пудовиков)

4.03 1+ там же (Балаев)

4.03 42 на Кожуховском затоне, М. (Скачков, Шведко)

5.03 1+ там же (Голубева, Скачков)

5.03 1+ в ЮБАО и ЮАО, М. (Салтыкова и др.)

8.03 2 в Царицыно, М. (Белинский)

9.03 25 в Марьино, М. (Валеев)

9.03 2–3 в Бисеровском р/х (Никитин, Шведко)

Речная крачка

Sterna hirundo (28.03.2007)

18.04 у Большого Брянцево, ПОД (Голубева, Моисейкин)

19.04 в Серпухове (Фирсов)

20.04 в окр. г. Озёры, КОЛ (Киселёв)

20.04 1 в Виноградовской пойме (Белинский, Д.В. Давыдов)

20.04 1 у Лопотово, СОЛ (Рысев)

20.04 2 на Барских прудах, ЩЁЛ (Шипилова)

21.04 2 там же (Шипилова)

21.04 в Куркино, М. (Швыдун)

22.04 в Строгино, М. (Д.В. Давыдов)

22.04 в Лотошинском р/х (Голубева, Моисейкин)

22.04 2 на Барских прудах, ЩЁЛ (Шипилова)

22.04 3 в Клину (Попова)

Малая крачка

Sterna albifrons (29.04.2001)

17.05 в ГО Серпухов (М. Дёров)

18.05 1 у Зиброво, СЕРПУХ (Нецветаев)

20.05 в Озёрах, КОЛ (Киселёв)

24.05 1–2 у Зиброво, СЕРПУХ (Брандт, Калашников, Малов, Остапова, Черепушкин)

24.05 3 у Подмоклово, СЕРПУХ (Брандт, Журавлёва, Калашников, Малов, Остапова, Потопова, Черепушкин)

25.05 у Зиброво, СЕРПУХ (Голубева)

Белокрылая крачка

Chlidonias leucopterus (20.04.2024)

27.04 1 в Лотошинском р/х (Д.В. Давыдов, А. Носенко, В. Носенко)

4.05 2 там же (Авдеев)

5.05 там же (Постовая, Пылёв, Ямбаев)

5.05 на Рыжовском и Сипягинском прудах, ТАО (Балаев)

10.05 у Старой Ситни, СТУ (Голубева)

13.05 в Бисеровском р/х (Голубева)
 17.05 в ГО Серпухов (Дёров)
 17.05 1–10 в Виноградовской пойме (Баранова, Григорьева, Губер, Кац, Третьякова, Цай)
 17.05 1 в Бисеровском р/х (Федосеева)
 17.05 1 у Шишково, ВОЛ (Д.В. Давыдов)
 17.05 1–4 в Лотошинском р/х (Авдеев, Брандт, Калинин, Никитин, Пархаев, Симонов, Черепушкин)

Чёрная крачка

Chlidonias niger (20.04.2008/2024)

18.04 3–6 в Лотошинском р/х (Нецветаев)
 19.04 там же (Невский, Нецветаев)
 20.04 в окр. г. Озёры, КОЛ (Киселёв)
 22.04 1 в Строгино, М. (Д.В. Давыдов)
 22.04 7 в Лотошинском р/х (Губина)
 24.04 20 в Виноградовской пойме (Никонорова)
 25.04 2 в Лотошинском р/х (Саржант)
 26.04 315 там же (Авдеев, Ковалёв, Пархаев, Хоханова)

Кукушка

Cuculus canorus (15.04.2015)

16.04 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Ковылов)
 19.04 1 у Осаново-Дубового, ШАТ (Будин, Ракитянская)
 19.04 1 в ЮАО, М. (Семёнов)
 20.04 1 у Никифорово, СЕРПУХ (Дёров)
 20.04 1 в ГО Ступино (Салтыкова)
 20.04 1 в ЗБС, ОДИ (Бондарева)
 20.04 1 в Куркино, М. (Пашенко)
 20.04 2 у Коняшино, РАМ (Бахмарин)
 21.04 2 у Максимова, ЛОТ (Нецветаев)
 22.04 1 в Коломне (Калинин, Калинина)
 22.04 1 у Макаровки, РАМ (Шамин, Шамина)
 22.04 2 у Булыгино, РУЗ (Г. Кириллов)
 23.04 2 у Макаровки, РАМ (Шамин, Шамина)
 23.04 2 южнее Дубровки, ОРЕ (Сазонов)

Козодой

Caprimulgus europaeus (19.04.2008/2014)

17.05 1 у Виноградово, ВОС (Григорьева, Третьякова, Цай)
 17.05 2 у Осаново-Дубового, ШАТ (Будин, Ракитянская)
 17.05 в Черниговском лесу, СЕРПОС (Салов)
 18.05 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков, Колтышева)
 20.05 1 у Михайловской, ШАТ (Уколов)
 21.05 1 в Анискино, ЛОС (Горин)
 22.05 в ботсаду МГУ, М. (Морозов)
 24.05 1 у Михайловской, ШАТ (Уколов)

Чёрный стриж

Apus apus (23.04.2012)

3.05 2 в Виноградовской пойме (Пархаев)
 5.05 6 в Коломне (Калинин, Калинина)
 5.05 в Дубне (Великанов)
 6.05 в Железнодорожном, БАЛ (М. Пахлеванова)
 6.05 1 в Лотошинском р/х (Голубева, Калинин, Черепушкин)
 7.05 4 в Фосфоритном, ВОС (Никонорова)
 7.05 у Малиновских Лугов, ОРЕ (М. Пахлеванова)
 7.05 1 в Анискино, ЛОС (Горин)
 8.05 8 у Сипягинского пруда, ТАО (Симонов)
 8.05 2 в Измайловском парке, М. (eBird)
 8.05 3 у Петрищево, РУЗ (Сазонов)
 8.05 15 у Лохина острова, КРА (Губина)
 8.05 6 в Лотошинском р/х (Авдеев, Горецкая, Ковалёв)

Золотистая щурка

Merops apiaster (27.04.2019)

14.05 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Голубева, Губина)
 15.05 у Бронниц (М. Пахлеванова)

16.05 1+ у Молоково, ЛЕН (Ерёмки)
 17.05 2 у Куребино, СЕРПРУД (Садыкова)
 21.05 8 (3 пары у нор) в р/х «Осёнка», КОЛ (Калининченко)
 21.05 3 у Лисьих Нор, ЛУХ (Калининченко)
 21.05 1 в Анискино, ЛОС (Горин)
 22.05 1 у Новоходькино, ЛУХ (Симонов)

Удод

Upupa epops (8.04.2007)

12.04 1 в окр. г. Озёры, КОЛ (Киселёв)
 18.04 1 у Протвино, СЕРПУХ (Фирсов)
 20.04 1 в Виноградовской пойме (Никитин)
 20.04 1 там же (Д.В. Давыдов, Никитин)
 27.04 1 в Лотошинском р/х (Калининченко, Никитин)
 8.05 1 у Артюхино, РУЗ (Колочинский)
 18.05 1 у Зиброво, СЕРПУХ (Нецветаев)
 3.06 2 в Дединовской пойме (Калининченко, Симонов)
 3.06 1 у г. Озёры, КОЛ (Калининченко, Симонов)
 7.06 1 там же (Авдеев)
 7.06 у Пушино, СЕРПУХ (Голубева)

Вертишейка

Jynx torquilla (11.04.2024)

15.04 1 у Аксиньино, ОДИ (Д.В. Давыдов)
 16.04 1 в Клину (Докучаева)
 17.04 1 в Красногорске (Д.В. Давыдов)
 19.04 1 у Марушкино, НАО (ru-birds)
 19.04 1 в Куркино, М. (Голубева, Моисейкин, Швыдун)
 19.04 1 в Строгино, М. (Беляков)
 20.04 1 там же (Саакян)
 20.04 2 в Виноградовской пойме (Д.С. Давыдов, Никитин, Черепушкин)
 20.04 1 в Дединовской пойме (Авдеев, Губина, Ковалёв)
 20.04 2 у Лисьих Нор, ЛУХ (Авдеев, Губина)
 20.04 1 у Макаровки, РАМ (Шамин, Шамина)
 20.04 1 у Шахово, ТАО (Грицышина)
 20.04 2 у Дорохово, РУЗ (Мочалов)

Вяхирь

Columba palumbus (3.03.2024)

8.03 1 у Большого Алексеевского, СТУ (Шамина)
 10.03 1 на Воробьёвых горах, М. (Морозов)
 10.03 1 у Ильинского, КРА (Мочалов)
 11.03 1 у Макаровки, РАМ (Шамин, Шамина)
 11.03 1 в Щельпино, ВОС (Зубакин)
 13.03 1 в Дединовской пойме (Шамин)
 14.03 1 у Буково, ЛУХ (Двуреков)
 15.03 6 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 15.03 2 у Константиново, СЕРПОС (Конторщиков)
 15.03 1 в Щельпино, ВОС (Зубакин)

Клинтух

Columba oenas (1.03.2000/2022)

2.03 2 у Топканово, КАШ (Уланова, Черепушкин, Шарло)
 2.03 1 у Струпны, ЗАР (Назаров, Уланова, Черепушкин, Шарло)
 6.03 в Дединовской пойме (Голубева, Сидорова)
 7.03 3 в Осеево, ЛОС (Шведко)
 7.03 в ГО Кашира (Балаев)
 8.03 8 в Виноградовской пойме (Зинченко, Лупанов, Пылёв)
 8.03 4 у Ильинского, КРА (Новосёлова)
 9.03 6 у Тарасково, КАШ (Губина, Шведко, Язаров)
 9.03 у Ильинского, КРА (Голубева, Моисейкин)
 9.03 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)
 9.03 в Ермолино, ДМИ (Д.В. Давыдов)

Обыкновенная горлица

Streptopelia turtur (8.03.2004)

20.05 1 у Маланьино, МОЖ (Шамина)

30.05 1 у Архангельского, РУЗ (Сазонов)
 7.06 2 у Лисьих Нор, ЛУХ (Ларин)
 12.06 1 там же (Д.В. Давыдов)
 12.06 1 у Госконюшни, СТУ (Насонова, Салов)
 15.06 1 у Стрешневых Гор, ЛОТ (Авдеев)
 28.06 1 у Мاستищего, ЛОТ (Авдеев)

Береговушка

Riparia riparia (14.04.2024)

19.04 в ГО Серпухов (Насонова)
 21.04 в Семеново, МОЖ (СОПР)
 26.04 2–5 в Лотошинском р/х (Авдеев, Ковалёв, Пархаев)
 26.04 в Яхромской пойме, ДМИ (Кореняк)
 26.04 у Шишково, ВОЛ (Авдеев)
 27.04 100 там же (Калининченко, Никитин)
 27.04 10 у Черноголовки (eBird)
 27.04 1–5 в Лотошинском р/х (Д.В. Давыдов, Калининченко, Никитин)
 27.04 6 в Царицыно, М. (Юрьева)

Деревенская ласточка

Hirundo rustica (25.03.2023)

4.04 1 в Подольске (Д.В. Давыдов)
 5.04 3 в Виноградовской пойме (Гончаров)
 11.04 1 у Солнышково, ЧЕХ (Дёров)
 12.04 1 в Старом Бобреново, КОЛ (Сидорова)
 19.04 2 в Лотошинском р/х (Губер, Кац)
 20.04 1–2 в Дединовской пойме (Авдеев, Губина, Ковалёв)
 20.04 1 в Коломне (Калинин, Калинина)
 20.04 2 у Федосино, ВОЛ (Скачков)
 20.04 1–3 в Виноградовской пойме (Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов, Никитин)

Воронок

Delichon urbica (13.04.2004/2008)

20.04 5 в Лисьих Норах, ЛУХ (Авдеев, Губина)
 20.04 10 в Дединовской пойме (Авдеев, Губина, Ковалёв)
 20.04 в Рассудово, ТАО (М. и П. Пахлевановы)
 20.04 в Балашихе (А. Кириллов)
 20.04 в Сергиево-Посадском ГО (iNaturalist)
 22.04 в Апрелевке, НАР (М. Пахлеванова)
 23.04 в Балашихе (А. Кириллов)
 24.04 в Татаринцево, РАМ (М. Пахлеванова)
 25.04 5 в Фосфоритном, ВОС (Никонорова)
 26.04 в Пушино, СЕРПУХ (Архипов)
 26.04 10 у Быково, МОЖ (Конторщikov)
 26.04 1–4 в Лотошинском р/х (Авдеев, Ковалёв, Пархаев, Хоханова)

Лесной жаворонок

Lullula arborea (13.03.2002)

17.03 1 у Рязановского, ЕГО (Невский)
 21.03 2 там же (Невский, Нецветаев)
 21.03 3 у Протвино, СЕРПУХ (Фирсов)
 21.03 в Орехово-Зуевском ГО (Васильев)
 21.03 в ГО Серпухов (Фирсов)
 22.03 2 у Голубых озёр, ЛУХ (Д.В. Давыдов, Симонов)
 22.03 15 у Лесного, ЛУХ (Невский, Нецветаев)
 23.03 пара у Никифорово, СЕРПУХ (Дёров)
 23.03 1 у Фосфоритного, ВОС (Никонорова)
 24.03 1 у Хорлово, ВОС (Никонорова)
 29.03 1 у Рогачёво, МОЖ (Конторщikov)
 29.03 2 у Надеино ШАТ (Уколов, Меркулова)

Полевой жаворонок

Alauda arvensis (4.03.2008)

7.03 13 (пролёт) в Осеево, ЛОС (Шведко)
 7.03 в Бисеровском р/х (Скачков)
 7.03 1 в Богородском ГО (iNaturalist)

8.03 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
 8.03 в ГО Ступино (Салтыкова)
 8.03 5 у Подмоклово, СЕРПУХ (Дёров)
 8.03 1 у Валового, РАМ (Шамин, Шамина)
 8.03 2 у Жирошкино, РАМ (Шамин, Шамина)
 8.03 4 в Виноградовской пойме (Зинченко, Лупанов, Пылёв)
 8.03 3 у Октябрьского, ЛЮБ (Бондарев, Пронькин)
 8.03 5 у Богачёво, ОДИ (Г. Кириллов)
 8.03 в ГО Клин (Населевец)
 8.03 1 у Клинского р/х, КЛИ (Голубева, Д.В. Давыдов, Ларин, Моисейкин)
 8.03 15 у Грибаново, КРА (Новосёлова)
 8.03 45 у Ильинского, КРА (Новосёлова)
 8.03 1 в Лотошинском р/х (Д.В. Давыдов, Ларин)
 9.03 20 у Тарасково, КАШ (Григорьева, Губина, Шведко, Язаров)
 9.03 1+ в Виноградовской пойме (Зубакин)
 9.03 1 в Царицыно, М. (Вишневский)
 9.03 у Ильинского, КРА (Голубева, Моисейкин)
 9.03 20 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)
 9.03 у Головино, ИСТ (Мастеркова)
 9.03 2 в Бисеровском р/х (Никитин)
 9.03 у Ермолино, ДМИ (Д.В. Давыдов)
 9.03 1 в Журавлиной родине (Гринченко)
 9.03 в ТиНАО (Балаев)
 9.03 1 в Ильинском, КРА (Голубева, Моисейкин)
 9.03 в ГО Подольск (Т. Косых)
 10.03 3 у Сипягинского пруда, ТАО (Д.В. Давыдов)
 10.03 1 у Нового Снопка, ОРЕ (Сазонов)
 10.03 30 у Ильинского, КРА (Мочалов)
 10.03 10 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)
 11.03 1 у Тарасково, КАШ (Коновалов)
 11.03 20–30 у Ильинского, КРА (Губина, Набровенков)
 11.03 1 в Черноголовке (Мартьянова)
 11.03 в Куркино, М. (Швыдун)
 11.03 2 в Клину (Докучаева)

Лесной конёк

Anthus trivialis (22.03.2014)

5.04 1 у Шарапово, ШАТ (Меркулова, Уколов)
 16.04 1 в зоне отдыха Битца, М. (Симонов)
 16.04 1 южнее Дубровки, ОРЕ (Баженова)
 16.04 1 в Дединово, ЛУХ (Ковылов)
 16.04 в Куркино, М. (Швыдун, Голубева, Моисейкин)
 16.04 в ТиНАО (Балаев)
 17.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
 17.04 1 южнее Дубровки, ОРЕ (Баженова)
 17.04 в Куркино, М. (Швыдун)
 17.04 4 у посёлка Кирпичного Завода, НАО (Мочалов)
 18.04 4 у Софьино, ТАО (Грицышин)
 18.04 1 южнее Дубровки, ОРЕ (Баженова)
 18.04 3 у Вереи, ОРЕ (Сазонов)
 18.04 2 у Тимошкино, ОДИ (Черепушкин)
 18.04 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)
 18.04 6 у Максимова, ЛОТ (Нецветаев)
 19.04 2 у Старого, СТУ (Пантелеев)
 19.04 1 у Липкино, РАМ (Шамин, Шамина)
 19.04 2 в Виноградовской пойме (Гончаров)
 19.04 1 в Царицыно, М. (Белинский)
 19.04 2 у Тимошкино, ОДИ (Черепушкин)
 19.04 1 южнее Дубровки, ОРЕ (Баженова)
 19.04 7 в Лотошинском р/х и окр. (Невский, Нецветаев)

Луговой конёк

Anthus pratensis (15.03.2008)

31.03 1 у Лёдово, КОЛ (Салов)
 31.03 7 у Пасыкино, СТУ (Салов)

- 1.04 18 у Леонтьево, СТУ (Салов)
- 1.04 3 у Большого Брянцево, ПОД (Калининченко)
- 3.04 2 там же (Д.В. Давыдов)
- 4.04 2 в Виноградовской пойме (Никитин)
- 4.04 у Шубино, СЕРПОС (Салов, Насонова)
- 5.04 1 у Дорофеево, ОРЕ (Невский, Нецветаев)

Жёлтая трясогузка

Motacilla flava (30.03.2008)

- 17.04 2 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
- 18.04 1+ у Внуково, НАО (Балаев)
- 19.04 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)
- 20.04 2–5 в Виноградовской пойме (Брандт, Великанов, Д.В. Давыдов, Никитин, Пронькин)
- 20.04 1–4 у Большого Брянцево, ПОД (Калининченко, А. Носенко)
- 20.04 2 на ЗБС (Бондарева)
- 20.04 1 в Сколково, М. (Нигородова)
- 20.04 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)
- 21.04 1 в Подольске (Д.В. Давыдов)
- 21.04 2 у Ленково, РУЗ (Г. Кириллов)
- 21.04 в Крылатском, М. (Голубева, Моисейкин)
- 22.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Калининченко, Симонов)
- 22.04 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)

Желтоголовая трясогузка

Motacilla citreola (31.03.2002)

- 12.04 2 у Мирного, СЕРПУХ (Дёров)
- 15.04 1 у Аксиньино, ОДИ (Д.С. Давыдов)
- 15.04 1 у Слободы, ЛЕН (Калининченко)
- 16.04 1+ у Домодедово (Салтыкова)
- 17.04 1 у посёлка Кирпичного Завода, НАО (Мочалов)
- 17.04 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)
- 17.04 4 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
- 18.04 2 там же (Набровенков)
- 18.04 2 в Царицыно, М. (Д.С. Давыдов)
- 18.04 1 у Шишково, ВОЛ (Нецветаев)
- 18.04 2 в Лотошинском р/х (Нецветаев)
- 19.04 2–6 в Виноградовской пойме (Гончаров, Пронькин)
- 19.04 2 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
- 19.04 1 у пос. Кирпичного Завода, НАО (ru-birds)
- 19.04 1 в Сколково, М. (Ги)
- 19.04 3 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)
- 19.04 1 у Шишково, ВОЛ (Авдеев)
- 19.04 1 в Лотошинском р/х (Невский, Нецветаев)
- 19.04 2 у Максимова, ЛОТ (Нецветаев)
- 19.04 2–3 у Петраково, ДМИ (Конторщиков)
- 19.04 6 у Окаёмово, СЕРПОС (Лапшина, Миронова, Обухова, Остапова)

Белая трясогузка

Motacilla alba (8.03.2021)

- 5.03 1 в Курьяново, М. (Скачков)
- 5.03 3 в Москве (Кузнецов)
- 9.03 3 у наб. Марка Шагала, М. (Русаков)
- 10.03 1 в Печатниках, М. (Уланова)
- 12.03 1 в Большом Трёхгорном пер., М. (Салов)
- 15.03 7 в Ворыпаево, ПОД (Уланова)
- 15.03 4 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)
- 16.03 1 у Плешкино, ЧЕХ (Лалак)
- 16.03 1 у Погостище, ШАТ (Невский, Нецветаев)
- 16.03 1 у Бурцевских прудов, М. (Иванов)
- 16.03 1 у Сипягинского пруда, ТАО (Балаев)

Жулан

Lanius collurio (6.04.2002)

- 27.04 в Дединовской пойме (Чугляев)
- 5.05 у Протвино, СЕРПУХ (Фирсов)

- 8.05 3 у Петрищево, РУЗ (Сазонов)
- 8.05 1 у Кульпино, ЛОТ (Авдеев, Горещкая, Ковалёв)
- 9.05 в Царицыно, М. (Сыров)
- 10.05 1 у Каргашино, СЕРПУХ (Голованова, Губина, Дёров, Тригер)
- 11.05 1 у Ланьшинского карьера, СЕРПУХ (Калининченко, Никитин, Симонов)
- 11.05 1 у Козлово, ШАХ (Г. Кириллов)
- 12.05 1 в Царицыно, М. (Д.В. Давыдов)
- 12.05 в Куркино, М. (Голубева)

Иволга

Oriolus oriolus (29.04.2014)

- 4.05 1 у Москорецкой Слободы, МОЖ (Сазонов)
- 4.05 1 у Пустошей, ШАТ (Уколов)
- 6.05 2 у аэропорта «Шереметьево», ХИМ (ru-birds)
- 6.05 1 у Электрогорска, ПАВ (iNaturalist)
- 7.05 1 у Лобково, РУЗ (Колочинский)
- 9.05 в Коломне (Сидорова)
- 9.05 2–3 у Семёновского, МОЖ (Конторщиков)
- 9.05 1 у Шорново, РУЗ (Г. Кириллов)
- 9.05 2 у пос. Гидроузел, РУЗ (Г. Кириллов)
- 9.05 1 у Воронино, СЕРПОС (Насонова, Салов)
- 10.05 у Песков, КОЛ (М. и П. Пахлевановы)
- 10.05 2 в Лотошинском р/х (Никитин)
- 10.05 1 в Мишеронском, ШАТ (Нецветаев, Ровинский)
- 10.05 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)
- 10.05 1 у Воронино, СЕРПОС (Насонова, Салов)
- 10.05 пара по голосу в Серебряно-Прудском ГО (Сидорова)

Скворец

Sturnus vulgaris (круглый год)

- 7.03 1+ у Тарасково, КАШ (Балаев)
- 7.03 1 в Щельпино, ВОС (Зубакин)
- 7.03 в Романцево, ПОД (Косых)
- 7.03 6 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)
- 7.03 7 в Ново-Спасском, НАО (Балаев)
- 7.03 3 у ст. м. «Тёплый Стан», М. (М. Пахлеванова)
- 7.03 1 на Херсонской ул., М. (Аверьянова)
- 7.03 1 на Кременчугской ул., М. (Язаров)
- 7.03 1 в парке «Красная Пресня», М. (Насонова, Салов)
- 7.03 2 в Неманском пр., М. (eBird)
- 7.03 2 в Театральном пр., М. (Мещерякова)
- 7.03 2 у ст. м. «ВДНХ», М. (Мещерякова)
- 7.03 3 на ул. Бориса Галушкина, М. (Кудрявцева)
- 7.03 1+ в ТиНАО (Балаев)
- 7.03 5 в Царицыно, М. (Пантелеев)
- 7.03 2 в Зоопарке, М. (Д.В. Давыдов)
- 7.03 1+ в ЗАО, М. (Соварцева)
- 7.03 2 в Строгино, М. (Савранский)
- 7.03 3 в Мытищах (Гончаров)
- 7.03 7 у Лосино-Петровского, ЛОС (Шведко)
- 8.03 в Коломне (Сидорова)
- 8.03 в Плоскинино, РАМ (Горбань)
- 8.03 2 в Лотошинском р/х (Д.В. Давыдов, Ларин)
- 8.03 100 в ГО Клин (Д.В. Давыдов)
- 8.03 1+ у Большого Брянцево, ПОД (Уланова)
- 8.03 27 в Раменском МО (Шамин, Шамина)
- 8.03 1–2 в Царицыно, М. (Завадская, Новикова)
- 8.03 4 в Коломенском, М. (Григорьева)
- 8.03 2 на бульваре Рокоссовского, М. (Ланова)
- 8.03 1+ в Куркино, М. (Швыдун)
- 8.03 в ЮЗАО Москвы (Апполонов)
- 8.03 1 в Серебряном бору, М. (Павлова)
- 8.03 1+ у Ильинского, КРА (Новосёлова)
- 8.03 в Химках (Блинова)
- 8.03 в Долгопрудном (Воинов)

8.03 в Орехово-Борисово, М. (Пантелеев)

8.03 в Волоколамском МО (Голубева)

Далее повсеместно.

Крапивник

Troglodytes troglodytes (1.03.2020)

2.03 1 в МО Чехов (Дёров)

2.03 1 в ГО Коломна (Долматова)

5.03 1 в Раменском ГО (Уланова)

5.03 1 в Сергиево-Посадском ГО (Чурочкин)

6.03 в Куркино, М. (Швыдун)

8.03 1 в Царицыно, М. (Белинский)

8.03 1 в Мытищах (Язаров)

8.03 1 в Серебряном бору, М. (Павлова, Панова, Тарасик, Хасянова, Чураева)

8.03 2 в Лотошинском р/х (Д.В. Давыдов)

9.03 1 у Макаровки, РАМ (Шамин, Шамина)

9.03 1 в парке Узкое, М. (Симонов)

9.03 1 в Филёвском парке, М. (Сазонов)

9.03 1 в Красногорском лесу (Остапова)

9.03 1 в парке Покровское-Стрешнево, М. (СОПР)

Лесная завирушка

Prunella modularis (26.03.2020)

29.03 1 у Соболево, ОРЕ (Д.В. Давыдов, Меркулова, Насонова, Салов)

31.03 в Куркино, М. (Швыдун)

31.03 1 в ГО Солнечногорск (Матершев)

3.04 1 у Волосунино, ШАТ (Уколов)

3.04 1 у Калинино, КЛИ (Русол)

3.04 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)

3.04 1 у Бужаниново, СЕРПОС (Салов)

4.04 в Куркино, М. (Швыдун)

4.04 1 у Лесодолгоруково, ИСТ (Семёнова)

4.04 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)

4.04 1 у Бужаниново, СЕРПОС (Салов)

5.04 1 там же (Салов)

5.04 1 в Черустином лесу, ШАТ (Невский, Нецветаев)

5.04 1 у Иглово, ОДИ (Меркулова)

5.04 1 у Тимофеево, СОЛ (Г. Кириллов)

5.04 1 у Топорково, СЕРПОС (Салов)

Соловиный сверчок

Locustella luscinioides (20.04.2020/2024)

21.04 2 в Лотошинском р/х (Докучаев)

22.04 там же (Голубева, Моисейкин)

25.04 1 там же (Саржант)

26.04 3 там же (Авдеев, Ковалёв, Пархаев)

26.04 2 в Виноградовской пойме (Максимова)

27.04 1 у Нарских прудов, ОДИ (Благая, Брандт, Владова, Жиленков, Журавлёва, Калашников, Карасёва, Черепушкин)

27.04 1–3 в Лотошинском р/х (Д.В. Давыдов, Калиниченко, Никитин, А. Носенко, В. Носенко)

3.05 1–5 в Виноградовской пойме (Грачёва, Пархаев, Сайфуллин)

Речной сверчок

Locustella fluviatilis (23.04.1999)

2.05 1 у Пасыкино, СТУ (Насонова, Салов)

8.05 1 в Часцах, ОДИ (Г. Кириллов)

9.05 у Северского, КОЛ (birdsmoscow)

9.05 1 в Истре (Беляков)

10.05 1 у Старого, СТУ (Пантелеев)

10.05 1 в Измайловском парке, М. (Жеглов)

11.05 1 у Благовещенского, ВОЛ (Костин)

Обыкновенный сверчок

Locustella naevia (22.04.2001)

3.05 1 в Виноградовской пойме (Сайфуллин)

11.05 1 у Ланьшинского карьера, СЕРПУХ (Калиниченко, Никитин, Симонов)

13.05 там же (Симонов, Калиниченко, Никитин)

14.05 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Голубева, Губина)

14.05 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)

15.05 у Шишково, ВОЛ (Голубева)

16.05 1 у с. Бисерово, РАМ (М. Пахлеванова)

16.05 1 в Строгино, М. (Кузиков, Чурикова)

16.05 1 в Балашихе (Михеева)

Камышевка-барсучок

Acrocephalus schoenobaenus (25.04.2004)

26.04 1 в Лотошинском р/х (Авдеев, Ковалёв, Пархаев)

27.04 1 там же (Д.В. Давыдов, Калиниченко, Никитин, А. Носенко, В. Носенко)

28.04 1 у Вереи, ОРЕ (Сазонов)

29.04 1 в Серебряной бору, М. (Д.В. Давыдов)

2.05 2 в Строгино, М. (Ги)

3.05 1–5 в Виноградовской пойме (Асоцкий, Грачёва, Пархаев, Сайфуллин)

Садовая камышевка

Acrocephalus dumetorum (4.05.2012)

8.05 1 у Воронино, СЕРПОС (Насонова, Салов)

8.05 1 в Сычёво, ВОЛ (Пылёв)

10.05 1 у Старого, СТУ (Пантелеев)

10.05 1 в Царицыно, М. (Ги)

11.05 1 там же (Сыров)

11.05 1 в Серебряных Прудах (СОПР)

11.05 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)

12.05 2 в Царицыно, М. (Д.В. Давыдов)

12.05 1 в Шорново, РУЗ (Г. Кириллов)

13.05 1 в Щербинке, НАО (Пантелеев)

13.05 1 у Дзержинского (Голубева)

13.05 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)

13.05 в Куркино, М. (Швыдун)

13.05 в Фили-Давыдково, М. (Язаров)

Болотная камышевка

Acrocephalus palustris (1.05.2001/2022)

8.05 1 у Звенигорода, ОДИ (Авилова)

9.05 1 в Сычёво, ВОЛ (Пылёв)

12.05 2 у Бурцевских прудов, М. (Шарло)

13.05 у Бронниц (М. Пахлеванова)

13.05 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)

14.05 1 у Захарьино, НАО (Пантелеев)

14.05 1 в Измайловском парке, М. (Потапова)

14.05 1 в Анискино, ЛОС (Горин)

14.05 1 в Фрязино (Кац)

Тростниковая камышевка

Acrocephalus scirpaceus (20.04.2023)

27.04 1 на Верхнеяузских болотах, МЫТ (Д.С. Давыдов)

14.05 1 на Нарских прудах, ОДИ (Балаев)

15.05 в Лотошинском р/х (Голубева)

17.05 1 там же (Брандт, Д.В. Давыдов, Коновалов, Ларин, Назаров, Пархаев, Филатов и др.)

18.05 там же (Голубева)

24.05 1 там же (Д.В. Давыдов)

27.05 1 у Полубарского, СЕРПОС (Гринченко, Конторщиков)

Дроздовидная камышевка

Acrocephalus arundinaceus (27.04.2020)

20.04 1 у Павловского Посада (Селиванова)

25.04 1 в Лотошинском р/х (Саржант)

27.04 1 там же (Д.В. Давыдов, Калиниченко, Никитин, А. Носенко, В. Носенко)

4.05 1 там же (Авдеев, Ковалёв, Пархаев)

5.05 1 там же (Постовая, Пылёв, Ямбаев)

6.05 там же (Голубева)

8.05 3 там же (Ковалёв)

Зелёная пересмешка

Hippolais icterina (29.04.2014)

6.05 1 в Сокольниках, М. (Василевская)

8.05 1 в Дубне (Великанов)

9.05 1 у Семёновского, МОЖ (Конторщиков)

10.05 в Песках, КОЛ (М. и П. Пахлевановы)

10.05 1 в зоне отдыха Битца, М. (Симонов)

10.05 2 в Митинском парке, М. (Крупышева)

10.05 1 в Измайловском парке, М. (Ги)

10.05 1 в Тимирязевском парке, М. (Валиев)

10.05 2 в Лотошинском р/х (Никитин)

11.05 в Песках, КОЛ (М. Пахлеванова)

Северная бормотушка

Hippolais caligata (21.04.2002)

15.05 1 в Куркино, М. (Швыдун)

15.05 у аэропорта «Шереметьево», ХИМ (Швыдун)

16.05 1 в усадьбе Быково, РАМ (Сидорова)

17.05 1 у Старого, СТУ (Пантелеев)

17.05 1 у Башкино, НАР (С. Елисеев)

17.05 в Лотошинском р/х (Коновалов)

17.05 у Сергиева Посада (Салов)

18.05 1 у Шарапово, ЕГО (Уколов)

18.05 1 у Бутово, ЕГО (Уколов)

18.05 1 в Конобеево, ВОС (СОПР)

18.05 1 у Подольска (Д.В. Давыдов)

18.05 1 у Дмитровки, ТАЛ (Конторщиков)

19.05 1 у Чирково, СТУ (Салтыкова)

19.05 1 у Чернятино, ШАТ (Уколов)

19.05 у Сергиева Посада (Салов)

Славка-черноголовка

Sylvia atricapilla (13.04.2023)

12.04 1 на ул. Брусилова, М. (Аксаментов)

13.04 1 в Царицыно, М. (eBird)

16.04 2 в Клину (Докучаева)

17.04 1 у Благовещенского, ДМИ (eBird)

19.04 1 у Старого, СТУ (Пантелеев)

19.04 в Куркино, М. (Швыдун)

20.04 1 в Виноградовской пойме (Д.С. Давыдов)

20.04 1 в Удельной, РАМ (Танаев)

20.04 1 в Царицыно, М. (eBird)

20.04 1 на Воробьёвых горах, М. (Морозов)

20.04 1 в Леоново, М. (Ги)

20.04 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)

20.04 1 у Лопотово, СОЛ (Рысев)

20.04 в Куркино, М. (Швыдун)

Садовая славка

Sylvia borin (27.04.2024)

4.05 1 у Златоустово, РУЗ (Комракова)

6.05 1 в Куркино, М. (Швыдун)

8.05 1 у Новоалександровки, НАР (Конторщиков)

8.05 1 у Рогачёво, РАМ (Шамина)

8.05 1 в Новокошино, М. (iNaturalist)

9.05 1 в Шорново, РУЗ (Г. Кириллов)

9.05 1 у Сергеевки, СОЛ (О. Волцит)

10.05 у Ступино (Голубева)

10.05 у Куркино, М. (Швыдун)

10.05 1 в Лотошинском р/х (Никитин)

10.05 1 в Измайловском парке, М. (Ги)

10.05 1 у Воронино, СЕРПОС (Насонова, Салов)

Ястребиная славка

Sylvia nisoria (5.05.2001)

10.05 1 в Журавлиной родине (Волков)

15.05 пара в Митино, М. (Аверьянова)

15.05 в Салтыковском парке, БАЛ (Младенчиков)

16.05 там же (Пылёв)

17.05 1 у Башкино, НАР (С. Елисеев)

21.05 1 у Алпатьево, ЛУХ (Голубева)

21.05 2 в р/х Осёнка, КОЛ (Калиниченко)

22.05 1 в Царицыно, М. (Саржант)

Серая славка

Sylvia communis (19.04.2014)

25.04 1 в усадьбе Быково, РАМ (Сидорова)

27.04 1 в Мякинино, М. (Диярова)

28.04 1 в Царицыно, М. (СОПР)

1.05 1 у Ганькино, ЛУХ (Гончаров)

2.05 1 у Пасыкино, СТУ (Насонов, Салов)

3.05 3 там же (Насонов, Салов)

3.05 в Куркино, М. (Швыдун)

Славка-мельничек

Sylvia curruca (16.04.2024)

20.04 1 у Федосьино, ВОЛ (Скачков)

21.04 1 в Куркино, М. (Швыдун)

23.04 1 в Коломне (Долматова)

23.04 в Куркино, М. (Швыдун)

24.04 1 в Филях, М. (Язаров)

25.04 1 в Репотино, ШАХ (Петров)

25.04 1 в Капотне, М. (Ивановский)

25.04 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков, Колтышева)

Пеночка-весничка

Phylloscopus trochilus (30.03.2002)

14.04 1 в ГО Клин (Докучаева)

16.04 1 в Лотошинском р/х (eBird)

17.04 1+ в парке «Братеевская пойма» (Д.В. Давыдов)

17.04 1+ Раменском МО (Сидорова)

18.04 1 у Большого Садового пруда, М. (Ги)

18.04 1 в парке 850-летия Москвы, М. (eBird)

18.04 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)

18.04 2 в Строгино, М. (Губина)

18.04 у Путилково, КРА (Швыдун)

18.04 1 у Бурцевских прудов, М. (М. Кузьмин)

18.04 1 в Лотошинском р/х (Нецветаев)

18.04 2 у Максимово, ЛОТ (Нецветаев)

18.04 в Куркино, М. (Швыдун)

18.04 у Протвино, СЕРПУХ (Фирсов)

18.04 в Дубне (Великанов)

19.04 в Строгино, М. (Беляков)

19.04 1 в Виноградовской пойме (Пронькин)

19.04 1 в Родниках, РАМ (Калиниченко)

19.04 1 южнее Дубровки, ОРЕ (Баженова)

19.04 в Куркино, М. (Швыдун)

19.04 2 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)

19.04 4 в Лотошинском р/х и окр. (Невский, Нецветаев)

Пеночка-теньковка

Phylloscopus collybita (31.03.2024)

3.04 1 у Волосунино, ШАТ (Уколов)

4.04 1 южнее Дубровки, ОРЕ (Сазонов)

4.04 1 в ГО Воскресенск (Маркина)

5.04 1 в Подмоклово, СЕРПУХ (Дёров)

5.04 1 в Тарасково, СЕРПУХ (Коновалов)

5.04 1 у Шарапово, ШАТ (Меркулова, Уколов)

9.04 1 у Бурцевских прудов, М. (Д.В. Давыдов)

10.04 2 в Подмоклово, СЕРПУХ (Дёров)

11.04 1 у Солнышково, ЧЕХ (Дёров)

11.04 1 в Конобеево, ВОС (Белинский)

11.04 1 в Щитниково, М. (Мещерякова)

11.04 1 в Коломенском, М. (Корабельникова)

11.04 1 в Балашихе (Мещерякова)

Пеночка-трещотка*Phylloscopus sibilatrix* (11.04.2022)

- 17.04 1 в Москве (Калининченко)
- 18.04 1 в Куркино, М. (Швыдун)
- 19.04 1 у Старого, СТУ (Пантелеев)
- 19.04 1 в Бутово, М. (Ардатов)
- 19.04 1 в Битцевском лесу, М. (А. Елисеев)
- 19.04 1 в Строгино, М. (Беляков)
- 19.04 1 в Мещёрском парке, ОДИ (Евсеева)
- 19.04 1–2 в Царицыно, М. (Белинский, Д.В. Давыдов, Ларин, Симонов)
- 19.04 2 в Филёвском парке, М. (Зубрилова)
- 19.04 1 в парке Северное Тушино, М. (Певницкая)
- 19.04 в Куркино, М. (Швыдун)
- 19.04 3 у Осипово, СОЛ (Г. Кириллов)
- 19.04 1 южнее Дубровки, ОРЕ (Баженова)
- 19.04 4 в Лотошинском р/х и окр. (Невский, Нецветаев)
- 19.04 1 у Матюшкино, ЛОТ (Невский, Нецветаев)
- 20.04 5 у Воздвиженки, СЕРПУХ (Лалак)
- 20.04 1 в Южном Бутово, М. (Гельметдинов)
- 20.04 2 в парке Узкое, М. (Симонов)
- 20.04 5 в Алёшкинском лесу, М. (Печёнкин)
- 20.04 1 в Рублёво, ОДИ (Герасимова)
- 20.04 1 в окр. ЗБС (Бондарева)
- 20.04 1 у Рождественно, ИСТ (Новосёлова)
- 20.04 1 у Петровского, КЛИ (Русол)
- 21.04 1 в Северном Бутово, М. (Гельметдинов)
- 21.04 3 в Говоровском лесу, М. (Д.В. Давыдов)
- 21.04 1 в Рублёво, ОДИ (Герасимова)
- 21.04 1 у Шорново, РУЗ (Г. Кириллов)
- 21.04 2 у пос. Гидроузел, РУЗ (Г. Кириллов)
- 21.04 2 у Максимово, ЛОТ (Нецветаев)

Зелёная пеночка*Phylloscopus trochiloides* (20.04.2002)

- 3.05 1 в Северном Бутово, М. (Гельметдинов)
- 6.05 1 в ГБС, М. (Авдеев)
- 13.05 1 в Орехово-Борисово, М. (Неслуховский))
- 13.05 1 у Захарьино, НАО (Гельметдинов)
- 13.05 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)
- 13.05 1 на ул. Демьяна Бедного, М. (Лапшина)
- 13.05 2 в Измайловском парке, М. (Озеров)
- 14.05 2 в Воронцовском парке, М. (Гельметдинов)
- 14.05 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)
- 15.05 1 в зоне отдыха Битца, М. (Симонов)
- 15.05 3 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)
- 15.05 2 в Нескучном саду, М. (Василевская)
- 15.05 2 на Автомоторной ул., М. (Перова)
- 15.05 1 у Губино, ОРЕ (Сазонов)
- 15.05 в Черниговском лесу, СЕРПОС (Салов)
- 15.05 1 у ст. м. «Киевская», М. (СОПР)
- 15.05 1 в Королёве (Уколов)

Мухоловка-пеструшка*Ficedula hypoleuca* (1.04.2013)

- 15.04 1 у Астафьево, ВОЛ (Русол)
- 16.04 1 в парке Филатов Луг, НАО (Светличная)
- 17.04 2 в Пироговском лесопарке, МЫТ (Гончаров)
- 19.04 2–3 у Тульчино, СЕРПУХ (Насонова, Салов)
- 19.04 2 у Старого, СТУ (Пантелеев)
- 19.04 1 на ЗБС (Бондарева)
- 20.04 1 у Воздвиженки, СЕРПУХ (Лалак)
- 20.04 1 у Осаново-Дубового, ШАТ (Ракитянская)
- 20.04 1 в Удельной, РАМ (Танаев)
- 20.04 1 на Воробьёвых горах, М. (Морозов)
- 20.04 2 в Сокольниках, М. (Иванов)
- 20.04 1 в Измайловском парке, М. (Губер)
- 20.04 1 в ГБС, М. (Кичман)

- 20.04 1 в Лотошинском р/х (Ларин)
- 20.04 1 в Бронницах (eBird)
- 20.04 4 в ЗБС и окр. (Бондарева)
- 20.04 2 у Рождественно, ИСТ (Новосёлова)
- 20.04 в Куркино, М. (Швыдун)
- 20.04 1 у Петровского, КЛИ (Русол)
- 20.04 2 у Максимово, ЛОТ (Нецветаев)

Мухоловка-белошейка*Ficedula albicollis* (24–26.04.2012)

- 22.04 в Бояркино, КОЛ (Долматова)
- 23.04 у Куребино, СЕРПРУД (Ерёмки)
- 25.04 в усадьбе Быково, РАМ (Сидорова)
- 27.04 в Щукино, М. (СОПР)
- 28.04 1 у ст. м. «ВДНХ», М. (Кузнецов)
- 28.04 1 в Капотне, М. (Сидорова)
- 30.04 1 там же (Василевская, Губина)
- 4.05 5 у Старого, СТУ (Насонова, Салов)

Малая мухоловка*Ficedula parva* (25.04.2014/2024)

- 21.04 1 в Северном Бутово, М. (Гельметдинов)
- 28.04 1 в Битцевском лесопарке, М. (Гельметдинов)
- 2.05 3 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)
- 3.05 1 у Замошье, МОЖ (Шамина)
- 3.05 в Куркино, М. (Швыдун)
- 4.05 у Старой Ситни, СТУ (Салов, Насонова)
- 4.05 1 в Южном Бутово, М. (Гельметдинов)
- 4.05 1 в Битцевском лесу, М. (eBird)
- 4.05 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)
- 4.05 4 у Северной Гривы, ШАТ (Бахмарин, Невский, Нецветаев)

Серая мухоловка*Muscicapa striata* (14.04.2024)

- 20.04 1 в окр. ЗБС (сообщ. Бондарева)
- 29.04 1 у Рошаля, ШАТ (Уколов)
- 30.04 1 у Пустошей, ШАТ (Уколов)
- 1.05 1 в Битцевском лесу, М. (Цицинова)
- 4.05 1 у Северной Гривы, ШАТ (Бахмарин, Невский, Нецветаев)
- 4.05 1 Мышецкого, СОЛ (Садыкова)

Луговой чекан*Saxicola rubetra* (8.04.2023)

- 19.04 1 у Башкино, НАР (С. Елисеев)
- 19.04 1 на Ломоносовском пр., М. (Хрисанфов)
- 20.04 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Авдеев, Губина)
- 20.04 2–6 в Дединовской пойме (Авдеев, Губина, Ковалёв)
- 20.04 3 у Берёзкино, РУЗ (Мочалов)
- 20.04 1 в Виноградовской пойме (Потопаева, Черепушкин)
- 20.04 1–5 там же (Никитин, Черепушкин, Жиленков)
- 20.04 1–4 у Конобеево, ВОС (Белинский, Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов))
- 20.04 1 у Никифоровского, ОДИ (Асоцкий)
- 20.04 1 в Сколково, М. (Баранова)
- 20.04 в окр. ЗБС (сообщ. Бондарева)
- 20.04 в ГО Коломна (Долматова)
- 20.04 в Одинцовском ГО (Асоцкий)
- 20.04 в ГО Ступино (Салтыкова)
- 20.04 в ГО Серпухов (Фирсов)
- 21.04 1 у Подольска (Д.В. Давыдов)
- 22.04 1 у Бурцево, НАР (М. Пахлеванова)
- 22.04 1 у Филатово, РУЗ (Г. Кириллов)
- 22.04 у Шишково, ВОЛ (Голубева, Моисейкин)
- 22.04 1 в Лотошинском р/х (Губина)
- 23.04 1 в Виноградовской пойме (Бондарева)

23.04 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)

Каменка

Oenanthe oenanthe (28.03.2023)

30.03 1 у Большого Брянцево, ПОД (Филатов)

3.04 1 у Максимково, КПИ (Попова)

4.04 в Нижнем Хорошово, КОЛ (Сидорова)

6.04 1 в Лотошинском р/х (Никитин)

10.04 у Селино, СЕРПУХ (Дёров)

10.04 на оз. Нерском, ГО Серпухов (Дёров)

Обыкновенная горихвостка

Phoenicurus phoenicurus (22.03.2020)

16.04 1 на Рочделской ул., М. (Шамина)

19.04 1 в Гальчино, ДОМ (Шамин, Шамина)

20.04 1 в Шорново, РУЗ (Г. Кириллов)

20.04 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Коберская)

23.04 в Куркино, М. (Швыдун)

25.04 в Дубне (Великанов)

25.04 1 у ст. м. «Университет», М. (Великодный)

Горихвостка-чернушка

Phoenicurus ochrurus (3.03.2024)

12.03 1 в Пушино, СЕРПУХ (Архипов)

20.03 1 на Берёзовой ал., М. (Авдеев)

24–28.03 1 у Верзилово, СТУ (Салов)

28.03 в ГО Щёл (В. Шипилов)

29.03 в МО Егорьевск (Петрова, Д.В. Давыдов, Никитин, Набровенков)

29.03 1 в Пестовской, ШАТ (Меркулова, Уколов)

29.03 1 в Кулаковке, ШАТ (Меркулова, Уколов)

29.03 1 в Хорлово, ВОС (Никонорова)

29.03 1 у Акатово, ЕГО (Д.В. Давыдов, Лапшина, Остапова, Потопаева, Черепушкин)

29.03 1 у Абрютково, ЕГО (Никитин)

29.03 1 в Вахромеево, ДОМ (Полевая)

Зарянка

Erithacus rubecula (круглый год)

5.03 в Леоновской роще, М. (Голубева, Моисейкин)

5.03 в ГО Мытищи (Сидорова)

5.03 1 в ГБС, М. (Голубева)

7.03 1 там же (Соколов)

7.03 1 в Ростокино, М. (Кудрявцева)

7.03 в Куркино, М. (Швыдун)

9.03 1 в Измайловском парке, М. (eBird)

10.03 1 в ГБС, М. (Соколов)

11.03 1 на Воробьёвых горах, М. (Асоцкий)

12.03 в Куркино, М. (Швыдун)

12.03 1 в Ростокино, М. (Кудрявцева)

Соловей

Luscinia luscinia (17.04.2014)

26.04 1 в Протвино, СЕРПУХ (Фирсов)

26.04 1 в Строгино, М. (Беляков)

29.04 1 у Пустошей, ШАТ (Уколов)

29.04 1 в усадьбе Быково, РАМ (Сидорова)

29.04 в Куркино, М. (Швыдун)

1.05 1 у Алпатьево, ЛУХ (Гончаров)

1.05 1 в Заболотье, ТАО (Симонов)

1.05 1 у Головинских прудов, М. (Ги)

1.05 1 в Лосином острове, КОР (Ковылов)

2.05 1 у Пасыкино, СТУ (Насонова, Салов)

2.05 1 в Строгино, М. (Ги)

3.05 у Васюнино, ТАО (М. Пахлеванова)

3.05 1 в Коммунарке, М. (Захаров)

3.05 9 в Виноградовской пойме (Пархаев)

3.05 1 в Козино, ВОЛ (Костин)

3.05 1 на ул. Анучина, М. (Те)

Варакушка

Luscinia svecica (2.04.2023)

13.04 1 в Виноградовской пойме (Белинский)

15.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Пронькин)

16.04 1 в зоне отдыха Битца, М. (Симонов)

16.04 1 южнее Дубровки, ОРЕ (Сазонов)

16.04 1 в Царицыно, М. (Пантелеев)

16.04 1 в Кузьминках, М. (Нефёдова)

16.04 1 в Куркино, М. (Голубева, Моисейкин, Швыдун)

16.04 1 у Бурцевских прудов, М. (Шарло)

16.04 1 в Мытищах (Блинникова, Гончаров)

16.04 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)

17.04 5 в Солнцево, М. (Филимонов)

17.04 7 у посёлка Кирпичного Завода, НАО (Мочалов)

17.04 8 в Братеевской пойме, М. (Д.В. Давыдов)

17.04 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)

17.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов)

18.04 3 там же (Набровенков)

18.04 1 у Старого Бобренево, КОЛ (Калинин, Калинина)

18.04 3 в Солнцево, М. (Филимонов)

18.04 4 на Ломоносовском пр., М. (Александренков)

18.04 2 у Бурцевских прудов, М. (М. Кузьмин)

18.04 1 у Рыбаков, ДМИ (Садыкова)

18.04 3 в Лотошинском р/х и окр. (Нецветаев)

Чёрный дрозд

Turdus merula (круглый год)

1.03 1 в Битцевском лесу, М. (eBird)

1.03 1 на Воробьёвых горах, М. (Колтышева, Морозов)

1.03 1 в Измайловском парке, М. (Невский)

2.03 1 в Филёвском парке, М. (Г. Кириллов)

2.03 1 в д. Верея, РАМ (Сидорова)

5.03 1 в ГБС, М. (Сидорова, Голубева)

5.03 1 в Бибирево, М. (Сидорова)

5.03 1 в ЦАО, М. (Асоцкий)

6.03 в Куркино, М. (Швыдун)

7.03 1 там же (Мищенко)

7.03 1 в парке Покровское-Стрешнево, М. (Лупанов)

7.03 1 на Воробьёвых горах, М. (Александренков)

7.03 1 в парке Отрада, М. (Кицес)

Белобровик

Turdus iliacus (16.03.2007)

16.03 1 в Дмитровке, ТАЛ (Конторщиков)

22.03 1 в Марусино, ЛЮБ (Ломоносова, Панфилова)

27.03 1 в Царицыно, М. (Вишневский)

29.03 1 у Дмитровского Погоста, ШАТ (Уколов)

29.03 1 у Луговой, ЛОБ (Перов, Перова)

29.03 1 у Лесодолгоруково, ИСТ (Семёнова)

29.03 в ЮЗАО, М. (Фадеев)

29–30.03 пролёт в ГО Клин (Невский, Нецветаев, Ровинский)

30.03 в Раково, ИСТ (Фридман)

30.03 1 у Кокошкино, НАО (Мочалов)

30.03 1 на ул. 800-летия Москвы, М. (Аксаментов)

30.03 1 у Сумароково, МЫТ (Божинова)

30.03 1 у Лесодолгоруково, ИСТ (Семёнова)

Певчий дрозд

Turdus philomelos (1.03.2022)

9.03 у Бронниц, РАМ (М. Пахлеванова)

12.03 в Королёве, КОР (Коблик)

13.03 в Орудьево, ДМИ (Мостовая)

15.03 в Раменском МО (iNaturalist)

15.03 1 в Битцевском лесу, М. (Замедлин)

16.03 12 у платф. Мачихино, ТАО (Беляева, Золотов, П. Волцит)

22.03 1 в Южном Бутово, М. (Гельметдинов)

22.03 2 в ГБС, М. (Сенкин)

Деряба

Turdus viscivorus (1.03.2015)

6.03 1 в Ловцах, ЛУХ (Голубева, Сидорова)

22.03 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)

24.03 у Верзилово, СТУ (Салов)

24.03 1 у Маливо, КОЛ (Шамин, Шамина)

26.03 у Пасыкино, СТУ (Салов)

26.03 1 у Тёфаново, ДМИ (Уколов)

27.03 1 у Софьино, ТАО (Д.В. Давыдов)

27.03 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова)

27.03 1 у ст. Малинки, ТАО (Д.В. Давыдов)

Ремез

Remiz pendulinus (30.03.2014)

23.03 1 у Сипягинского пруда, ТАО (Балаев)

27.03 в Орехово-Зуевском ГО (Васильев)

29.03 1 у Шувого, ЕГО (Насонова, Салов)

29.03 1 в Сколково, М. (Баранова)

29.03 1 на Ломоносовском пр., М. (Александренков)

30.03 1–2 у Федякино, ЕГО (Д.В. Давыдов, Меркулова, Насонова, Салов, Уколов)

30.03 в Лотошинском р/х (Балаев)

3.04 там же (Голубева, Моисейкин)

Зяблик

Fringilla coelebs (круглый год)

1.03 5 в Битцевском лесу, М. (Якупова)

1.03 1 в Строгино, М. (eBird)

3.03 5 у Топорково, СЕРПОС (Салов)

7.03 2 в Строгино, М. (Кузиков)

7.03 2 в Мытищинском лесопарке (Гончаров)

7.03 1 у Березняков, СЕРПОС (Салов)

8.03 1 у Малино, СТУ (Шамин, Шамина)

9.03 1 в Измайловском парке, М. (eBird)

9.03 1 на Филёвском бульваре, М. (Овчинников)

10.03 1 у Ильинского, КРА (Мочалов)

Юрок

Fringilla montifringilla (1.03.2015)

15.03 в Строгино, М. (Беляков)

17.03 в Птичном, НАО (Балаев)

17.03 1 у Муравлёвской, ШАТ (Невский, Нецветаев)

17.03 1 у Рязановского, ЕГО (Невский)

18.03 1 в Крылатском, М. (Сазонов)

20.03 2 у Рязановского, ЕГО (Невский, Нецветаев)

21.03 2 там же (Невский, Нецветаев)

26.03 1 у Маливо, КОЛ (Шамин, Шамина)

26.03 у Пасыкино, СТУ (Салов)

27.03 1 у ст. Малинки, ТАО (Д.В. Давыдов)

27.03 1 у Санниково, ИСТ (Меркулова)

Чечевица

Carpodacus erythrinus (17.04.2001)

7.05 1 у Кубинки, ОДИ (Г. Кириллов)

7.05 1 в Кузьминском лесопарке, М. (Нефёдова)

7.05 1 в Лосином острове, КОР (Ковылов)

8.05 в Куркино, М. (Швыдун)

9.05 там же (Голубева)

10.05 там же (Швыдун)

10.05 1 в Копытово, МОЖ (Конторщиков)

10.05 1 в Истре (Беляков)

10.05 1 в зоне отдыха Битца, М. (Симонов)

10.05 1 в Царицыно, М. (Сыров)

10.05 1 у Спасского, КЛИ (Г. Кириллов)

10.05 у Топорково, СЕРПОС (Салов)

11.05 1 у Ланьшинского карьера, СЕРПУХ (Калиниченко, Никитин, Симонов)

11.05 1 у пос. Володарского, РАМ (Лалак)

11.05 1 в Устьинском сквере, М. (Мещерякова)

11.05 у Топорково, СЕРПОС (Салов)

11.05 1 в Репотино, ШАХ (Петров)

11.05 1 у Козлово, ШАХ (Г. Кириллов)

11.05 1 у Козино, ВОЛ (Костин)

11.05 1 в Царицыно, М. (Сыров)

Обыкновенная овсянка

Emberiza citrinella (круглый год)

1.03 1 у Подмоклово, СЕРПУХ (Дёров)

2.03 51 у Тарасково, КАШ (Назаров, Уланова, Черепушкин, Шарло)

3.03 3 в Куркино, М. (Мищенко)

5.03 1 там же (Мищенко)

6.03 там же (Швыдун)

6.03 в Дединовской пойме (ru-birds)

7.03 в ГО Кашира (Балаев)

7.03 1 в ГО Серпухов (Фирсов)

8.03 8 у Подмоклово, СЕРПУХ (Дёров)

8.03 1 у Волового, РАМ (Шамин, Шамина)

8.03 1 у Жирошкино, РАМ (Шамин, Шамина)

9.03 20 у Тарасково, КАШ (Шведко)

Камышовая овсянка

Schoeniclus schoeniclus (1.03.2015)

10.03 1 у Дракино, СЕРПУХ (Фирсов)

11.03 1 у Ильинского, КРА (Губина)

11.03 в Куркино, М. (Швыдун)

12.03 1 у Шапково, ИСТ (Меркулова)

13.03 2 у Шишково, ВОЛ (Набровенков, Сидорова)

15.03 10–22 у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов, Уланова)

15.03 1 у Ильинского, КРА (Баранова)

15.03 8 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова)

15.03 7 в Мытищах (Гончаров)

15.03 1 у Акатово, КЛИ (Г. Кириллов)

15.03 10 в Лотошинском р/х (Балаев)

16.03 2 у Лисьих Нор, ЛУХ (Нецветаев)

16.03 1 у Плешкино, СЕРПУХ (Лалак)

16.03 2 у Раменского (Асоцкий, Федоринов)

16.03 3–8 у Ильинского, КРА (Авдеев, Губина, Левина, Нигородова)

16.03 3 у Лесодолгоруково, ИСТ (Семёнова)

Таблица. Первые встречи прилётных видов в Москве и Московской области, март-июнь 2025 г.


Дата	Вид
1.03	широконоска, канюк, лысуха, чёрный дрозд, зяблик, обыкновенная овсянка
2.03	серая цапля, озёрная чайка, клинтух, крапивник
3.03	камышница
5.03	чибис, белая трясогузка, зарянка

Дата	Вид
6.03	деряба
7.03	полевой лунь, полевой жаворонок, скворец
8.03	вяхирь
9.03	певчий дрозд
10.03	камышовая овсянка

ПТИЦЫ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

Дата	Вид
12.03	горихвостка-чернушка
14.03	белый аист, вальдшнеп
15.03	чирик-трескунок, юрок
16.03	белобровик
17.03	серый журавль, лесной жаворонок
18.03	болотный лунь
20.03	чёрный коршун
22.03	черныш, бекас
23.03	травник, ремез
26.03	перевозчик, турухтан
27.03	кулик-сорока
28.03	большая выпь
29.03	скопа, большой кроншнеп, большой веретенник, лесная завирушка
30.03	каменка
31.03	чеглок, большой улит, луговой конёк
1.04	малый подорлик
3.04	пеночка-теньковка
4.04	деревенская ласточка
5.04	большой подорлик, малый зуёк, лесной конёк
6.04	поручейник
7.04	погоныш
12.04	удод, желтоголовая трясогузка, славка-черноголовка
13.04	варакушка
14.04	пеночка-весничка

Дата	Вид
15.04	вертишейка, мухоловка-пеструшка
16.04	кукушка, обыкновенная горихвостка
17.04	луговой лунь, фифи, мородунка, жёлтая трясогузка, пеночка-трещотка
18.04	дупель, речная крачка, чёрная крачка
19.04	береговушка, луговой чекан
20.04	воронок, дроздовидная камышевка, славка-мельничек, серая мухоловка
21.04	соловьиный сверчок, малая мухоловка
22.04	мухоловка-белошейка
24.04	перепел
25.04	серая славка
26.04	камышевка-барсучок, соловей
27.04	белокрылая крачка, жулан, тростниковая камышевка
2.05	речной сверчок
3.05	волчок, осоед, коростель, чёрный стриж, обыкновенный сверчок, зелёная пеночка
4.05	иволга, садовая славка
6.05	зелёная пересмешка
7.05	чечевица
8.05	садовая камышевка, болотная камышевка
10.05	ястребиная славка
14.05	золотистая щурка
15.05	северная бормотушка
17.05	малая крачка, козодой
20.05	обыкновенная горлица



Появление новых видов и средняя дневная температура, основанная на измерениях в 12.00 часов дня (по данным <http://www.pogodaiklimat.ru/>) с марта по июнь 2025 г.

Хирт Гроот Куркамп, geert.grootkoerkamp@gmail.com



Краткие сообщения

О встречах и гнездовании некоторых редких видов птиц на территориях музеев-заповедников «Коломенское» и «Царицыно» в 2019–2025 гг.

Артур Кудрявцев, Пётр Богомазов

Мы проводим регулярные наблюдения за птицами в Коломенском с 2013 г. и в Царицыно с 2014 г. В этом сообщении мы рассмотрим случаи гнездования нескольких редких для Москвы видов птиц.

Вяхирь *Columba palumbus*

Включён в 3-е издание Красной книги города Москвы (2022) как «малочисленный вид». По данным этого издания, на 2022 г. гнездование в пределах МКАД было неизвестно, но вяхирь гнезвился в ряде мест за МКАД, в т.ч. вблизи границ «Старой Москвы».

В 2024 и 2025 гг. этот вид не только впервые отмечен нами в Коломенском (23.04.2024 г.) и Царицыно (29.03.2024 г.), но и удалось доказать его гнездование в первом из этих мест.

Весной 2024 г. в районе Голосова оврага в парке Коломенское токовала пара птиц; 22.06 мы встретили их уже вместе с лётными птенцами, которых родители продолжали подкармливать. Мы предполагаем, что гнездо было устроено в кроне высокой липы на склоне Голосова оврага — ниже церкви Иоанна Предтечи, поскольку постройку удалось разглядеть неподалёку от места встречи молодых птиц (на высоте около 15–20 м).

В 2025 г. 26.04 один вяхирь отмечен на том же участке Коломенского. Позже специальные наблюдения мы не вели, но 31.08 видели одну взрослую птицу, которая пролетела с противоположного берега р. Москвы, а затем скрылась в лесу на склоне Голосова оврага: как раз на том же участке, где в прошлом году были обнаружены слётки.

В Царицыне мы впервые увидели вяхиря 29.03.2024 г. на участке парка вблизи ст. метро Орехово: птица издала воркующие звуки и выдала себя полётом с хлопанием крыльев. В 2025 г. с 21.04 по 8.05 на всей территории музея-заповедника были отмечены уже 4–5 токующих и готовившихся к размножению пар вяхиря¹. В одном случае мы наблюдали спаривание.

Седой дятел *Picus canus*

На территории Москвы вид находится под угрозой исчезновения (Красная книга города Москвы, 2022).

В последние несколько лет, по нашим наблюдениям, седые дятлы регулярно зимуют в Измайловском парке, на территории Главного Ботанического сада и в Царицыно.

На территории Царицыно в 2025 г. мы наблюдали пару с 21 до 28.04. До 25.04 встречался только токующий самец: он придерживался участка леса на склоне холма, выступающего клином к месту впадения р. Язвенки в Верхний Царицынский пруд, но также вылетал и к лесной опушке, а оттуда в приречный высокоствольный ивняк на границе с прудом. Самка этого вида впервые отмечена 26.04, когда она вылетела из ближайшего к территории самца лесного участка на открытое и холмистое место с травянистой растительностью. Там

она занялась раскапыванием одного из муравейников, а позже полетела на ближайшую опушку. И в этот момент мы слышали её «перекличку» с токующим вдалеке самцом. Вскоре удалось отметить прилёт самки на территорию самца.

В ивняке 28.04 мы обнаружили дупло в иве на высоте около 10 м, в котором, как оказалось, много времени проводил и ночевал самец: поздно вечером он вылетел из него в ответ на проигрывание голоса самки. Через некоторое время он вернулся и залез в дупло. Позже — в течение недельной волны сильного похолодания и после неё — обнаружить седых дятлов не удалось. А 15.05 в этом месте был замечен скворец, который пел рядом и неоднократно залезал в бывшее ночёвочное дупло самца дятла.

Средний пёстрый дятел *Dendrocopos medius*

Очень редкий на территории Москвы вид (Красная книга города Москвы, 2022).

По нашим наблюдениям, эти птицы уже несколько лет успешно зимуют в Коломенском, Измайлово и в Главном Ботаническом саду.

В Царицыне их брачные крики отмечали и до нас (Красная книга города Москвы, 2022). В 2025 г. 23.03 средний пёстрый дятел выдалбливал дупло в липе на высоте не более 5–6 м, рядом с широкой дорогой, ведущей от Верхнего Царицынского пруда к южной окраине парка (фото 1). Позже мы несколько раз посещали это место: дупло было полностью готово, но дятлы его так и не заселили. Однако 28.05 на том же участке леса — примерно в 50–100 м от первого дупла — мы обнаружили другое дупло этого вида, в котором находился один птенец. Птенец покинул гнездо 29.05. Дупло располагалось в основании кроны липы на высоте 15–20 м. Удалось наблюдать подлёты к дуплу взрослой птицы и моменты кормления птенца (фото 2). Позже, 30.05, в 700 м от дупла, у ст. метро Орехово, по голосу был обнаружен слёт. Он держался высоко в кронах лип, при этом много раз и с небольшими перерывами беспокойно кричал.

Ополовник *Aegithalos caudatus*

По данным 3-го издания «Красной книги города Москвы» (2022) этот вид не был отмечен на гнездовании на территории музея-заповедника Коломенское. За последние шесть лет нам удалось дважды (в 2019 и 2025 гг.) наблюдать гнездование ополовника в этом районе. В 2019 г. 21.04 в «Вознесенском саду» птицы строили гнездо на яблоне (оно было примерно наполовину готово). Строительство продолжалось вплоть до 14.05 (фото 3). В последней декаде апреля мы наблюдали спаривание птиц. Основное участие в постройке гнезда принимала самка. Она вела себя более независимо, а самец старался её сопровождать и был «на подхвате»: ему приходилось долго ждать

¹ От редакции. В базе данных ru-birds.ru есть сообщения Василия Вишневого о гнездовании вяхиря в Царицыно в 2023 г.: 4.06 было найдено жилое гнездо, а 20.09 встречен нераспавшийся выводок.



Фото 1. Средний пёстрый дятел долбит дупло. Царицыно, 23.03.2025 г.
Фото: П.А. Богомазов



Фото 2. Взрослая особь среднего пёстрого дятла кормит птенца. Царицыно, 28.05.2025 г.
Фото: А.А. Кудрявцев




Фото 3. Пара ополовников строит гнездо. Коломенское, 2019 г.
Фото: А.А. Кудрявцев



Фото 4. Самка ополовника в гнезде. Коломенское, 22.05.2019 г.
Фото: А.А. Кудрявцев

своей очереди, чтобы встроить порцию материала в гнездо. Эти различия в поведении нередко позволяли различать партнёров. Начиная с 3.05 самка стала оставаться в гнезде на ночь, а 5 и 6.05 обе птицы ночевали там вместе. Фото гнездовой камеры 5.05 подтвердило отсутствие в ней кладки. Только 15.05 самка впервые проявила себя как насиживающая птица: она не пыталась заниматься обустройством гнезда, а подолгу находилась в нём, иногда выглядывала из летка, реагировала на беспокойные крики рябинников (*Turdus pilaris*), устроивших гнездо неподалёку (фото 4). Под-

твердить наличие кладки в гнезде удалось 23.05, когда на фото мы разглядели 6 яиц. Причём все они располагались с левой стороны лотка, чтобы насиживающая птица могла, не повреждая кладки, заходить и выходить из гнезда. И всякий раз она разворачивалась в нём против часовой стрелки. Именно по этой причине у наблюдавшейся нами самки ополовника 18.05 проявилась устойчивая, видимая издалеку, деформация хвоста: он загнулся крючком в левую сторону. У самца таких изменений не произошло: он только помогал самке, подкармливал её или передавал ей небольшие

пёрышки, пух и т.п., которые самка встраивала в стенки летка. К 28.05 гнездо оказалось разрушенным людьми, которые играли с мячом поблизости.

В 2025 г. 22.03 на окраине яблоневого сада у Дьякова Городища мы заметили пару ополовников, которые собирали строительный материал для гнезда, а на следующий день обнаружили гнездо: оно вновь располагалось в развилке яблони. Ко 2.04 птицы практически завершили строительство гнезда: оно приобрело законченный, «шарообразный» вид с летком. К сожалению, на следующие сутки выпал снег, и началось сильное похолодание. Это привело к тому, что пара ополовников

пропала, а их гнездо постепенно разрушалось и полностью исчезло к середине мая.

Ополовники регулярно зимуют в Коломенском, чаще всего мы встречали их в Голосовом овраге и на верхней границе холма около р. Москвы, со стороны Дьякова Городища. В марте, во время сокодвижения у клёнов, стайки ополовников (помимо других птиц) можно встретить на этих деревьях, когда они пьют сок в местах повреждений коры на стволах или ветках.

Литература

Красная книга города Москвы. 3-е издание, переработанное и дополненное. Отв. ред. Н.А. Соболев. 2022. М., 848 с.

Артур Анатольевич Кудрявцев, Государственный Дарвиновский музей, arthur01959@mail.ru

Петр Анатольевич Богомазов, Государственный Дарвиновский музей

Новый случай гнездования красношейной поганки в Московской области

Владимир Нецветаев, Михаил Невский, Андрей Ровинский

Общие сведения

Красношейная поганка (*Podiceps auritus*) — широко распространённый голарктический вид. Гнездовой ареал включает территорию Евразии от Скандинавии до Берингии и Северную Америку от центральной части Аляски примерно до северной границы США (Мищенко, 2020). В гнездовое время занимает небольшие водоёмы преимущественно лесной и лесотундровой зон, мелкие озёра и старицы в поймах крупных рек (Курочкин, 1982).

В европейской части России гнездящийся перелётный и зимующий на Черноморском побережье Кавказа вид. Распространена в регионе крайне спорадично. За последние десятилетия ареал немного сузился, численность снижается повсеместно. Популяция европейской части оценена в 1,5–2,5 тыс. пар (Мищенко, 2020). Вид занесён в Красный список МСОП (VU, уязвимый), КК РФ (2 категория) (Мищенко, Тарасов, 2021) и ряд региональных Красных книг.

Данные о распространении вида в МО

В Московской обл. очень редкий гнездящийся, редкий пролётный и зимующий вид (Калякин и др., 2023). Занесена в КК МО (1 категория) (Ерёмки, 2018).

К середине 2000-х гг. вид исчез из большинства известных мест гнездования, встречались лишь отдельные пары. В последние годы находится на грани исчезновения в области. В 2009 и 2010 гг. красношейная поганка гнездилась в Бисеровском рыбхозе (Ерёмки, 2018), в 2020 г. там же отмечены две токующие пары, однако подтвердить гнездование не удалось (Скачков, Шведко, 2020). В июле 2021 г. зафиксировано достоверное гнездование в Лотошинском рыбхозе, где отмечена пара птиц с тремя подросшими птенцами (Мищенко, личное сообщение).

Отдельных птиц видели в летний период в Рузском (А. Сазонов, ru-birds.ru) и Дмитровском городских округах (Шведко, 2024). На пролёте встречается ежегодно, известны нерегулярные зимовки на незамерзающем русле р. Москвы (Шведко, 2024).

Случай гнездования в 2025 г.

Нам удалось доказать гнездование красношейной поганки в водно-болотном комплексе Зиборова, находящемся в лесном массиве между дд. Петрушино и Запологи, Орехово-Зуевский ГО.

Болото Зиборова представляет собой водно-болотное пространство округлой формы диаметром ~400 м, общая площадь водного зеркала ~0,04 км². До торфодобычи, по всей видимости, было обычным верховым болотом, в настоящее время на нём много обводнённых участков, отграниченных валами торфа и соединённых протоками. Здесь существует колония озёрной чайки (*Larus ridibundus*) из примерно 100 пар и гнездятся некоторые другие редкие виды (см. статью на с. 3).

Озеро Сольвейг также является водоёмом частично антропогенного происхождения. Площадь водного зеркала ~0,15 км². По периметру озера, особенно с северной части, расположены осоково-пушицевые болота.

Хронология гнездования красношейной поганки:

25.05 одиночная птица отмечена на болоте Зиборова (Д. Губер, А. Кац, Е. Будич, ru-birds.ru).

28.05 авторы обнаружили одиночную птицу на болоте Зиборова и пару птиц, строящих гнездо, на соседнем оз. Сольвейг. Птицы постоянно держались вместе, переносили в клюве гнездовой материал (водную растительность) (фото 1).

24.06 на болоте Зиборова мы нашли взрослую красношейную поганку с птенцом (фото 2). На оз. Сольвейг также встречена пара птиц на значительном удалении от берега.

29.06 на болоте Зиборова отмечена пара птиц с птенцом, там же мы наблюдали 4–5 пар черношейных поганок (*P. nidricollis*) с птенцами разного возраста. На оз. Сольвейг кормилась одиночная красношейная поганка.

Обсуждение

Красношейная поганка в Московской обл., безусловно, является крайне редким видом, однако её численность в регионе требует дополнительной оценки.

Стоит детально исследовать места, где гнездование вида ожидаемо — торфоразработки и озёрно-болотные системы востока области. Так, 4.05.2025 г. в Шатурском ГО на оз. Свиношном отмечена, по-видимому, пролётная одиночная особь (И. Уколов, ru-birds.ru) на подходящей для гнездования территории. Также стоит исследовать Лотошинский и Бисеровский рыбхозы, где гнездование вида отмечали в недалёком прошлом. Все эти места объединяет достаточная кормовая база, и что




Фото 1. Красношейная поганка с гнездовым материалом, 28.05.2025 г. Фото: В.А. Нецветаев




Фото 2. Красношейная поганка с птенцом, 24.06.2025 г. Фото: М.А. Невский

немаловажно, наличие колоний чаек — поганки охотнее селятся под их защитой (Ерёмки, 2018).

Обследование эффективнее всего проводить с лодки без использования мотора. Оптимальный срок проведения учётов — с середины июня по середину июля.

Литература

- Ерёмки Г.С. 2018. Красношейная поганка. — Красная книга Московской области. 3-изд. М., с. 44.
Калякин М.В., Волцит О.В., Конторщиков В. В., Зубакин В.А., Морковин А.А. 2023. Аннотированный список видов птиц Москвы и Московской области. М., 62 с.

Владимир Андреевич Нецветаев, tsvetkov1741@gmail.com
Михаил Андреевич Невский, Андрей Ровинский

- Мищенко А.Л. 2020. Красношейная поганка. — Атлас гнездящихся птиц европейской части России. Ред.-сост. М.В. Калякин, О.В. Волцит. М., с. 58–60.
Мищенко А.Л., Тарасов В.В. 2021. Красношейная поганка *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758). — Красная книга Российской Федерации. М., с. 520–522.
Курочкин Е.Н. 1982. Красношейная поганка. *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758). — Птицы СССР. История изучения. Гагары, поганки, трубконосые. М., с. 312–320.
Скачков С.А., Шведко М.А. 2020. Редкие виды птиц в гнездовой период в Бисеровском рыбхозе. — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 32: 20–24.
Шведко М.А. 2024. Гнездование редких видов поганок Podicipedidae в Московской области. — Рус. орнитол. журн., 33 (2484): 5397–5401.

Первое гнездование чомги в ООПТ «Суханово» и гибель птиц

Мария Аргир

Сухановский пруд на р. Гвоздянке — место обитания множества водоплавающих птиц как в тёплое время года, так и зимой (пруд не замерзает даже в сильные морозы). Здесь обитают различные виды чаек: озёрные (*Larus ridibundus*), серебристые (*L. argentatus*), хохотуны (*L. cachinnans*), а также речные крачки (*Sterna hirundo*), камышницы (*Gallinula chloropus*), серые цапли (*Ardea cinerea*), чирки-свистунки (*Anas crecca*), кряквы (*A. platyrhynchos*), огари (*Tadorna ferruginea*), черныши (*Tringa ochropus*), на пролёте останавливаются гоголи (*Bucephala clangula*), замечены перевозчик (*Actitis hypoleucos*) и фифи (*Tringa glareola*).

В 2024 г. появился, казалось бы, обыкновенный, но новый вид — пара больших поганок (*Podiceps cristatus*) останавливалась пролётом на Сухановском пруду, но задерживаться не стала. Их можно было наблюдать непродолжительное время в мае.

В 2025 г. пара поганок всё же осталась в Суханово, соорудив гнездо на одном из островков. Чомги вывели потомство — 4 птенца, один из которых летом погиб. Однако стоит заметить, что к сентябрю птенцы не полностью оперились, в отличие от чомг на Булатниковском пруду (р. Битца), которые в это время уже поменяли пух на перья. К 11.09 птенцы были полностью оперёнными.

Мария Александровна Аргир, marusinkust@yandex.ru

В р. Гвоздянку в середине августа произошёл залповый сброс неочищенных сточных вод, что стало причиной гибели рыб и крякв. Множество мёртвой мелкой рыбы привлекло падальщиков. На пруд прилетели около 150 чаек: озёрные, хохотуны разных возрастов, серебристые. Грустный птичий пир можно было наблюдать с 18 по 24.08. Также на пруду погибли 15 крякв в основном у русла реки, и позже, 11.09, были найдены пять погибших огарей.

Пруд в заиленной части «кипит», покрыт коркой водорослей, выделяются газы, что, скорее всего, и послужило причиной гибели птиц.

Однако стоит отметить, что лягушки, ужи, болотные черепахи, бобры, серые цапли, чирки-свистунки, поганки и чайки не пострадали. Птицы переместились ближе к плотине, где глубина больше и концентрация вредных веществ меньше, а перелётные виды покинули водоём.



Первая попытка гнездования больших бакланов в Московской области в Лотошинском рыбхозе

Владимир Авдеев

В Лотошинском рыбхозе 1.05.2025 г. на дамбе между 13-м и 12-м прудами на отдельно стоящих нескольких берёзах В.П. Авдеевым и К.И. Ковалёвым были замечены два полностью построенных гнезда, в стенки которых были вплетены ветки с зелёными листьями. Три гнезда явно были ещё не достроены. Рядом с гнездами сидели большие бакланы (*Phalacrocorax carbo*). Это место расположено довольно далеко от основной дороги, проходящей через рыбхоз, по которой нечасто едут машины. Тем не менее, дамба доступна для людей. Редко, но по ней ходят люди — в основном это рыбаки, любители орнитологи и браконьеры. Официально охота в рыбхозе не разрешена, но гильзы от охотничьих ружей попадают. По слухам, по отдельно-

му разрешению местным охотоведам можно стрелять бакланов (мёртвого я видел только одного). При нашем приближении к гнёздам бакланы надолго улетали, а прилетали «заинтересованные» серые вороны (*Corvus cornix*). Было ясно, что положительный результат гнездования в этом месте практически исключён. Гнезда были брошены, скорее всего, до начала кладки яиц. Хотя рядом есть более недоступные для людей места, по мнению С.А. Скачкова, при выборе бакланами места гнездования свою роль сыграло то, что 13-й пруд начали спускать, и в низинных больших лужах во множестве стала доступна рыба. На пруду собирались до 100 бакланов, пока пруд полностью не спустили и лужи постепенно не пересохли.

Владимир Павлович Авдеев, avdvov@mail.ru

Светлые кряквы в Москве и Подмосковье: взрослые и птенцы

Анастасия Поповкина

На разных московских водоёмах в группах крякв (*Anas platyrhynchos*) иногда можно увидеть уток с необычно светлой, «палевой» окраской оперения. Таких птиц встречали в июле 2012 г. в парке 50-летия Октября (К. Авилова, фото 1), в январе 2017 г. на р. Москве в центре города (Г. Виноградов), в ноябре 2018 г. — на 1-м Каменском пруду (Ю. Соколов), в декабре 2018 г. — на р. Сямотеке в Алтуфьевском заказнике (Е. Севрюкова), в марте 2019 и 2021, январе и декабре 2023, 2024 и в декабре 2025 гг. — на р. Яузе в сквере по Олонецкому проезду и в парке Яуза (много наблюдений), в январе 2019 и 2021 гг. — на р. Москве в Марьино (И. Матершев), в ноябре 2020 г. — в Царицыно (В. Дворкин), в январе 2021 г. — на Шибеевском пруду в Кузьминках (М. Пахлеванова), в январе 2022 г. — в зоопарке (В. Тимакова), в феврале того же года — на р. Москве у Нагатинской набережной (Н. Бондарева, фото 2); в ноябре 2023 г. — на пруду около административного корпуса ГБС (О. Лапина). В 2024 г. светлых крякв видели в январе на р. Лихо-

борке в ГБС (Ю. Соколов), в ноябре — на Деревлёвском пруду (С. Апполонов) и в парке Лефортово (И. Бортникова), в декабре — на р. Москве около Братеевского моста (И. Саломатина). Зимой 2024/2025 гг. у Коломенской набережной держалась похожая птица, но чуть более тёмной, рыжевато-окраски (А. Кац, Т. Косых, А. Яковлев). На р. Москве в Коломенском «палевых» крякв встречали каждую зиму, начиная как минимум с 2020 г. (десятки наблюдателей), а в январе 2023 г. там наблюдали одновременно двух таких птиц (А. Лапин). Светлая кряква зимовала на р. Химке в Покровском-Стрешневе в 2024/2025 г. (И. Беляков, Н. Севастьянов) и потом всё лето привлекала там внимание бёрдвотчеров (В. Шипилов, М. Филатов, А. Гришин и др.).



Фото 1. Москва, парк 50-летия Октября, пруд на р. Раменке, июль 2012 г.
Фото: К. Авилова



Фото 2. Москва, Нагатинская набережная, 20.02.2022 г.
Фото: Н. Бондарева




Фото 3. Московская область, пос. Мосрентген, 13.06.2025 г.
Фото: А. Поповкина



Фото 4. Московская область, Котельники, мкр-н Силикат 21.06.2025 г.
Фото: А. Поповкина

Птицы с такой окраской попадались среди крякв «дикого типа» и в Московской обл.: в 2018 г. в д. Покров Солнечногорского ГО (Дмитрий), 2020 г. в Красногорске (С. Башкирцева), 2024 г. в Орехово-Зуеве (пм321), зимой 2024/2025 гг. в Рязани (Т. Никишова, Л. Губанова, О. Богатова). Это далеко не исчерпывающий список мест, дат встреч и авторов наблюдений. Подавляющее большинство приведённых данных почерпнуто на платформе iNaturalist.

Во всех перечисленных выше случаях наблюдали взрослых особей; информации о встречах светло окрашенных утят кряквы в Москве и Подмоскovie найти не удалось.

Летом 2025 г. мы заметили необычно светлых птенцов в выводках кряквы в Московской обл.: 13.06 на пруду в пос. Мосрентген (отклонение в окраске было у 4 из 8 птенцов; фото 3) и 21.06 на пруду в мкр-не Силикат в Котельниках (1 из 6 птенцов; фото 4). Во втором выводке утята были уже практически полностью оперены. Пуховым кряквятам в пос. Мосрентген на момент первого наблюдения было около 20 дней; при повторном посещении этого водоёма через месяц мы застали там этот выводок в полном составе: ни один птенец не исчез, все были уже оперены (фото 5). Помимо окраски, эти утята ничем не отличались от своих «нормальных» собратьев по выводку — ни иными морфологическими

Анастасия Борисовна Поповкина, tadorna@mail.ru



Фото 5. Московская область, пос. Мосрентген, 16.07.2025 г.
Фото: А. Поповкина




Фото 6. Тульская обл., г. Алексин, 14.06.2024 г.
Фото: Д. Доронин (<https://www.inaturalist.org/observations/223061949>)

чертами, ни поведением по отношению к самке или другим членам выводка. Самки тоже одинаково относились ко всем своим птенцам, и тёмным, и светлым.

Единственное наблюдение светлой самки с выводком удалось найти в iNaturalist (фото 6). Фотография сделана на р. Оке в г. Алексин Тульской обл. 14.06.2024 г. (Д. Доронин); все 9 птенцов выглядят как обычные кряквята. К сожалению, ни история, ни судьба этого выводка нам неизвестны.

Высказывались предположения о происхождении этих крякв путём гибридизации крякв «дикого типа» с домашними утками светлых пород и даже о том, что это просто домашние утки, но мы больше склонны считать их животными с аберрантной окраской, возникшей в результате фенотипического проявления рецессивного аллеля в генном локусе светлой окраски (Romanov et al., 1996; эл. ресурс Poultry Genetics for the Nonprofessional) или иных, возможно, более сложных процессов на генетическом уровне, анализ и обсуждение которых — отдельная тема.


Для выяснения причин появления у уток такой окраски необходимо знать детали их родословной (предков в нескольких поколениях), а наиболее точную информацию могут предоставить лишь генетические исследования, которые в приложении к этому вопросу на московских кряквах пока не проводили.

Литература

- Romanov M.N., Wezyk S., Cywa-Benko K., Sakhaty N.I. 1996. Poultry genetic resources in the countries of Eastern Europe — history and current state. — Poultry and Avian Biology, 7 (1): 1–29.
- Sellers H.L. Domestic and Muscovy Duck genes and comments. — Poultry Genetics for the Nonprofessional [Электронный ресурс: URL: <https://sellers.kippenjungle.nl/page6.html>. Дата обращения: 16.09.2025].



Гоша с семьей



Гошин утёнок

Случаи помощничества у московских водоплавающих

Ксения Авилова, Анастасия Поповкина

В этом сезоне внимание многих посетителей музея-заповедника Царицыно привлёк необычный выводок кряквы (*Anas platyrhynchos*) из двенадцати утят, который, помимо самки, сопровождал белолобый гусь (*Anser albifrons*), известный местному населению как Гоша. Гусь повсюду следовал за выводком и отгонял от него всех посторонних птиц. Гоша живёт в Царицыне с 2011 г. и уже не первый год сопровождает крякв с выводками (К. Дем). Возможно, эта птица в отсутствие особей своего вида проявляет «поведение помощничества» по отношению к выводку другого вида гусеобразных. В природе помощничество распространено у более чем двухсот видов птиц, главным образом у воробьиных, а у птиц других отрядов оно встречается гораздо реже (Баккал, 1997). Из водоплавающих такое поведение характерно для обыкновенных гаг (*Somateria mollissima*): крупные объединённые выводки у них зачастую выращивают не только матери птенцов, но и «тётушки» — не размножавшиеся или потерпевшие неудачу при гнездовании самки (Bustnes, 1993). Мы регулярно наблюдаем помощничество у камышиц (*Gallinula chloropus*), когда старшие птенцы кормят младших от одних и тех же родителей. Однако такое поведение подавляющее большинство птиц проявляет по отношению к конспецификам, то есть особям того же вида, а случаи межвидового помощничества редки. О возникновении, эволюции и адаптивной роли этого явления выдвигали ряд гипотез (Lindström, 1991, цит. по: Баккал, 1997). В случае с гусём Гошей это, вероятно, попытка реализовать физиологические потребности в нестандартной ситуации (Ligon, Stacey, 1989), то есть при отсутствии полового партнёра и собственной семьи. В регуляции «родительского» поведения помощников участвует гормон пролактин, уровень которого возрастает в период вылупления птенцов (Schoech, 1994).

Видимо, потеря партнёра или неудача в размножении в сочетании с физиологической потребностью реализовать родительские инстинкты способствовали и проявлению в 2025 г. поведения помощничества у двух самок огаря (*Tadorna ferruginea*). В конце мая мы обратили внимание на огариху, которая «пасла кряквят» вместе с самкой кряквы, постоянно следуя за выводком и отгоняя от него других птиц, на р. Химке в Покровском-Стрешневе (Е. Левещина). Выводок утят в сопровождении кряквы и огарихи видели там и в начале июля (К. Авилова, В. Шипилов), но ... судя по возрасту кряквят, похоже, это был уже другой выводок! Посетив это место в начале августа, один из авторов (АП) обнаружил там сидевшую на отмели среди молодых и взрослых крякв самку огаря, которая периодически отгоняла от места прикормки трёх молодых огарей, откуда-то прилетевших на реку. Вторую такую семью — выводок кряквы с двумя «мамами», самками кряквы и огаря, заметили в конце июня на р. Жабенке в Тимирязевском парке; огариха сопровождала кряквят, ждала отстававших от выводка, стояла в «сторожевой» позе рядом с отдыхающими утятами и подавала сигналы тревоги при возникновении потенциальной опасности (И. Ач). После этого в районных телеграм-каналах появилось ещё несколько сообщений об аналогичных наблюдениях в этом же месте и рядом, на Большом Садовом пруду (например, https://t.me/koptevo_news/2683).

Наблюдать такое поведение у этих птиц было особенно удивительно, учитывая их строгую территориальность и высокий уровень агрессивности по отношению к другим выводкам — как конспецификов, так и птиц других видов — в период размножения. Однако это не первый известный нам случай помощничества у огарей: в 2023 г. в Гагаринском парке Симферополя самка огаря

выращивала трёх лебедят вместе с самцом лебедя-шипуна (*Cygnus olor*), потерявшего партнёршу, мать птенцов, на ранней стадии гнездования. Огариха неотлучно оставалась при выводке с момента вылупления птенцов и до тех пор, когда они вдвое переросли приёмную маму. Репортажи об этом удивительном семействе публиковали местные СМИ (см., например, фото Т. Жеребцовой: <https://dzen.ru/a/ZLKQVQ9UDQneaMGD>). А в Московском зоопарке в 2018 г. два самца огаря вырастили выводок кряквят, прогнав самку-крякву, которая привела их в вольер с ламами и капибарами (Кадетова, 2018). Это уже не «помощничество», но тоже интересный случай «переадресации» родительского поведения.

Семья Гоши из Царицыно в 2025 г. была интересна ещё и тем, что среди кряквят было как минимум два птенца тёмной окраски, что, конечно, вдохновляло посетителей парка на рассуждения об отцовстве Гоши. И, хотя кряквы — чемпионы среди гусеобразных по разнообразию гибридов — могут скрещиваться с гусями рода *Anser*, и такие случаи известны (A Bird Hybrids Database: <http://www.bird-hybrids.com>), однако потомство оказывается нежизнеспособным. В данном случае Гоша был ни

при чём. Когда один из тёмных утят вырос, стало очевидно, что это потомок одной из домашних уток тёмного окраса. Таких полудомашних утят в выводке кряквы мы отмечали там и в 2023 г. В 2025 г. других выводков кряквы в период учёта на прудах Царицына не обнаружили. Так что тёмные утята из Гошиной семьи — скорее всего продукт спаривания кряквы с чёрным домашним селезнем.

Литература

- Баккал С.Н. 1997. Поведение помощничества и забота о потомстве у птиц. — Русский орнитологический журнал, 29: 3–17.
 Кадетова А.А. 2018. Приёмные папы: как огари в зоопарке птенцов кряквы вырастили. — Москва. Новости Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», 28: 62–63.
 Bustnes J. 1993. Exploitation of others' vigilance by the common eider *Somateria mollissima*. — Wildfowl, 44: 108–110.
 Ligon J.D., Stacey P. 1989. On the significance of helping behaviour in birds. — Auk, 106 (4): 700–705.
 Schoech S.J. 1994. Prolactin and helping behavior in Florida scrub jays *Aphelocoma coerulescens*. — J. Ornithol., 135: 69.

Ксения Всеволодовна Авилова, wildlife@inbox.ru
 Анастасия Борисовна Поповкина, tadorna@mail.ru

Пискулька (?) в небе над Москвой

Даниил Давыдов

В ходе мониторинга биоразнообразия Москвы 1.04.2025 г. была сфотографирована стая гусей, летевших над Люблинскими прудами на северо-восток неподалёку от ст. м. «Волжская». Преобладающим видом в стае были белолобые гуся (*Anser albifrons*), также был отмечен гугенник (*A. fabalis*).

При просмотре на компьютере отснятых материалов среди них была обнаружена пискулька (*A. erythrorus*). На фотографии птица представлена в сопровождении двух белолобых гусей и одного гугенника.

Даниил Вадимович Давыдов, cygnusolor878@gmail.com



От редколлегии. Приводим мнение члена Фаунистической комиссии Рабочей группы по гусеобразным Е.А. Коблика. «По фотографии такого низкого качества невозможно однозначно подтвердить определение пискульки. Да, гусь по размерам, пропорциям, окраске брюха, больше всего похож на пискульку, но на подобных фото остаётся примерно 10–20% на ошибку из-за ракурсов и относительных расстояний между птицами. Ключевые признаки — орбитальное кольцо, распространение «лысины» на макушку, величина и форма клюва, проекция крыльев относительно хвоста, которые необходимы для определения пискульки, здесь не видны».

О гнездовании и питании птенцов у двух пар перепелятника на территории памятника истории «Бутовский полигон» и в его окрестностях

Вячеслав Артамонов, Ксения Семёнова

Мы ведём наблюдения за гнездованием перепелятника (*Accipiter nisus*) на территории памятника истории «Бутовский полигон» и в ближних окрестностях с 2015 г. (см.: Артамонов, 2015; Артамонов, 2020; Артамонов, 2021). В 2020 и 2021 гг. выявлены 2 регулярно занимаемых гнездовых участка, удалённых друг от друга на расстояние 2,5 км. На этих участках обнаружены жилые гнёзда и в 2025 г.

Гнездо № 1 находилось в молодом ельнике (высота деревьев примерно 17 м) на высоте около 8 м у ствола. Гнездо имело овальную форму 80×35 см. Ло-

ток выложен тонкими берёзовыми веточками. Число отложенных яиц осталось неизвестно. Первый осмотр гнезда проведён 6.06: в это время, так же как и 16.06, в гнезде находились 5 пуховых птенцов (фото 1). Вылет слётков происходил в конце месяца: 28.06 в гнезде отмечены 3 готовых к вылету птенца (фото 2).

Гнездо № 2 расположено в посадках молодых сосен на высоте около 6 м у ствола. Гнездо плотное, многолетнее. Размеры гнезда 55×60 см. 5.05 в гнезде находились 3 яйца, 26.05 — 4 яйца (фото 3). Откладка 4-го яйца произошла, очевидно, 5–6.05. К 28.06 в гнезде



Гнездо перепелятника на ели. Фото 1 (слева) 6.06, фото 2 (справа) 28.06 птенцы перед вылетом. Фото: В.Б. Артамонов



Фото 3. Гнездо перепелятника на сосне, 26.05.

Фото: В.Б. Артамонов



Фото 4. Птенцы в гнезде на сосне, 28.06.

Фото: В.Б. Артамонов

были 3 подросших птенца (фото 4). Вылет слётков проходил в середине первой декады июля: 5.07 в гнезде находились два крупных птенца, и 1 слёток был встречен поблизости (фото 5).

Таким образом, разница в сроках гнездования у двух данных пар перепелятников составила около 7 дней. Материал для анализа питания птенцов собран в обоих гнёздах 4.09.

Сбор из гнезда на ели состоял в основном из перьев. Надёжно удалось определить¹ большую синицу *Parus major*, мухоловку-пеструшку *Ficedula hypoleuca* (juv.), полевого воробья *Passer montanus* (juv.), белую трясогузку *Motacilla alba*, зяблика *Fringilla coelebs* и коноплянку *Linaria cannabina* (ad.). Две погадки содержали шерсть мелкого млекопитающего.

Сбор из гнезда на сосне, напротив, не содержал перьевого материала, пригодного для довидового определения. По костным останкам достоверно удалось оценить лишь примерный размер видов жертв. Так, 1 предплечье, плечо, киль и лапа принадлежат птице, сопоставимой по размеру с белобровиком *Turdus iliacus*; 2 остатка киля — птице, сопоставимой по размеру с мухоловкой-пеструшкой, 5 остатков килей — с большой синицей, 1 — с зябликом; 2 плеча, 3 лопатки, 1 лапа также



Фото 5. Слёток из гнезда на сосне, 5.07. Фото: С.А. Сухоруков

сопоставимы по размеру с зябликом; единственный относительно целый череп принадлежит белой трясогузке.

В целом, как можно видеть, спектр жертв в том и другом случае не обнаруживает значительной разницы: преобладают мелкие воробьеобразные птицы. Для сравнения укажем, что анализ спектра питания в 2015 г., проведённый В.Н. Калякиным, выявил преобладание в добыче дроздов (см. Артамонов, 2015).

Сбор погадочного материала и наблюдения на территории «Бутовского полигона» осуществлял В.Б. Артамонов; разбор погадок и определение видов жертв проведены Кс.П. Семёновой. Исследование

¹ Мы выражаем искреннюю благодарность Я.А. Редькину за помощь в уточнении видовой принадлежности ряда видов-жертв.

Кс.П. Семёновой выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова.

Литература

Артамонов В.Б. 2015. Гнездование перепелятника на территории памятника истории «Бутовский полигон». — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 22: 50–54.

Вячеслав Борисович Артамонов, slava_butovo@mail.ru
Ксения Павловна Семёнова, semionova@zmmu.msu.ru

Артамонов В.Б. 2020. О гнездовании некоторых редких видов птиц на территории памятника истории «Бутовский полигон». — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 32: 52–54.

Артамонов В.Б. 2021. Гнездящиеся птицы квадрата 37UDB1_22 по наблюдениям в 2021 г. — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 34: 8–12.

Степной орёл в Московской области

Сергей Скачков

Степной орёл (*Aquila nipalensis*) отсутствовал ранее в списках птиц Москвы и Подмосковья (Птушенко, Иноземцев, 1968; Калякин, Волцит, 2006; Мосалов и др., 2011; Атлас птиц ..., 2014). В аннотированный список птиц Москвы и Московской области (Калякин и др., 2023) вид был включён как залётный на основании двух встреч: в Виноградовской пойме 30.04.2011 г. (по сообщению авторов находки П.Ю. Пархаева и Н.В. Кудрявцева, птица определена по характерной для молодых и неполовозрелых особей широкой светлой полосе по нижней кромке кроющих перьев испода крыла) и молодой птицы, сфотографированной 28.07.2015 г. в окр. Буньково и Ламоново в ГО Ступино (К. Ординарцев). В 2014 г. 10.03 А.Е. Варламов, П.Ю. Пархаев и С.А. Скачков наблюдали молодого степного орла, пролетавшего в северо-восточном направлении недалеко от границы Московской и Тульской обл. (Интересные встречи ..., 2014). После 2015 г. сведений о регистрации вида в области не поступало.



Степной орёл, Волоколамский МО, 28.04.2025 г.

Фото: С.А. Скачков

В 2025 г. 28.04 я наблюдал, как со стороны д. Петровское Волоколамского муниципального округа в ЮЮВ направлении пролетел орёл, привлёкший внимание своими размерами и окраской. Особенно хорошо была заметна широкая светлая полоса по нижней кромке кроющих перьев испода крыла (фото), а также высокий клюв, сильно выраженные надбровные дуги, крупные глаза и широкая крупная голова. Были хорошо видны желтоватые валики в углах рта, заходящие далеко к глазу (фото). Собранные фотографии были отправлены в фаунистическую комиссию Мензбировского орнитологического общества Е.А. Коблику, а также Дику Форсману (специалисту по хищным птицам и автору нескольких определителей) и Карстену Андерсону (фотографу, снимавшему сотни степных орлов во всевозможных нарядах на зимовке в Омане). Птица была определена как степной орёл во втором годовом наряде со следами линьки из первого. Определение вида подтверждено всеми специалистами.

Литература

Атлас птиц города Москвы. 2014. Ред.-сост. М.В. Калякин, О.В. Волцит, Х. Гроот Куркамп. Науч. ред. Н.С. Морозов. М.: «Фитон XXI». 332 с.

Калякин М.В., Волцит О.В. 2006. Атлас. Птицы Москвы и Подмосковья. София-Москва: Pensoft. 372 с.

Калякин М.В., Волцит О.В., Контрощиков В.В., Зубакин В.А., Морковин А.А. 2023. Аннотированный список видов птиц Москвы и Московской области. М., 60 с.



Степной орёл, Гаврилково, 15.05.2025 г. Фото Е.В. Швыдун

Интересные встречи. Октябрь 2013 г. — март 2014 г. Волцит О.В., Гроот Куркамп Х. (сост.). — Москва. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 19: 50–60.
 Мосалов А.А., Зубакин В.А. и др. 2011. Птицы Москвы и Подмосковья. Полевой определитель. М.: Союз охраны птиц России, 232 с.

Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М., изд-во Моск. ун-та, 461 с.

Сергей Александрович Скачков, ssk.67@mail.ru

От редакции. В этом году степной орёл отмечен ещё в одном месте Московской обл.: по данным Е.В. Швыдун 15.05 птица (фото) пролетела с севера на юг в долине р. Сходни восточнее Гаврилково (ГО Красногорск).

Встреча одноногого галстучника в Строгине

Игорь Кузиков

Галстучник (*Charadrius hiaticula*) — редкий пролётный вид Подмосковья (Калякин и др., 2023). Пути перемещений галстучников в России, за исключением Чукотки, изучены мало (Томкович, 2023). Их осенние миграции от мест гнездования на европейском северо-востоке России известны по результатам кольцевания как по линиям побережий на юго-запад, так и в южном направлении (Зифке, Кастепыльд, 1985; Естафьев, 1995; Томкович и др., 2018; Томкович, 2023). В Московской обл. галстучник на осеннем пролёте в 1950-х годах зарегистрирован на Нарских прудах, на станции Трудовая (Мытищинский ГО) и на Люберецких прудах (Птушенко, Иноземцев, 1968). За последние 25 лет география встреч этого вида в Подмосковье значительно расширилась. Наиболее часто галстучника наблюдали в Дмитровском ГО, Лотошинском и Бисеровском рыбхозах, на Нарских прудах и в некоторых других местах (Калякин, Волцит, 2006; база данных ru-birds.ru).

Встречи галстучника в Москве в пределах Московской кольцевой дороги (МКАД) единичны. Впервые самец и молодая птица были добыты в XIX в. в августе на берегу р. Москвы вблизи Симонова монастыря (Lorenz, 1892, цит. по Птушенко, Иноземцев, 1968). В последние годы случаи регистрации галстучника в Москве не отмечены (Калякин, Волцит, 2006; Калякин и др., 2014). Недавно, 7.09.2025 г., две особи были встречены вблизи Москвы, на Лохином острове (ГО Красногорск) А.В. Голубевой и В.А. Моисейкиным (база данных ru-birds.ru).

В Строгине на северо-западе Москвы на песчаном берегу Большого Строгинского затона 18.09.2025 г. впервые в период многолетних наблюдений в этом районе (Кузиков, 2020; база данных ru-birds.ru) встречена молодая травмированная особь галстучника (фото). У куличка, выглядевшего весьма упитанным и бодрым, полностью отсутствовала левая задняя конечность, что не мешало ему уверенно передвигаться короткими прыжками по побережью у самого уреза воды в поисках корма. Вероятно, этому способствовал ровный уплотнённый песчаный грунт пляжа. Галстучник держался уверенно и подпускал наблюдателя на расстояние до 4–5 м, легко и без усилий перелетая на короткое расстояние при слишком близком к нему приближении и возобновляя кормёжку.

В литературе известны и описаны несколько случаев встреч птиц с аналогичными травмами ног. Наиболее часто отмечали травмированных и одноногих маскированных (*Motacilla personata*) и белых трясогузок (*M. alba*), у которых отсутствовали пальцы, полностью или частично плюсна или голень (Подковыркин, 2006; Березовиков, 2015; Березовиков, Казенас, 2018а, 2018б; Назин, Назин, 2021). Из других воробьеобразных птиц с одной задней конечностью встречали у галок

(*Corvus monedula*), серых ворон (*C. cornix*) (Пономарев, 2007), горихвосток-лысушек (*Phoenicurus phoenicurus*) (Прокофьева, 2006) и поползней (*Sitta europaea*) (Шумаев, 2019). Особей с травмированными ногами наблюдали и у некоторых видов куликов: фифи (*Tringa glareola*), перевозчик (*Actitis hypoleucos*), турухтан (*Philomachus pugnax*), большой веретенник (*Limosa limosa*), чернозобик (*Calidris alpina*), краснозобик (*C. ferruginea*), морской зуёк (*Charadrius alexandrinus*) (Назин, 2018; Назин, Назин, 2021).

Взрослый одноногий галстучник с аналогичной травмой, как у встреченной в Строгине особи, отмечен на побережье Печорского моря во время осенней миграции (Пчелинцев, 2014). В отличие от «московского гостя» он не прыгал, а перепархивал с места на место в поисках корма.

Выражаю благодарность П.С. Томковичу за подтверждение правильности определения вида и возраста птицы.

Литература

- База данных «Онлайн дневники наблюдений»: <http://ru-birds.ru>. Дата последнего обращения: 18.09.2025.
 Березовиков Н.Н. 2015. Случай прижизненного травматизма маскированной трясогузки *Motacilla personata*. — Рус. орнитол. журн., 24 (1199): 3633–3634.
 Березовиков Н.Н., Казенас В.Л. 2018а. Новый случай прижизненного травматизма маскированной трясогузки *Motacilla personata* на Северном Тянь-Шане. — Рус. орнитол. журн., 27 (1602): 2025–2026.
 Березовиков Н.Н., Казенас В.Л. 2018б. Ещё одна встреча с травмированной маскированной трясогузкой *Motacilla personata* в городе Алматы. — Рус. орнитол. журн., 27 (1628): 3012–3013.
 Естафьев А.А. 1995. Отряд Charadriiformes ржанкообразные. Фауна европейского северо-востока России. Птицы. Т. 1. Ч. 1. Нево-робьиные. СПб, с. 177–304.
 Зифке А., Кастепыльд Т.А., 1985. Галстучник *Charadrius hiaticula* L. Миграционные пути и места зимовки птиц известного про-



- исхождения. — Миграции птиц Восточной Европы и Северной Азии: Журавлеобразные — ржанкообразные. М., с. 40–51.
- Калякин М.В., Волцит О.В. 2006. Атлас. Птицы Москвы и Подмосковья. София-Москва, 372 с.
- Калякин М.В., Волцит О.В., Конторщиков В.В., Зубакин В.А., Морковин А.А. 2023. Аннотированный список видов птиц Москвы и Московской области. М., 60 с.
- Калякин М.В., Волцит О.В., Куркамп Х.Г. (ред.-сост.), Морозов Н.С. (науч. ред.). 2014. Атлас птиц города Москвы. М., 332 с.
- Кузиков И.В. 2020. Водоплавающие и околоводные птицы Большого Строгинского залива реки Москвы и его окрестностей. — Рус. орнитол. журн., 29 (1915): 1839–1869.
- Назин А.С. 2018. О встречах в Оренбургской области птиц с дефектами клюва, травмами конечностей и аномальной окраской оперения. — Рус. орнитол. журн., 27 (1697): 5679–5687.
- Назин А.С., Назин Я.А. 2021. О встречах птиц с травматическими дефектами в Светлинском районе Оренбургской области. — Рус. орнитол. журн., 30 (2038): 852–865.
- Подковыркин Б.А. 2006. О встречах птиц с травматическими повреждениями. — Рус. орнитол. журн., 15 (311): 214–215.
- Пономарев В.А. 2007. Повреждения у массовых видов врановых птиц в городах Ивановской области. — Экология врановых в естественных и антропогенных ландшафтах: Сб. материалов VIII Международной научно-практической конференции «Экология врановых в естественных и антропогенных ландшафтах». Под ред. В.М. Константинова. Ставрополь, с. 197–199.
- Прокофьева И.В. 2006. О существовании птиц с травмами и болезнями. — Рус. орнитол. журн., 15 (311): 203–205.
- Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М., 461 с.
- Пчелинцев В.Г. 2014. Встреча одноногого галстучника *Charadrius hiaticula* на побережье Печорского моря во время осенней миграции. — Рус. орнитол. журн., 23 (983): 1001–1003.
- Томкович П.С. 2023. Прогресс в познании миграций куликов России. — Охрана окружающей среды и заповедное дело, 1: 115–122.
- Томкович П.С., Портер Р., Локтионов Е.Ю., Сыроечковский Е.Е. 2018. Трансконтинентальные пути и сезонные перемещения азиатского мигранта — галстучника *Charadrius hiaticula tundrae*. — Рус. орнитол. журн., 27 (1566): 655–673.
- Шумаев В.С. 2019. Зимовка травмированных поползней *Sitta europaea* в селе Черга (Горный Алтай). — Рус. орнитол. журн., 28 (1755): 1624–1625.
- Игорь Викторович Кузиков, kuzikov-y@mail.ru

О современном статусе домового сыча в Московской области

Владимир Нецветаев, Михаил Невский, Катрина Шамина

Общие сведения

Домовый сыч (*Athene noctua*) — широко распространённый вид Старого Света. Гнездится в северной Африке и южной части Евразии, обитает преимущественно в пустынях, полупустынях и ксерофильных горах, в Европе проникает в лесную зону по антропогенным ландшафтам. На большей части ареала оседлый вид (Приклонский, 2001; Сарычев, 2020).

В европейской части России в первой половине XX в. вслед за вырубкой лесов и остепнением больших территорий происходило расширение ареала номинативного подвида *A. n. noctua* в северном направлении. Во второй половине XX в. северная граница ареала проходила в районе Пскова, Москвы, Мещёры и восточнее к северу до 55° с.ш. К настоящему времени очертания этой границы практически не изменились, однако в северной части ареала номинативный подвид исчез во многих районах прежнего гнездования и сейчас распространён спорадично, а его пребывание носит неустойчивый характер. Падение численности связывают как с массовым применением пестицидов в сельском хозяйстве, так и с ликвидацией ферм и летних стойбищ скота из-за сокращения пастбищного животноводства (Конторщиков, 2018; Сарычев, 2020).

В средней полосе обитает исключительно в селитебных и пастбищных ландшафтах. Охотнее всего гнездится на фермах, складах, чердаках и других подобных объектах, где многочисленны мелкие грызуны, являющиеся основной добычей сычей (Сарычев, 2020).

Данные о распространении вида в МО

В Московской обл. очень редкий гнездящийся и зимующий вид, занесён в ККМО (Калякин и др., 2023). В 1939 и 1940 гг. гнезвился в Дмитрове (Кисленко, Ерохин, 1998). До 1970–1980-х гг. считался относительно обычным, хоть и малочисленным видом в Приокско-Тerrasном заповеднике, где в последние 25 лет, по-видимому, не встречался. В 1993 и 1994 гг. зарегистрировано гнездование в Люберецком р-не, в 1996 г. в Волоколамском

р-не, в 2001 и 2002 гг. на границе Подольского и Наро-Фоминского районов в окрестностях биогеоценотической станции ИПЭЭ РАН в Малинках (Конторщиков, 2008).

За последние 10 лет в МО известны единичные встречи. Живая птица, сбита автомобилем, найдена в окрестностях с. Николо-Кропотки, Талдомский ГО, 28.08.2017 г. В 2018 и 2019 гг., по сведениям местного населения, одна птица постоянно держалась на территории рыболовно-гостиничного комплекса поблизости от с. Николо-Кропотки (Шариков и др., 2024). В 2020–2024 гг. регулярно встречался в окрестностях д. Козино, Волоколамский ГО (А.Б. Костин, ru-birds.ru). В местах этих наблюдений можно предполагать возможное гнездование.

Результаты наблюдений в 2025 г.

При обследовании квадратов по проекту создания атласа птиц Московской обл. 3.07 авторы обнаружили одну птицу на действующей ферме в центральной части Луховицкого ГО. Наблюдения проводили в сумерках, приблизительно в 22:00. Сыч сидел на крыше одного из зданий фермы, затем перелетел на столб и далее скрылся из вида.

При повторном обследовании этого места 5.07 обнаружено двое сычей. Птицы вокализировали как минимум с 19:00, отвечали на проигрывание аудиозаписи. После 20:30 активность повысилась, птицы начали перелетать и посещать выемку в крыше другого здания, которая, как нам кажется, и была непосредственным местом гнездования.

Через две недели, 18.07, мы видели одну птицу на закате (приблизительно в 21:00). Сыч вылетел из гнездовой выемки и в течение последующих 50 мин. держался в ближайших окрестностях. Обратного в выемку не возвращался.

По результатам обсуждения с В.В. Конторщиковым, С.В. Волковым и А.В. Шариковым данный случай можно считать подтверждённым гнездованием на осно-



Очевидно, этого же сыча сфотографировал В.П. Авдеев 23.08.2025 г.

ве критерия С13 («Встречены взрослые птицы, прилетающие на свой гнездовой участок и покидающие его при обстоятельствах, указывающих на жилое гнездо »).

Обсуждение

Несмотря на снижение численности домового сыча на севере ареала в настоящее время вид регулярно гнездится в средней полосе — например, в Рязанской и Нижегородской областях его численность относительно стабильна (inaturalist.org, ru-birds-ru). Также по результатам наблюдений этого года впервые

Владимир Андреевич Нецветаев, tsvetkov1741@gmail.com
 Михаил Андреевич Невский, Катрина Юрьевна Шамина

Филин на севере Московской области: новая регистрация и сведения о питании

Егор Пылёв, Александр Шариков

В конце XIX века филин (*Bubo bubo*) был довольно обычным видом в глухих лесах Подмоскovie, но с 1960-х гг. его численность в регионе начала сильно снижаться, вероятно, вследствие вырубки лесов (Птушенко, Иноземцев, 1968; Конторщиков, 2018). Спектр питания филина на всём протяжении ареала включает почти 700 видов животных, в умеренных и таёжных регионах основу питания составляют прежде всего грызуны (Penteriani, Delgado, 2019; Волков, Шариков, 2021). Из-за чрезвычайной редкости филина в Московской обл. не так много информации по экологии, в том числе питанию, данного вида в регионе. Например, в погадках филина, собранных на месте гнездования весной 2004 г. в окрестностях Лотошинского рыбхоза (Лотошинский округ), найдены остатки обыкновенной полёвки (*Microtus arvalis*), водяной полёвки (*Arvicola amphibius*), полёвки-экономки (*Microtus oeconomus*) и филина (Шариков и др., 2009).

Во время проведения учётов хищных птиц 12.06.2025 г. в Талдомском городском округе, на участке Апсарёвское урочище заказника Журавлиная родина,

с 2002 г. выявлено подтверждённое гнездование в Московской обл.

Для получения более подробной информации о современном статусе вида в Подмоскovie необходимо провести обследование действующих ферм, в первую очередь на юге региона — в Каширском, Луховицком, Зарайском и Серебряно-Прудском городских округах.

Наиболее эффективно проводить учёты в сумерки и в ночное время — в период высокой вокальной активности домового сыча, в Московской обл. лучше всего в марте и апреле.

Литература

- Калякин М.В., Волцит О.В., Конторщиков В. В., Зубакин В.А., Морковин А.А. 2023. Аннотированный список видов птиц Москвы и Московской области. М., 62 с.
- Кисленко Г.С., Ерохин В.Б. 1998. Новые сведения о распространении и экологии редких видов птиц Московской области. — Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России. Материалы совещания «Редкие птицы центра Европейской части России» (Москва, 25–26.01.1995). М., с. 74–79.
- Конторщиков В.В. 2008. Домовый сыч. — Красная книга Московской области. 2-е изд. М., с. 88.
- Конторщиков В.В. 2018. Домовый сыч. — Красная книга Московской области. 3-е изд. М., с. 91.
- Приклонский С.Г. 2001. Птицы России и сопредельных стран: домовый сыч *Athene noctua* (Scopoli, 1769). — Рус. орнитол. журн., 158: 763–778.
- Сарычев В.С. 2020. Домовый сыч. — Атлас гнездящихся птиц европейской части России. Ред.-сост. М.В. Калякин, О.В. Волцит. М., с. 459–461.
- Шариков А.В., Гринченко О.С., Волков С.В., Хромов А.А., Свиридова Т.С., Конторщиков В.В., Вартаньянц О.А., Ковинька Т.С., Массальская Т.С., Педенко А.С., Зотов Д.А., Шишкина Е.М., Макаров А.В., Иванов М.Н. 2024. Встречи некоторых редких видов дневных хищных птиц и сов на севере Московской области в 2015–2024 гг. — Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России. Материалы VII совещания «Распространение и экология редких видов птиц Нечернозёмного центра России». М., с. 198–200.

был встречен филин (рис. 1). В 12:20 птица слетела с упавшей ивы на поле у мелиоративной канавы, которую использовала как место для днёвки. Второй раз птица была встречена 21.06 в 22:30 на ЛЭП у автомобильной дороги, примерно в 500 м от места первой встречи. Вероятно, столбы ЛЭП филин использовал как присаду для охоты.

Во время первой регистрации филина под деревом была обнаружена погадка длиной ~10 см (рис. 2). При разборе погадки были найдены кости 5 особей полёвок-экономок, 3 особей обыкновенной полёвки и надкрылье жука-щелкуна (*Ampedus* sp.).

Собранная информация подтверждает результаты прошлых исследований по питанию филина в Московской обл., где большую часть его рациона составляют грызуны. Интересен первый доказанный факт питания насекомыми для филина в области.

Литература

- Волков С.В., Шариков А.В. 2021. Филин *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758). — Красная книга Российской Федерации, 2-е издание, с. 781–783.



Рис. 1. Филин в Апсарёвском урочище, 12.06.2025 г.
Фото: Е.М. Пылёв



Рис. 2. Погадка филина. Фото: Е.М. Пылёв

Конторщikov В.В. 2018. Филин. — Красная книга Московской области, издание третье, переработанное и дополненное, с. 89.
Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. МГУ, 461 с.

Егор Михайлович Пылёв, proge03@yandex.ru
Александр Викторович Шариков, avsharikov@ya.ru

Шариков А.В., Холопова Н.С., Волков С.В., Макарова Т.В. 2009. Обзор питания сов в Москве и Подмосковье. — Совы Северной Евразии: экология, пространственное и биотопическое распределение. М., с. 188–203.
Penteriani V., del Mar Delgado M. 2019. The eagle owl. — Bloomsbury Publishing, 384 p.

Питание серой неясыти на «Бутовском полигоне» (с конца марта до начала сентября 2025 года)

Ксения Семёнова, Вячеслав Артамонов

Мы продолжаем публиковать сведения о пребывании и питании серой неясыти (*Strix aluco*) на территории памятника истории «Бутовский полигон». В данной заметке приведены данные за период с конца марта по начало сентября 2025 г. В дубраве Бутовского полигона продолжает держаться одиночная особь рыжей окраски, впервые отмеченная здесь 3.01.2025 г. В конце марта сова сменила своё убежище: из дупла на дубе в глубине леса она переместилась на расстояние 600 м в дупло тоже на дубе рядом с мемориальной зоной. Это новое убежище образовалось осенью

2024 г. в результате слома ствола после раннего снегопада. Под этим дуплом в апреле и мае 2025 г. собрано несколько погадок. Преимущество нового дупла состоит в близости лесных полян и открытых участков в мемориальной зоне. Однако место это более посещаемое: дупло просматривается с дороги, что, вероятно, вынудило сову вернуться в прежнее дупло в глубине леса, где она была вновь обнаружена 30.07 и встречалась здесь в дальнейшем. Около дупла 8.08 и 6.09 проведены сборы погадок; результаты представлены в таблице.

Таблица. Видовой состав добычи серой неясыти на «Бутовском полигоне» (число жертв / доля в %) с конца марта до начала сентября 2025 г.

Вид жертвы	Дата сбора			
	31.03.2025	15.04.2025	8.08.2025	6.09.2025
Полевая мышь <i>Apodemus agrarius</i>				1/20
Малая лесная мышь <i>Sylvaemus uralensis</i>	2/100			
Желтогорлая мышь <i>Sylvaemus flavicollis</i>			1/20	
Домовая мышь <i>Mus musculus</i>				1/20
Серая крыса <i>Rattus norvegicus</i>		2/66.7		
Дрозд (мельче рябинника) <i>Turdus</i> sp. / Скворец <i>Sturnus vulgaris</i>			1/20	1/20
Мелкие воробьеобразные			1/20	1/20
Жаба <i>Bufo</i> cf. <i>bufo</i>		1/33.3	1/20	
Жужелицы <i>Carabidae</i> ¹			1/20	
Усач-кожевник <i>Prionus coriarius</i> ^{1,2}				1/20
Всего	2/100	3/100	5/100	5/100

¹ Мы благодарим А.А. Гусакова за помощь в определении видов жуков по фрагментам хитина.

² Массовый лёт усачей-кожевников наблюдался 27–28.07.2025 г. Обычно он продолжается 2–3 недели.

Сбор погачного материала и наблюдения на территории «Бутовского полигона» осуществлял В.Б. Артамонов; разбор погачок и определение видов

Ксения Павловна Семёнова, semionova@zmmu.msu.ru
Вячеслав Борисович Артамонов, slava_butovo@mail.ru

жертв проведены Кс.П. Семёновой. Исследование Кс.П. Семёновой выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова.

Гнездо под снегом: как сова насиживала яйца в апрельские снегопады

Екатерина Хлебникова, Александр Шариков, Сергей Волков

Внезапные весенние заморозки с большим количеством осадков могут серьёзно повлиять на жизнь птиц. Птицы способны переносить низкие температуры при обилии пищи, но толстый слой снега делает её недоступной (Формозов, 1990). В гнездовой период всё ещё осложняется необходимостью согреть кладку. У дневных хищных птиц насиживание в снегопады не редкость, такие факты известны для белоголовых орланов (*Haliaeetus leucoccephalus*), орланов-белохвостов (*H. albicilla*), могильников (*Aquila heliaca*), орлов-карликов (*Hieraaetus pennatus*) (информация с веб-камер на открытых интернет-источниках). Но у сов подобные случаи наблюдают редко. Например, известно насиживание кладки заснеженной самкой виргинского филина (*Bubo virginianus*).

В сети заказчиков «Журавлиная родина» на севере Московской обл. в 2025 г. с 8.02 по 8.05 над гнездом ушастой совы (*Asio otus*) была установлена цифровая камера EUFY 4G Starlight. Гнездо находилось в заплот-

ненном ветками ведре с просверленными снизу отверстиями. Во время гнездования отмечены отдельные периоды с экстремальными весенними похолоданиями. В начале апреля 2025 г. стояла тёплая погода без осадков, дневные температуры достигали +14,5°C, а ночные не опускались ниже 0°C. Однако с 5.04 начались заморозки, а 7.04 выпало сразу несколько сантиметров снега. Нам было интересно проследить, как вели себя совы в этот неблагоприятный период.

Совы начали регулярно посещать гнездо 14.02, а 8.03 самка отложила первое яйцо. Полная кладка состояла из шести яиц, которую сова плотно насиживала. Птица часто занималась уходом за оперением, а каждую ночь по несколько раз на небольшое время покидала гнездо. Пищей её обеспечивал самец, принося за ночь от 2 до 7 грызунов. Утром 7.04 начался снегопад, припорошенная снегом самка сидела в гнезде и ни разу не улетела из него за ночь. К следующей ночи погода ухудшилась. Ведро занесло снегом до краев, у совы




Фото 1. Ушастая сова в занесённом снегом гнезде (8.04, 22:32).



Фото 2. Передача добычи от самца (9.04, 00:09).




Фото 3. Два выплывшихся птенца (9.04, 00:51).



Фото 4. Тающий снег в ведре вокруг трёх птенцов (10.04, 19:54).

остались видны только голова и часть крыльев (фото 1). При этом самка практически не шевелилась, поднимая голову только во время передачи добычи (фото 2). Всё это время самец приносил ей грызунов, изменение погоды не повлияло на темпы его охоты. Помимо шума ветра в это же время стал слышен писк из гнезда. Один раз за ночь с 8 на 9.04 сова улетела на 13 минут, и в снегу показались два недавно вылупившихся птенца (фото 3). Утром 9.04 высота снежного покрова достигла 14 см, снег был выше края ведра. Все последующие дни самка покидала гнездо 1–2 раза за ночь на несколько минут, а при насиживании не тратила силы на чистку перьев или попытки стряхнуть снег. Окончательно снег стоял 13.04, на тот момент вылупились уже 4 птенца.

Екатерина Юрьевна Хлебникова, katya.hlebyshek@mail.ru
Александр Викторович Шариков, avsharikov@ya.ru
Сергей Валерьевич Волков, owl_bird@mail.ru

Таким образом, внезапное ухудшение погодных условий весной 2025 г. и наличие снега в самом гнезде не помешало совам пережить этот неблагоприятный период и вывести птенцов (фото 4).

Мы выражаем благодарность О.С. Гринченко за возможность работы на территории сети заказников «Журавлиная родина», отдельное спасибо компании Anker Innovations, предоставившей камеру для биологических исследований.

Литература

Формозов А.Н. 1990. Снежный покров в жизни млекопитающих и птиц. 2-е изд. М.: изд-во Московского университета, 286 с.

Необычный случай гнездования золотистой щурки в долине Протвы

Никита Кадетов, Екатерина Чумакова, Анастасия Кадетова

В среднем течении Протвы, вблизи границ Наро-Фоминского ГО Московской и Боровского р-на Калужской областей расположен полигон Сатинской учебно-научной станции географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Здесь с конца 1960-х годов студенты первого курса проходят комплексную учебную практику, а сотрудники факультета ведут исследования (Антонов, 2001; Общегеографическая..., 2007). Несмотря на большие объёмы исследований, охватывающих самые разные направления географии и смежных наук, до последнего времени работы, посвящённые изучению фауны и населения позвоночных животных полигона, были в значительной степени отрывочными — сравнительно полно были изучены разве что амфибии и рептилии (Леонтьева, 2006). Базирующихся на фактических данных публикаций по птицам полигона единицы (Дроздов, 1977; и др.), не считая общих обзоров (например, Леонтьева, 2007). В последние годы приняты работы по восполнению этого пробела (Чумакова, Кадетов, 2025; и др.). В том числе они охватывают и одно из важнейших направлений исследований на полигоне — изучение влияния антропогенной трансформации на компоненты экосистем.

В свете этого особый интерес представляет необычный случай гнездования золотистой щурки (*Merops apiaster*) в долине р. Протвы, зафиксированный летом 2025 г.

Золотистая щурка — довольно редкий в Калужской обл. вид (Марголин, 2000), занесённый в региональную Красную книгу (2017). В границах полигона, по крайней мере, в последние 25 лет, встречи с ней нам не известны. Не отмечали её и на прилегающих территориях, по крайней мере, с 1975 г. (Пантелеев, 2010). Ближайшие известные места встреч расположены на самом западе Боровского р-на, в долине р. Ксёма, и на севере Жуковского р-на, заметно ниже по течению р. Протвы (Галченков, 2017; Куманин, 2005). Отметим, что в последнем случае указаны лишь встречи во время кочёвок.

Впервые щурки и их норы были замечены 26.06.2025 г. Н.Г. Кадетовым с группой студентов. В по-

следующие дни мы проводили наблюдения за ними. Всего максимально одновременно наблюдали 7 птиц.

Большой интерес представляет место, где были отмечены щурки. Норы расположены в стенке котлована, вырытого при попытке застройки поймы Протвы домиками для продажи/сдачи в аренду. Первые два подобных котлована, расположенные дальше от реки, появились ещё в начале 2024 г. В том году в их стенках в небольшом числе гнездились береговушки (*Riparia riparia*). Котлован, о котором идёт речь, появился осенью 2024 г. Важным его отличием стало близкое расположение к руслу реки. Высота уступа над водой — примерно 1,1–1,3 м. В апреле и мае на его берегах был отмечен большой улит (*Tringa nebularia*), также занесённый в Красную книгу Калужской области, и ряд других видов.

Всего с начала мая по июль на котловане и близ него отмечены 42 вида птиц (табл.). Характерно, что гнездившиеся многие годы на берегах Протвы перевозчики (*Actitis hypoleucos*) в 2025 г. перенесли гнездо на берег котлована. Аналогично береговые ласточки, многие годы массово гнездившиеся на обрывистом берегу примерно в километре выше по течению, также практически полностью покинули бывшее место и устроили новые норы в стенке котлована. Здесь же, вместе с береговушками, отмечена наибольшая на полигоне концентрация деревенских (*Hirundo rustica*) и городских ласточек (*Delichon urbica*).

Отметим, что водоём был освоен озёрными лягушками (*Pelophylax ridibundus*), что, вероятно, стало одной из причин регулярного его посещения серыми цаплями (*Ardea cinerea*).

Таким образом, подобный искусственно созданный комплекс биотопов для многих видов оказался куда более привлекательным, чем близкие, но, судя по всему, не идентичные природные аналоги. Цель создания подобного котлована неочевидна, ясна лишь его связь с попыткой застроить пойму Протвы домиками. Вероятно, это может быть попыткой застройщика отвести от домиков воды в половодье (в 2024 г. пойма была затоплена полностью, скрыв под водой нижние части уже



Описываемый фрагмент поймы до попытки застройки (2022 и 2023 гг.). Фото: Н.Г. Кадетов



Общий вид котлована.

Фото: Н.Г. Кадетов



Стенка котлована с норками.

Фото: Н.Г. Кадетов



Щурки в первый день регистрации.

Фото: Д.В. Жеребцов

Таблица. Виды, отмеченные близ котлована в пойме Протвы

№	Вид	КККо*	Характер пребывания	Встреча весной	Встреча летом
1	Большая белая цапля <i>Casmerodius albus</i>	3	кочёвки	+	—
2	Серая цапля <i>Ardea cinerea</i>	—	кормится	+	+
3	Кряква <i>Anas platyrhynchos</i>	—	возможное гнездование	+	+
4	Канюк <i>Buteo buteo</i>	—	кочёвки, возможно, кормится	+	+
5	Чеглок <i>Falco subbuteo</i>	Пр.	кочёвки, возможно, кормится	—	+
6	Большой улит <i>Tringa nebularia</i>	4	остановка на пролёте	+	—
7	Перевозчик <i>Actitis hypoleucos</i>	—	гнездится	+	+
8	Озёрная чайка <i>Larus ridibundus</i>	—	кочёвки, возможно, кормится	+	—
9	Речная крачка <i>Sterna hirundo</i>	3	кочёвки, возможно, кормится; гнездится неподалёку на реке	—	+
10	Вяхрь <i>Columba palumbus</i>	—	кочёвки, возможно, кормится	+	+
11	Чёрный стриж <i>Apus apus</i>	—	кочёвки, возможно, кормится	—	+
12	Золотистая щурка <i>Merops apiaster</i>	3	гнездится	—	+
13	Большой пёстрый дятел <i>Dendrocopos major</i>	—	кочёвки, возможно, кормится	+	+
14	Береговушка <i>Riparia riparia</i>	—	гнездится	—	+
15	Деревенская ласточка <i>Hirundo rustica</i>	—	кормится	+	+
16	Воронка <i>Delichon urbica</i>	—	кормится	+	+
17	Луговой конёк <i>Anthus pratensis</i>	—	гнездится	—	+
18	Белая трясогузка <i>Motacilla alba</i>	—	гнездится	+	+

ПТИЦЫ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

19	Сорока <i>Pica pica</i>	—	кормится	+	+
20	Галка <i>Corvus monedula</i>	—	кочёвки	+	—
21	Серая ворона <i>C. cornix</i>	—	кочёвки, возможно, кормится	+	—
22	Ворон <i>C. corax</i>	—	кочёвки, возможно, кормится	+	+
23	Садовая камышевка <i>Acrocephalus dumetorum</i>	—	гнездится	—	+
24	Болотная камышевка <i>Acrocephalus palustris</i>	—	гнездится	—	+
25	Пеночка-весничка <i>Phylloscopus trochilus</i>	—	гнездится	—	+
26	Серая мухоловка <i>Muscicapa striata</i>	—	возможно гнездование	—	+
27	Луговой чекан <i>Saxicola rubetra</i>	—	гнездится	—	+
28	Горихвостка-чернушка <i>Phoenicurus ochruros</i>	—	возможно гнездование	—	+
29	Зарянка <i>Erithacus rubecula</i>	—	гнездится	+	+
30	Соповей <i>Luscinia luscinia</i>	—	гнездится	+	+
31	Дрозд-рябинник <i>Turdus pilaris</i>	—	кормится	+	+
32	Буроголовая гаичка <i>Poecile montanus</i>	—	возможно гнездование	+	+
33	Лазоревка <i>Cyanistes caeruleus</i>	—	гнездится	+	+
34	Большая синица <i>Parus major</i>	—	гнездится	+	+
35	Поползень <i>Sitta europaea</i>	—	возможно гнездование	—	+
36	Пищуха <i>Certhia familiaris</i>	—	кормится	+	—
37	Зеленушка <i>Chloris chloris</i>	—	гнездится	—	+
38	Черноголовый щегол <i>Carduelis carduelis</i>	—	гнездится	+	+
39	Коноплянка <i>Linaria cannabina</i>	—	возможно гнездование	—	+
40	Снегирь <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	—	кормится	—	+
41	Обыкновенная овсянка <i>Emberiza citrinella</i>	—	возможно гнездование	+	+
42	Камышовая овсянка <i>Schoeniclus schoeniclus</i>	—	возможно гнездование	+	—

* Указана категория вида в Красной книге Калужской области или его включение в Приложение к ней (Пр.)

построенных домов). В любом случае судьба котлована неочевидна: в настоящее время идёт серия судебных разбирательств на предмет законности строительства в пойме Протвы.

Литература

- Антонов С.И., Несмелова Е.И., Низовцев В.А., Христофоров В.А. 2001. Сатинская станция — Учебно-научные географические станции вузов России. М.: Геогр. ф-т МГУ. С. 158–196.
- Галченков Ю.Д. 2017. Щурка золотистая. *Merops apiaster* Linnaeus, 1758. — Красная книга Калужской области. Том 2. Животный мир. Калуга: ООО «Ваш Дом». С. 312.
- Дроздов Н.Н. 1977. Население птиц Сатинского учебного полигона. — Результаты почвенных, геоботанических и зоогеографических исследований 1974–1976 гг. Материалы географического исследования Сатинского учебного полигона и смежных территорий в бассейне средней Протвы. М.: МГУ. С. 132–137.
- Куманин Г.М. 2005. Список птиц окрестностей Трубино Жуковского района Калужской области. — Птицы Москвы и Подмосковья — 2003. Сост. М.В. Калякин. М.: КМК. С. 209–216.

- Красная книга Калужской области. Том 2. Животный мир. Калуга: ООО «Ваш Дом», 2017. 406 с.
- Леонтьева О.А. 2006. Герпетофауна Сатинской станции. — Экосистемы широколиственно-хвойных лесов южного Подмосковья. М.: Геогр. ф-т МГУ. С. 123–134.
- Леонтьева О.А. 2007. Фауна позвоночных животных Сатинского полигона. — Общегеографическая практика в Подмосковье. М.: Геогр. ф-т МГУ. С. 214–228.
- Марголин В.А. 2000. Птицы Калужской области. Неворобьиные. Калуга: изд-во Н. Бочкаревой. 336 с.
- Общегеографическая практика в Подмосковье. М.: Геогр. ф-т МГУ, 2007. 367 с.
- Пантелеев П.А. 2010. Птицы юго-западных окраин Подмосковья. — Фауна и экология птиц Подмосковья. Труды программы «Птицы Москвы и Подмосковья», т. 6: 4–32.
- Чумакова Е.Н., Кадетов Н.Г. 2025. К изучению фауны наземных позвоночных Боровского района Калужской области. — Материалы IV Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Изучение и охрана биоразнообразия: опыт регионов России». Нижний Новгород (в печати)

Никита Геннадьевич Кадетов, Екатерина Николаевна Чумакова, Анастасия Александровна Кадетова, biogeonk@mail.ru

Необычно низкое гнездование большого пёстрого дятла в Москве

Николай Морозов

Как правило, большой пёстрый дятел (*Dendrocopos major*) выдалбливает гнездовые дупла на высоте по меньшей мере нескольких метров над землёй (Благосклонов, 1968; Handbook ..., 1985; Иванчев, 1998; Бутьев, Фридман, 2005; Рябицев, 2014 и др.). Однако

бывают и случаи очень низкого гнездования. Минимальные значения, приводимые в отечественной литературе по отдельным регионам (обычно без уточнения, до летка или как-то иначе производились измерения), составляют «от нескольких десятков сантиметров» или



Гнездовое дупло большого пёстрого дятла с летком на высоте 1,2 м от земли, лесопарк «Большой газон МГУ», Воробьёвы горы, 2.06.2025 г.



Фото: Н.С. Морозов

от 0,5 м до 2 м (Благосклонов, 1949, 1968; Новиков и др., 1963; Аверин, Ганя, 1970; Сотников, 2002; Рябицев, 2014 и др.). Для Подмоскovie указан диапазон высот от 2 до 16 м, большинство дупел располагалось на высоте от 3 до 7 м (Птушенко, Иноземцев, 1968). В сопредельных областях отмечали и более низкое гнездование, например, на высоте 1,5 м в Тверской обл. (Зиновьев и др., 2021), 1,5 и 1,7 м в Рязанской обл. (Иванчев, 1998). О дуплах на необычно малых высотах в г. Москве, кажется, упоминаний в литературе не было. Что касается собственного опыта, то из более чем восьми десятков найденных автором в черте города дупел с птенцами летки двух самых низких располагались на высотах 2,55 м (2003 г., нижняя часть склона Воробьёвых гор, ~ в 60 м от р. Москвы) и 2,7 м (2015 г., ГБС), оба — в стволах живой ольхи серой.

На Воробьёвых горах в лесопарковом массиве «Большой газон МГУ» площадью ~ 31 га, расположенном между ул. Косыгина, Университетским и Мичуринским проспектами и Университетской площадью (55°42'41,27" с.ш., 37°32'03,16" в.д.), 2.06.2025 г. было обнаружено гнездовое дупло большого пёстрого дятла, нижний край летка которого находился на высоте 1,2 м от земли (фото). В дупле кричали и выглядывали из летка оперившиеся птенцы незадолго до вылета, корм им приносили оба родителя. Дупло было выдолблено (судя по большому количеству «свежих» щепок под летком — в этом же году) в стволе живой яблони, как позже выяснилось, сорта с одиночными, довольно крупными плодами. Дерево несколько выше 13 м, диаметр ствола на уровне нижнего края летка составляет 29 см, на уровне дна дупла — 30 см, что немного превышает диапазон значений (21–25 см), наиболее характерных для гнездовых дупел большого пёстрого дятла

(Благосклонов, 1968). В 45 см ниже летка на противоположной от него стороне ствола находится плодовое тело трутовика. От земли ~ на 1,7 м ствол поднимается почти вертикально, но на этой высоте, а затем также и выше, искривляется. На высоте 3,5 м от него отходит давно засохший второй ствол. Леток дупла ориентирован на северо-восток и чуть вниз. По измерениям 9.06 (без вскрытия дупла) диаметр летка в высоту составлял 46,0–46,3 мм, в ширину 48,2 мм, толщина стенки дупла под нижним краем летка 3,6–4,0 см, внутренний диаметр дупла между нижним краем летка и противоположной стенкой 14,0–14,3 см, глубина дупла от внутреннего нижнего края летка до верхнего слоя на дне ~ 25 см.

Яблоня с дуплом находится хотя и в глубине лесопаркового массива, но не в малолюдном месте — посреди прямоугольного «треугольника», образуемого сильно утоптанной «дикой» тропой и двумя аллеями высоких лип, по которым проходят грунтовые дорожки. Вдоль дорожек на аллеях расставлены скамейки. Дупло находится в 33 и 19 м от аллей и в 7 м от «дикой» тропы, в сторону которой обращён его леток. По тропе изредка, а по аллеям регулярно ходят пешеходы, нередко с собаками, и ездят велосипедисты. Возле яблони травяной покров крайне изреженный и невысокий, образован главным образом недотрогой мелкоцветковой и чистяком весенним, однако немало низкого (гораздо ниже летка) подроста клёна остролистного и ясени пенсильванского.

Как и успешное привлечение большого пёстрого дятла с помощью дуплянок в лесополосы с молодым древостоем и в сосняки (Благосклонов, 1949; Семенов, 1956), некоторые случаи необычно низкого гнездования этого вида, вероятно, могут объясняться дефицитом подходящих деревьев предпочитаемых пород на

территории приступающей к размножению пары (Благосклонов, 1968). В нашем случае ближайшие осины (наиболее предпочитаемая порода, Иванчев, 1998), некоторые из которых, возможно, подошли бы по диаметру ствола, а также большие тополя находятся в 170–180 м от яблони с дуплом. В радиусе 70 м от неё из крупных деревьев преобладает липа мелколистная, немало клёнов остролистных, имеются лиственница сибирская, берёза повислая, ясень пенсильванский, конский каштан обыкновенный, слива пенсильванская и клён ясенелистный. За исключением нескольких засохших и засыхающих ясеней, все эти деревья живые, в неплохом состоянии и действительно выглядят мало подходящими для выдалбливания дупел, несмотря на габариты стволов. Однако в нижнем ярусе древостоя много старых яблонь (преимущественно живых, но есть и погибшие), некоторые — с достаточно толстыми основаниями стволами и с пустотами в них. Поодаль в этом лесу есть участки и с деревьями груши, ещё более внушительными по высоте и диаметрам стволов, чем яблони. Судя по старым картам (retromaps.ru), в этом месте на окраинах села Воробьёво во 2-й четверти XX века располагались фруктовые сады. Яблони либо (частично) сохранились, либо были заново посажены одновременно с аллеями лип, берёз и лиственниц в период (или вскоре после) строительства МГУ (см. фото: <https://bs.msu.ru/istoriya-sada-1950-2022-territoriya-na-leninskih-gorah/#gid=1&pid=10>). Со временем сады были заброшены, на протяжении последних десятилетий зарастали лесом, стали его частью. В этих условиях выбор дятлами нижней части ствола старой яблони — дерева с твёрдой древесиной, но, очевидно, повреждённой трутовиком — кажется хоть и необычным, но одним из наиболее приемлемых «решений». Однако трудно понять, почему пара решила гнездиться именно на этом участке леса. В те же сроки ещё два (вероятно, ближайшие) гнездовые дупла большого пёстрого дятла с птенцами находились достаточно далеко: ~ в 180 м к северо-северо-западу в этом же лесном массиве в сухом стволе живого клёна остролистного (леток на высоте

9,6 м) и в 640–650 м к юго-западу на краю дендрария Ботанического сада МГУ в стволе живого тополя белого (леток на высоте 4,7 м).

Автор благодарит О.В. Морозову и С.В. Купцова за определение и консультации по поводу видовой принадлежности ряда пород деревьев, а также А.П. Михайленко за указания на источники сведений о прошлом территории Воробьёвых гор.

Литература

- Аверин Ю.В., Ганя И.М. 1970. Птицы Молдавии (в двух томах). Т. 1. Кишинёв, 237 с.
- Благосклонов К.Н. 1949. Охрана и привлечение птиц полезных в сельском хозяйстве. М., 224 с.
- Благосклонов К.Н. 1968. Гнездовые деревья дятлов в различных типах леса. — Орнитология, 9: 95–102.
- Бутыев В.Т., Фридман В.С. 2005. Большой пестрый дятел *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758). — Птицы России и сопредельных регионов: Сивообразные, Козодообразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Удодообразные, Дятлообразные. Отв. ред. С.Г. Приклонский, В.П. Иванчев, В.А. Зубакин. М., с. 328–353.
- Зиновьев А.В., Кошелев Д.В., Виноградов А.А., Черкасов В.А. 2021. Птицы Тверской области и сопредельных территорий. Т. 1. Тверь, 591 с.
- Иванчев В.П. 1998. Гнездостроительная деятельность большого пёстрого дятла. — Современная орнитология 1998. М., с. 157–180.
- Новиков Г.А., Мальчевский А.С., Овчинникова Н.П., Иванова Н.С. 1963. Птицы «Леса на Ворскле» и его окрестностей. — Вопросы экологии и биоценологии. Вып. 8. Экология наземных позвоночных. Л., с. 9–118.
- Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М., 461 с.
- Рябицев В.К. 2014. Птицы Сибири. Справочник-определитель в двух томах. Т. 1. Москва-Екатеринбург, 438 с.
- Семенов С.М. 1956. Гнездование большого пестрого дятла в искусственных гнездовьях. — Пути и методы использования птиц в борьбе с вредными насекомыми. Ред. Л.П. Познанин. М., с. 99–100.
- Сотников В.Н. 2002. Птицы Кировской области и сопредельных территорий. Т. 1. Неворобыные. Часть 2. Киров, 528 с.
- Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of the Western Palearctic. Vol. 4. Terns to Woodpeckers. 1985. Ed.: S. Cramp. Oxford, 960 p.

Николай Сергеевич Морозов, morozovn33@gmail.com

О гнездовании теньковки в населённых пунктах Московской области

Виталий Конторщиков

Восточно-европейский подвид теньковки (*Phylloscopus collybita abietinus*) на большей части своего ареала обитает в разнообразных лесах. Выбор местообитаний определяется скорее структурой растительности, чем породным составом древостоев (Птушенко, 1954; Мальчевский, Пукинский, 1983; Cramp, 1992; Clement, 1995; Конторщиков, 2001; Шипилина, Преображенская, 2020). Необходимо сочетание относительно высоких деревьев (желательно более 5 м высотой) с хорошо развитым — хотя бы местами — кустарниковым и травянистым ярусами. На высоких деревьях самцы поют, в нижних ярусах птицы часто собирают корм, прячут гнёзда; здесь же укрываются слётки. Наиболее оптимальными местообитаниями являются светлые зрелые лиственные, смешанные и хвойные леса с мозаичной структурой растительности — с просветами, полянами, опушками.

В списке разнообразных типов местообитаний, характерных для этого подвида (так же как в основном и для других подвидов), населённые пункты не значатся, хотя упоминаются крупные парки, старые сады, кладбища, лесополосы (например, Cramp, 1992; Clement, 1995; Шипилина, Преображенская, 2020). Теньковка может гнездиться формально и в границах некоторых населённых пунктов, но выбирает там места, максимально приближенные к естественным.

В Московской обл. теньковка всегда считалась типичным лесным видом (Птушенко, Иноземцев, 1968). На севере области теньковка в 1990–2010-е гг., кроме разных типов лесов, также селилась в высоких пойменных ивняках и на некоторых дачных участках; в деревнях и посёлках мы её не отмечали (Конторщиков и др., 2014).

В крупном дачном массиве к северо-западу от с. Орудьево (Дмитровский р-н), где я проводил регу-




Фото 1. Орудьевские дачные участки во второй половине 1970-х гг. и в 2004 г. (ранняя весна). Фото: В.И. и В.В. Конторщиковы

лярные наблюдения за птицами с 1981 г., теньковка в 1981–1984 гг. в гнездовой период определённо не отсутствовала. Не известно точно, когда она здесь появилась, но уже с 1994 г. на моём дачном участке почти ежегодно с мая по июль пели по 1–2 самца. В 1998 г. и в последующие годы я отмечал теньковку, как нередкий или обычный вид для всего этого дачного массива.

Появление теньковки в Орудьевском дачном массиве я связываю с появлением подходящих стадий. Первые дачные отводы на заброшенных торфоразработках к северо-западу от Орудьева появились в 1960-е гг. (Русанов, 2019). К началу 1990-х гг. в переулках и вдоль канав деревья (в основном берёза, но также ива, ольха, осина, местами — ель и сосна) достигли значительной высоты, во многих местах разрослись разные кустарники — посаженные плодово-ягодные и декоративные, а также естественно выросшие ивы (фото 1). Таким образом, к 1990-м гг. на дачах сформировались подходящие для теньковки по структуре стадии, хотя «лесом» этот огромный дачный массив назвать никак нельзя. В частности, мой участок находился в 0,7 км от ближайшего леса.

В д. Дмитровка в Талдомском р-не наблюдения за птицами проводят с 2001 г. В настоящее время здесь много высоких деревьев, в т.ч. есть отдельные ели, местами в палисадниках, вдоль заборов и на заброшенных участках развиты заросли разных кустов. До 2018 г. я не отмечал в деревне в гнездовой период поющих теньковок, но она была нередка здесь на пролёте и кочёвках. В 2018 г. самец теньковки пел в деревне 16–20.06, в 2019 г. встреч не было, в 2020 г. поющий самец отмечен 9.06, в 2021 г. — с 9 по 23.06, в 2022 г. — 4–9.07, в 2023 г. — вероятно, один и тот же самец регулярно пел в деревне с 23.04 по 18.07, в 2024 г. — скорее всего, один и тот же самец пел по меньшей мере с 1.05 (возможно — с 14.04) по 30.05, видели пару, слышали тревожные сигналы. В 2025 г. самец постоянно пел с 4.05 (возможно — уже с 20.04) по 15.07, а 18.05 в деревне отмечены 2 поющие птицы.

Таким образом, теньковка в деревне стала регулярно петь и, вероятно, гнездиться в конце 2010-х гг. или в начале 2020-х гг. Это можно было бы считать особым частным явлением, но примерно с 2020 г. я стал регулярно встречать в гнездовой период поющих теньковок и во многих других населённых пунктах на севере Подмоскovie. Возможно, отдельные такие случаи име-

ли место и раньше, но происходили настолько редко, что не привлекли моего внимания.

В 2020 г. 8.06 поющие самцы отмечены в г. Талдоме в хорошо озеленённых кварталах с деревянными домами и садами — 3 поющих самца на 3 км маршрута, 9.06 самец пел в д. Серебрянниково в высоких ивах по р. Куйменке. В 2021 г. 10–19.06 я слышал поющих теньковок в дд. Ольсово и Ольявидово, в с. Рогачево и пос. Вербилки. В 2022 г. 1–17.06 поющие самцы по 1–2 ос. отмечены по меньшей мере в 8 населённых пунктах (в т.ч. в пос. Запрудня, дд. Волково, Федотово, Растовцы, Говейново, Паньково), а также на дачах у д. Бельское. В 2023 г. 7–15.06 поющие теньковки отмечены как минимум в 4-х населённых пунктах, в т.ч. в центре крупного села Константиново и в г. Талдоме. В 2024 г. я слышал поющих самцов 17.05–17.06 тоже в 4-х населённых пунктах (в т.ч. в д. Карпово и с. Подъячево), в 2025 г. — в 2-х (в т.ч. в с. Великий Двор).

Таким образом, по моим наблюдениям на севере Московской обл. теньковка стала селиться на дачных участках с 1990-х гг., в сельских поселениях — с конца 2010-х гг.

В Можайском р-не я провожу регулярные наблюдения за птицами с начала 1990-х гг., в том числе — на северо-западном краю д. Копытово. Ближайшая опушка леса находится в 400 м от этого края деревни. В этой части деревни в настоящее время в переулке, вдоль заборов и местами на участках произрастают высокие деревья — берёзы, ели, несколько сосен, дубов, хорошо развиты разнообразные кустарники. Но в основном эта растительность была посажена (за исключением берёз) в 1990-е гг. после того, как эти участки были куплены жителями Москвы под дачи и начали застраиваться и обихаживаться (фото 2). Ранее здесь, кроме отдельных домов, были картофельные поля, колхозная шаха (сенохранилище), пустыри, луга, футбольное поле.

Впервые в деревне поющую теньковку я отметил в 2009 г. 15–17.05, а 27–29.06 встретил в переулке выводок, при котором держался поющий самец, но, возможно, птицы гнездились где-то за пределами деревни. В 2010–2017 гг. я слышал поющих теньковок в деревне или на её краю лишь эпизодически в июле, не считая периода пролёта в апреле и до начала мая.

В 2018 г. 12.05 на моём участке в деревне самка строила гнездо в траве у основания дерева и кустов, неподалёку пел самец. Судьба этого гнезда осталась



Фото 2. Деревенский участок в Копытово в 1994 и 2025 гг. На второй фотографии слева от дома под соснами видны заросли казацкого можжевельника, где в 2023–2025 гг. гнездилась теньковка. Фото: В.В. Конторщикова

неизвестной, а самец пел по меньшей мере до 3.06. В 2019–2025 гг. в месте моих наблюдений в деревне уже ежегодно постоянно пели по 1–2 самца, а на моём участке регулярно гнездилась самка.

В 2019 г. территориальный самец пел в деревне по меньшей мере со 2.05 по 12.07, причём 12.07 в деревне я впервые услышал второго поющего самца. Найдены 2 гнезда — на деревенском участке у прудика в 15 м друг от друга. Одно гнездо располагалось в зарослях спиреи (*Spiraea*) на высоте около 20 см над землёй и держалось на наклонённых стеблях спиреи. В этом гнезде 27.05 было 6 насиженных яиц, 12.06 — крупные птенцы, 30.06 у пруда держался выводок лётных птенцов, которых ещё кормили взрослые. Второе гнездо найдено на другой стороне пруда на кусте жимолости голубой (*Lonicera caerulea*) на высоте около 1,5 м; оно было закреплено также на наклонённых ветках куста (фото 3). В этом гнезде 11.06 было 3 яйца, 12.06 — 4 яйца, 16.06 — 5 яиц, 30.06 — маленькие птенцы; 7.07 птенцов, по-видимому, ещё кормили, а 9.07 гнездо было пустое, птенцы, предположительно, вылетели 8 или 9.07. Таким образом, 12.06 в двух соседних гнёздах теньковки в одном были крупные птенцы, в другом — незавершённая кладка. Поблизости я слышал всегда только одного поющего самца. Возможно, у него были две самки, или, если это была одна пара — самка начала строительство гнезда и откладку яиц ещё при птенцах в первом гнезде.

В 2020 г. самец пел на том же участке, что и в прошлом году, с 28.04 по 22.06, 8.05 самка собирала у пруда строительный материал, 11.05 я наблюдал спаривание. Позже, до 16.07, я видел в этом месте иногда по 1–2 ос., но пения не отмечал.

В 2021 и 2022 гг. пение самца слышали в деревне примерно на той же территории с 5.05 по 18.07 и с 24.04 по 15.07, соответственно.

В 2023 г. гнездо найдено поблизости от упомянутого пруда в казацком можжевельнике (*Juniperus sabina*) на высоте около 0,6 м; леток был направлен примерно на северо-восток; 8 и 9.05 самка строила гнездо (оно выглядело почти готовым), 27.05 в гнезде было 6 яиц, самка насиживала (фото 4). Самец пел в районе гнезда

по меньшей мере с 8.05 по 12.07, причём 9.05 вдали был слышен ещё один самец.

В 2024 г. гнездо было построено в том же кусте казацкого можжевельника в 0,3 м над землёй, леток был направлен на северо-восток; 3.07 в гнезде были 3 яйца. Пение самца поблизости отмечено с 12.05 по 5.07, причём 2–5.07 я иногда слышал поблизости пение второго самца.

В 2025 г. с 19.04 по 12.07 на этом краю деревни регулярно пели 2 самца. Найдены два гнезда — всё в том же кусте казацкого можжевельника. Первое гнездо располагалось на высоте около 0,7 м, леток был направлен на юго-запад; 27.04 самка строила гнездо, 10.05 в гнезде были 5 яиц, 4.07 гнездо было пустым, а в 2 м от него находилось второе гнездо на высоте около 0,4 м (леток был направлен примерно на северо-восток или восток). В этом гнезде 4.07 были 2 яйца, 11 и 12.07 — 5 яиц, 21.07 — недавно вылупившиеся птенцы, 29.07 — уже крупные птенцы, но 2.08 гнездо оказалось разорённым хищником, по-видимому — кошкой. Я предполагаю, что это были две последовательные кладки одной пары.

Все найденные в 2019–2025 гг. у прудика гнёзда располагались в месте, где люди регулярно ходили, косили траву, обрезали сучья, строили, недалеко нередко жгли костёр.

В других местах Можайского р-на я стал регулярно отмечать поющих в гнездовой период в населённых пунктах теньковок с 2017 г. Такие случаи, возможно, случались и раньше, но были настолько редки, что не привлекали моего внимания.

В 2017 г. теньковка 20.05 пела в с. Борисово. В 2020 г. с 9.05 по 4.06 я слышал поющих самцов в дд. Приданцево, Мокрое, Цветки, а также ещё в 2–3 деревнях. В 2021 г. поющие теньковки отмечены с 6.05 по 9.07 в дд. Люльки, Ивакино и Кусково, в 2022 г. — с 7 по 22.05 в д. Ельня и с. Тропарёво (в последнем месте, вероятно, пели 2 самца), в 2023 г. — с 6.05 по 3.07 — в 6–7 населённых пунктах, в 2024 г. с 10.05 по 6.07 — по меньшей мере в 2–3, в 2025 г. с 8.05 по 28.06 — в 3–5 (в т.ч. в с. Семёновское). Встречи поющих самцов в одном и том же населённом пункте в разные годы, а также в д. Копытово, в данный перечень не входят. В большинстве



Фото 3. Гнездо теньковки в д. Копытово в жимолости голубой (9.07.2019 г.).
Фото: В.В. Конторщиков



Фото 4. Теньковка в гнезде в казацком можжевельнике (27.05.2023 г.).
Фото: С.В. Конторщиков

случаев теньковки пели отчётливо именно в деревьях на высоких деревьях, где леса поблизости не было.

Таким образом, в Можайском р-не по моим наблюдениям теньковка стала регулярно встречаться в деревьях и сёлах в основном с конца 2010-х гг. (с 2017–2018 гг.), т.е. примерно в тот же период, что и на севере Московской обл.

На мой взгляд, массовое проникновение теньковки в Московской обл. в населённые пункты в 2010-е гг. связано с тем, что структура растительности в них стала отвечать всем требованиям этого вида. При этом, вероятно, потребовалось какое-то время, чтобы теньковка благодаря обучению, подражанию и запечатлению начала гнездиться в них в заметном числе.

В 1960–1990-е гг. в Московской обл. происходили массовые отодвиги земель под дачи (см. например Русанов, 2019) вне уже существующих населённых пунктов. К настоящему времени многие дачные участки в значительной мере заросли высокими деревьями и разнообразными кустарниками, причём дачники часто сажают хвойные породы, благоприятные для гнездования теньковки.

С 1990-х гг. в связи с кризисом сельского хозяйства в Подмоскovie дачами для жителей Москвы и других городов области стали также многие деревенские участки в постоянных сельских поселениях. Например, в д. Дмитровка в 2002–2010 гг. официально местное население насчитывало 1–6 человек ([ru.wikipedia.org/wiki/Дмитровка_\(Талдомский_городской_округ\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Дмитровка_(Талдомский_городской_округ))), тогда как дачниками в этот период здесь сезонно проживали примерно 20–40 человек. В д. Копытово в 2010 г. проживали 17 человек местного населения ([ru.wikipedia.org/wiki/Копытово_\(Можайский_район\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Копытово_(Можайский_район))) и примерно 50–100 дачников.

Дачные участки в сельских населённых пунктах тоже обычно зарастают или обрастают по краю высо-

кими деревьями, местами образуются густые заросли декоративных и ягодных кустарников. Дачники обычно не склонны на своих участках всерьёз заниматься сельским хозяйством и огородничеством, держать скот и домашнюю птицу. Исчезают картофельные поля и обширные огороды, столь характерные раньше для деревень и посёлков и требующие при этом много света и вырубки древесно-кустарниковой растительности. Расширяется площадь заросших травой участков, в т.ч. высокотравья, в котором теньковки любят кормиться.

Кроме того, в деревьях и посёлках Подмоскovie в связи с кризисом сельского хозяйства и безработицей в 1990–2000-е гг. появилось немало заброшенных участков, которые заросли высокой травой и древесно-кустарниковой растительностью. Вероятно, это тоже имеет важное значение.

Таким образом, к концу 2010-х гг. населённые пункты Московской обл. стали, по-видимому, довольно типичной гнездовой стацией теньковки. Структура растительности в них за последние несколько десятилетий существенно изменилась и стала благоприятной для гнездования этого вида. Это связано с распространением дачных участков как вне постоянных сельских населённых пунктов, так и в их пределах.

Весьма вероятно, что этому способствовал также рост численности этого вида в Московском регионе и вообще в Европе в последние десятилетия (Морковин, Волцит, 2025; PECBMS). Обычно у птиц это сопровождается расширением спектра занимаемых местообитаний вида из-за выселения части птиц в субоптимальные типы местообитаний.

По моим наблюдениям, на севере Московской обл. и в Можайском р-не в последние 20 лет в сельских населённых пунктах стали чаще гнездиться также снегири (*Pyrrhula pyrrhula*), что может быть связано как с регулярной подкормкой в холодное время года (Волцит,

2006; Касаткина, 2006; Конторщиков, 2023), так и с появлением весьма характерных для дачных участков высоких хвойных деревьев, на которых любят гнездиться эти птицы.

Проникновению вяхиря (*Columba palumbus*) в населённые пункты Московской обл. с конца 2010-х гг., на мой взгляд, тоже способствовали отмеченные выше изменения в структуре растительности в населённых пунктах (см. статью на с. 18).

Я очень благодарен Н.В. Конторщиковой, которая сделала много важных наблюдений за теньковкой в д. Копытово.

Литература

- Волцит П.М. 2006. Индивидуальное мечение птиц на кормушке. — Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 4: 35–38.
- Касаткина Ю.Н. 2006. Снова птицы на кормушке. — Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья, 4: 43–45.
- Конторщиков В.В. 2001. Взаимосвязь кормового поведения, морфологии и выбора местообитаний у пеночек теньковки, веснички и трещотки. — Орнитология, 29: 112–124.
- Конторщиков В.В. 2023. Сроки и направления перемещений, величина групп и некоторые особенности кормового поведения у мигрирующих через Московскую область снегирей *Pyrrhula pyrrhula* по данным визуальных наблюдений в двух точках. — Русский орнитологический журнал, 32 (2304): 2085–2111.
- Конторщиков В.В., Гринченко О.С., Свиридова Т.В., Волков С.В., Шариков А.В., Хромов А.А., Зубакин В.А., Кольцов Д.Б., Коновалова Т.В., Смирнова Е.В., Иванов М.Н., Макаров А.В., Северюгин А.В. 2014. Птицы Журавлиной родины и окрестностей: распространение и численность. — Вестник Журавлиной родины. Выпуск 2. М., с. 5–170.
- Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. 1983. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. Л., Т. 2. 504 с.
- Морковин А.А., Волцит О.В. 2025. Мониторинг численности птиц в Москве и Московской области [электронный ресурс]. <http://birdsmoscow.net.ru/monitoring-moscow>
- Птушенко Е.С. 1954. Теньковка, или пеночка-кузнечик, *Phylloscopus collybitus* Vieill. — Птицы Советского Союза. М., Т. 6, с. 153–162.
- Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М., 461 с.
- Русанов А.В. 2019. «Дачные города» северного Подмосковья: роль сезонного населения в трансформации сельской местности. — Городские исследования и практики, 4 (2): 73–85.
- Шипилина Д.А., Преображенская Е.С. 2020. Пеночка-теньковка *Phylloscopus collybita*. — Атлас гнездящихся птиц Европейской части России. Ред.-сост. М.В. Калякин, О.В. Волцит. М., с. 659–662.
- Clement P. 1995. The Chiffchaff. Hamlyn. 126 p.
- Cramp S. (ed). 1992. The Birds of the Western Palearctic. Oxford University Press, Oxford. Vol. 6. 728 p.
- PECBMS (PanEuropean Common Bird Monitoring Scheme). Species trends, по: pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/pecbms.info, 2025.
- Конторщиков Виталий Владимирович, Государственный Дарвиновский музей, vitkont@yandex.ru

Гнездование азиатского черноголового чекана в Лыткарино

Василий Калиниченко, Даниил Давыдов

Азиатский черноголовый чекан (*Saxicola maurus*), характерный для Западной Сибири, с конца XX в. активно расселяется на запад по европейской части России вплоть до Московской обл. (Сарычев, Редькин, 2020). Впервые выводок азиатского черноголового чекана в Московской обл. встретил С.Б. Симонов 4.06.2023 г. на западной окраине г. Озёры (ru-birds.ru). До этого были известны только встречи отдельных птиц в Москве — 2.07.2014 г. в Сходненском ковше (К.М. Лапин) и 28.05.2020 г. на Щукинском полуострове (Л.Н. Губина, А.С. Власенко). В 2024 г. вид был зарегистрирован в двух местах — пение самца 13.04 слышал К.В. Ивановский в пойме р. Свинки (Серебряно-Прудский м.о.), а В.А. Зубакин (2024) наблюдал беспокоящуюся пару в окр. д. Щельпино (г.о. Воскресенск) с 17.05; там же 16.07 рядом с самцом он обнаружил молодую птицу, т.е. гнездование можно считать доказанным.

В 2025 г. также обнаружены две точки вероятного или доказанного гнездования вида. В окр. д. Песочное Серебряно-Прудского м.о. с 31.05 по 5.07 наблюдали беспокоящуюся пару (М.В. Дёров, Л.Н. Губина, В.А. Невцветаев, М.А. Невский), но гнездование доказано не было. Вторая точка — окр. Лыткарино, берег р. Москвы, где авторам удалось подтвердить гнездование вида. Опишем обстоятельства находки.

В конце мая фотограф Д. Денисенко обнаружил пару черноголовых чеканов в пойме р. Москвы около Лыткарино. Видовая принадлежность птиц на тот момент оставалась неясной, и В. Калиниченко решил выяснить её. Он приехал на место встречи 9.06. Биотоп

представлял собой застраиваемый луг, окружённый берёзами и кустарниками. Сразу же внимание наблюдателя привлекли тревожные позывки, напоминавшие позывки европейского черноголового чекана (*S. rubicola*).

Птиц было две — самец в ярком оперении и самка (фото). Чаще всего на виду был самец. Все время, пока наблюдатель находился рядом, он издавал тревожные позывки. Местом основной присады самец выбрал бетонный столбик у дороги. На него птица возвращалась каждые 5–10 мин., держась в радиусе не более 15 м от столбика, изредка присаживаясь также на берёзы и сухие стебли травы. Самка за время наблюдений появлялась всего 3 раза, вела себя тихо и сидела молча. Надо отметить непугливость птиц — в некоторые моменты съёмку удавалось вести с расстояния менее 6 м.

Полученные фото позволили определить птиц как азиатских черноголовых чеканов. Это подтверждают следующие признаки: чёрные подкрылья, светлое брюхо, ограниченное и небольшое рыжее пятно у самца; у самки — белая полоса на крыле и в общем более светлое и менее пёстрое оперение (фото1–3).

Позднее, 21.06, команда наблюдателей (Д.В. Давыдов, А.В. Носенко, В.А. Носенко, А.В. Голубева и В.А. Моисейкин) обнаружила здесь 4 слётков (фото 4), которых докармливали обе взрослые птицы.

Таким образом, начиная с 2023 г. в Московской обл. обнаружены 4 места вероятного и доказанного гнездования азиатского черноголового чекана, и число их наверняка будет увеличиваться.



Фото 1 и 2. Самец азиатского черноголового чекана, 9.06, окрестности Лыткарино.

Фото: В.Д. Калиниченко




Фото 3. Самка азиатского черноголового чекана, 9.06, окрестности Лыткарино.

Фото: В.Д. Калиниченко



Фото 4. Слёток азиатского черноголового чекана, 21.06, окрестности Лыткарино.

Фото: Д.В. Давыдов

Литература

Зубакин В.А. 2024. Вероятное гнездование черноголового чекана и просянки в окрестностях Виноградовской поймы (Московская область, Воскресенский ГО) в 2024 г. — Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России. Мат-лы VII совещ. «Распростра-

нение и экология редких видов птиц Нечернозёмного центра России», посвящённого памяти В.Т. Бутьева (Москва, 30 ноября 2024 г.). С. 100–101.

Сарычев В.С., Редькин Я.А. 2020. Черноголовый чекан. — Атлас гнездящихся птиц европейской части России. С. 691–693.

Василий Дмитриевич Калиниченко, vasily290306@gmail.com
Даниил Вадимович Давыдов, cygnusolor878@gmail.com

Неудачная попытка гнездования ополовников в парке «Яуза»

Владимир Авдеев

Ополовники (*Aegithalos caudatus*) могут приступать к постройке гнёзд уже в конце марта. Самое раннее начало гнездования согласно базе данных ru-birds. ru отмечено 25.03.2020 г. в Куркино (Е.В. Швыдун). В 2021 г. строительство гнезда наблюдали в ГБС РАН 28.03 (Литвинова, 2021). В 2025 г. март оказался значительно теплее нормы. В парке «Яуза» 1.03 привлекла внимание пара ополовников, которая подлетала довольно часто к развилке раздвоенного ствола остролистного клёна в пяти метрах от берега р. Чермянки у её впадения в р. Яузу (фото 1). Ивняк и ольшаник, про-

израстающие в этом месте, могут затопливаться весной в половодье. Самка явно начала строительство гнезда. В сопровождении самца она приносила паутинки и кусочки лишайника и прикрепляла их к стволу (фото 2). Строительство продвигалось медленно: 9.03 выпал снег, и развилка выглядела неизменной, 16.03 постройка продвинулась, а 30.03 гнездо было практически построено и внешне отделано под ствол дерева. В это время самка приносила перья и занималась выстилкой лотка (фото 3), часть неподходящих перьев она, наоборот, уносила. К 3.04 гнездо выглядело полностью гото-



Фото 1.



Фото 3.



Фото 2.



Фото 4.

вым с оформленным входом, который был направлен в сторону одного из стволов, поэтому его совсем не было видно. Птица быстро подлетала к гнезду и забиралась в него, совершенно пропадая из вида. Вылетала она из гнезда также быстро и чаще в обратную сторону от наблюдателя. Гнездо находилось рядом с дорогой, по которой в выходные ходили люди, но никто не замечал гнездо и птиц. Лишь один раз подошёл пожилой мужчина и сказал, что видел рядом «белую пеночку». Я пояснил ему, что это длиннохвостая синица, на что он ответил: «О, я встретил орнитолога».

Соседи у этой пары ополовников подобрались не простые, все опасные. Появившуюся сойку (*Garrulus glandarius*), возможно, местную, птицы активно окрикивали. На другом берегу р. Чермянки в 30 м в густом ивняке построили новое гнездо сороки (*Pica pica*). Держались они скрытно, лишь изредка было слышно их стрекотание. На другом высоком берегу р. Яузы на тополе строила гнездо серая ворона (*Corvus cornix*). Наверняка рядом были и белки, зимой в 200 м отсюда на кормушках держались 4 зверька.

В ночь на 6.04 начался снегопад, температура упала до -2°C . Утром гнездо было покрыто снегом (фото 4). Снег шёл до 11.04, 15.04 он растаял. Самка подлетала и залезала в гнездо, а 22.04 гнездо оказалось сброшенным на землю, в нём не было ни яиц, ни скорлупы. Осталось неизвестным, съели кладку или её вовсе не было.

Итого затрачены 53 дня, почти два месяца, а итог получился неутешительный! Всё-таки гнездо было за-

метно, и его разорение можно было предположить с самого начала с высокой вероятностью, что в итоге и произошло.

Ещё немного о встречах гнездящихся ополовников в 2025 г. В ГБС РАН в пойме р. Лихоборки 30.03 встречены две пары ополовников, одна из них собирала строительный материал для гнезда. При обследовании квадрата 37УСВЗ_6 (западнее Звенигорода) 9.06 в разных местах были встречены два хорошо летающих выводка ополовников. Можно также отметить, что в 2016 г. в пойме Яузы в Леоновской роще уже была находка гнезда ополовника (Авдеев и др., 2016), успешный вылет птенцов из которого произошёл 21.06.

Литература

- Авдеев В.П., Даниюшин В.Г., Соколов Ю.П. 2016. Гнездование ополовника в пойме р. Яузы в Москве. — *Московка. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья*, 24: 44.
- Литвинова Е.М. 2021. Раннее гнездование ополовников в ГБС РАН. — *Московка. Новости программы Птицы Москвы и Подмосковья*, 34: 52.

Владимир Павлович Авдеев, avdvov@mail.ru



Московка с кормом у дуплянки, 16.05.2025 г. Фото: М.А. Аргир



Птенцы москвки, 16.05.2025 г. Фото: М.А. Аргир

О гнездовании москвки на ООПТ «Суханово» в 2025 году

Вячеслав Артамонов, Мария Аргир

ООПТ «Суханово», учреждённая в 2021 г. в окрестностях одноимённой усадьбы князей Волконских, богата различными природными биотопами. В восточной её части, примыкающей к пос. Федюково, на высоком левом берегу р. Гвоздянки находится высокобонитетный сосняк, граничащий с дубравами и открытыми полянами с богатым луговым разнотравьем. Средний возраст леса составляет 110 лет (в 2021 г. проводили дендрохронологическую экспертизу отдельных экземпляров). Стоит также отметить богатое видовое разнообразие и обилие насекомых, близость реки.

В марте 2022 г. здесь были повешены дуплянки — малые синичники, которые впоследствии не раз занимали птицы. При осмотре 15.05.2025 г. в одной из дуплянок найдено гнездо москвки (*Periparus ater*). Осмотр

гнезда, фото- и видеосъёмка проведены 16.05.2025 г. На фотографии видны 9 птенцов среднего возраста, которых кормили оба родителя. Дуплянка опустела к 27.05.2025 г., второго выводка москвоков в ней не было.

Выбранная москвоками для гнездования дуплянка располагалась на высоте 2,7 м на сосне (высота 15 м, диаметр ствола 40–50 см). Дуплянка изготовлена из картонной трубы (внутренний диаметр 10 см, диаметр летка 30 мм). В 2022 г. в ней гнездились лазоревки (*Cyanistes caeruleus*). Принято считать, что московка предпочитает спелые ельники. В данном случае гнездо располагалось в разреженном сосняке с дубом, что указывает на большую пластичность этого вида синиц.

Вячеслав Борисович Артамонов, slava_butovo@mail.ru
Мария Александровна Аргир, marusinkust@yandex.ru

Очевидное невероятное: воробьи и скворец

Светлана Барабанщикова

Казалось бы, чем могут удивить полевые воробьи (*Passer montanus*) и обыкновенные скворцы (*Sturnus vulgaris*)? Эти птицы давно стали частью городского и сельского пейзажей. Но однажды я стала свидетельницей сцены, которую иначе как удивительной не назовёшь. Всё происходило в с. Константиново Сергиево-Посадского района.

Издали мне показалось, что птица размером примерно со скворца кормит своих птенцов. Однако, присмотревшись, я поняла, что всё наоборот: воробей подносил корм как своим птенцам, так и... скворцу! Причём сцена повторялась: воробей снова и снова кормил молодого скворца, словно он был частью их птичьей семьи.

Это странное поведение заинтересовало меня, и я обратилась за разъяснением к орнитологам. Они

предложили возможные объяснения такого межвидового взаимодействия.

Гипотеза первая: приёмный скворец

Возможно, воробьи заняли заброшенный скворечник. Предыдущие обитатели — пара скворцов — могли погибнуть или быть изгнаны. А в гнезде осталось яйцо. Воробьи, обнаружив его, приняли на себя роль приёмных родителей и вырастили скворчонка как своего собственного. Инстинкт заботы оказался сильнее видовых различий.

Гипотеза вторая: обострённый инстинкт выкармливания

У некоторых птиц инстинкт кормления птенцов настолько выражен, что они готовы ухаживать и за молодыми особями других видов. Возможно, воробей, которого я наблюдала, был именно таким «заботливым».



А молодой скворец, приняв внимание за родительскую заботу, остался рядом с воробьями, несмотря на видовые отличия.

Вероятны и другие гипотезы, но как было на самом деле, мы уже не узнаем. Я рада, что смогла стать

свидетелем и задокументировать этот интересный случай межвидового взаимодействия. Такие эпизоды напоминают нам, насколько сложен и удивителен мир птиц, даже самых привычных и «простых» на первый взгляд.

Светлана Владимировна Барабанщикова, svetab@ctb.ru



Рецензии

В.А. Зубакин, Е.А. Коблик, А.А. Мосалов. 2025. Чайковые птицы России и сопредельных регионов. Полевой определитель-справочник. Союз охраны птиц России. Москва, 192 с.

Для многих наблюдателей чайки, крачки и поморники — головная боль. Особенно определение крупных чаек (т.н. «больших белоголовых чаек», или ББЧ) представляет определённые трудности в связи с очень похожими нарядами молодых птиц некоторых видов. Но и с молодыми крачками (с речными и полярными, например, или с «болотными» крачками) и поморниками не всё просто.

Как правило, обычные определители уделяют немного места этим сложностям. Поэтому особенно радует, что авторы решились взяться за нелёгкий труд и написать первый русскоязычный определитель-справочник, посвящённый этой группе.

Формат книги вполне соответствует полевым определителям, хотя, наверное, не очень практично брать её с собой наряду с другими определителями, тем более потому, что нет необходимости иметь при себе подробную информацию про всех чайковых птиц России и сопредельных регионов (т.е. бывшего СССР). Но как справочник на рабочем столе книга вполне подходит.

Книга разделена на две части. Первая часть посвящена определению и содержит цветные иллюстрации Е.А. Коблика, перечисление ключевых признаков и краткое описание голоса, образа жизни и статуса вида в регионе. Во второй части читатель находит видовые очерки с подробной информацией о распространении, размножении, питании и систематике видов. Книгу завершают карты ареалов и список использованной литературы.

Книга прекрасно издана и подходит для первого знакомства с этой группой. В целом текст и рисунки хорошо описывают главные отличительные признаки каждого вида. Однако неизбежно, что при таком формате невозможно детально описать все нюансы опре-

деления сложных видов, для этого просто нет места. Частично это компенсируется прекрасными иллюстрациями, которые дополняют текст.

К сожалению, этого всё же недостаточно для того, чтобы понять, как надёжно отличать молодого среднего поморника от короткохвостого. То же самое можно сказать, например, про молодых (да и взрослых) хохотуний и серебристых чаек. Констатация, что долгий крик — единственный надёжный признак хохотунии, спорная и создаёт впечатление у начинающего наблюдателя, что может и не стоит даже пытаться определять этих сложных ББЧ.

В то же время понятно, что по-настоящему разобраться с этим можно только с помощью многочисленных фотографий; короткого текста и нескольких рисунков для каждого вида тут явно недостаточно. К счастью, такие справочники уже есть, и авторы данного определителя на них ссылаются и особо рекомендуют читателям ознакомиться с ними. Также, очень правильно, авторы предупреждают, что для верного определения желательно увидеть как можно большее количество признаков, и что «надо быть готовым к тому, что вид чайки удастся определить только предположительно». Очень дельный совет, особенно в европейской части России, где происходит широкая гибридизация.

Авторы постарались «не перегружать видовые очерки специальными морфологическими терминами», поскольку книга предназначена, в том числе, для орнитологов-любителей. Хотя этот подход понятен, к сожалению, это привело к тому, что почти нигде не говорится ничего про линьку, понимание которой очень важно в процессе определения, особенно крупных чаек. Но и в этом вопросе есть другие, более подробные определители в помощь заинтригованному читателю.

Хирт Гроот Куркам, geert.grootkoerkamp@gmail.com



Интересные встречи

апрель – сентябрь 2025 г.

Хирт Гроот Куркамп (сост.)

Этот обзор суммирует самые интересные наблюдения за период с апреля по сентябрь 2025 г. Данные для настоящего обзора получены из разных источников. Список не полный. Автор не имел возможности проверить достоверность всех сообщений.

Для точек в Московской обл. указано название округа, для некоторых наиболее посещаемых точек (Виноградовской поймы, Лотошинского и Бисеровского рыбхозов, Дединовской поймы, Нарских прудов и др.) название округа приведено только один раз, затем опущено. Названия округов опущены также для одноимённых объектов.

Сокращения: М — Москва, НАО — Новомосковский административный округ, ТАО — Троицкий административный округ, ГО — городской округ, ГБС — Главный ботанический сад РАН, м.о. — муниципальный округ.

Чтобы уменьшить объём текста, названия городских округов указаны сокращённо: БАЛ — Балашиха, БОГ — Богородский, БРО — Бронницы, ВОС — Воскресенск, ДОЛ — Долгопрудный, ДОМ — Домодедово, ДУБ — Дубна, КАШ — Кашира, КЛИ — Клин, КОЛ — Коломна, КОР — Королёв, КРА — Красногорск, ЛЕН — Ленинский, ЛОБ — Лобня, ЛОС — Лосино-Петровский, ЛЮБ — Люберцы, МЫТ — Мытищи, НАР — Наро-Фоминский, ОДИ — Одинцовский, ОРЕ — Орехово-Зуевский, ПАВ — Павлово-Посадский, ПОД — Подольск, ПУШ — Пушкинский, СЕРПОС — Сергиево-Посадский, СЕРПУХ — Серпухов, СОЛ — Солнечногорск, СТУ — Ступино, ТАЛ — Талдом, ФРЯ — Фрязино, ХИМ — Химки, ЧЕР — Черноголовка, ВОЛ — Волоколамский, ДМИ — Дмитровский, ЕГО — Егорьевск, ЗАР — Зарайск, ИСТ — Истра, ЛОТ — Лотошино, ЛУХ — Луховицы, МОЖ — Можайский, РАМ — Раменский, РУЗ — Рузский, СЕРПРУД — Серебряные Пруды, ЧЕХ — Чехов, ШАТ — Шатура, ШАХ — Шаховская, ЩЁЛ — Щёлково. Фамилия наблюдателя указана, если она известна. К сожалению, это не всегда возможно, когда наблюдатель использует псевдоним.

При ссылке на конкретные сообщения, опубликованные в данном разделе, просим указывать ФИО наблюдателя (-ей).

Большая просьба всем, кто вносит свои данные в электронные базы данных: при возможности указывать ФИО всех, с кем вы вместе наблюдали птиц.

Краснозобая гагара *Gavia stellata*: 7.05 1 на оз. Глубом, РУЗ (Семёнова); 15–23.06 1 в парке Кусково, М. (Авдеев, Бурсаков, Виноградова, Губер, Калиниченко, Никитин, Певницкая, А. Потапова, В. Потапова, Федосеева, Черепушкин и др.)

Чернозобая гагара *Gavia arctica*: 7.06 1 у Армягово, ИСТ (Семёнова); 15.06 1 на Волкушинском карьере, ЛЫТ (Новикова)

Малая поганка *Tachybaptus ruficollis*: 15.04 1 у Слободки, Конаковский м.о., Тверская обл. (Уколов); 1.04 у Дмитровского Погоста, ШАТ (Уколов); 20.04 1 у Макаровки, РАМ (Шамин, Шамина); 11.05 1 у Воронино, СЕРПОС (Насонова, Салов); 9.08 2 в Лотошинском р/х, ЛОТ/ВОЛ (Авдеев), там же 6.09 и 13.09 1 (Авдеев), 14.09 3 (Голованова, Шведко, Язаров), 21.09 1 с 3 птенцами (Губина) и 28.09 4 (Авдеев)

Красношейная поганка *Podiceps auritus*: 27.04 1 на Истринском вдхр. у Ивановского, СОЛ (Г. Кириллов); 4.05 1 у Туголесского Бора, ШАТ (Уколов); 18–26.05 1 в Терлецком парке, М. (Виноградов, Губер); 22.05 1 на Владимирском пруду, М. (Власов); 25.05–29.06 гнездование на болоте Зиборова, ОРЕ (Губер, Кац, Невский, Невцветаев, Ровинский; см. статью на с. 43); 4.08 1 у Кашино, ВОЛ (Голубева)

Серощёкая поганка *Podiceps grisegena*: 6 и 28.05 1 у Титовской, ЕГО (Симонов); 4.08 1 у Кашино, ВОЛ (Голубева); 8.08 1 в Лотошинском р/х/озе (Голубева); 4.09 1 у Стремоухово, ВОЛ (Голубева, Моисейкин); 12–20.09 1 в Лотошинском р/х (Авдеев, Голованова, Набровенков, Шведко, Язаров)

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*: много встреч в течение всего периода (БОГ, ВОЛ, ВОС, ЕГО, ИСТ, КЛИ, КОЛ, ЛУХ, М., МОЖ, НАР, ОДИ, РУЗ, СЕРПОС, ЧЕХ,


ЩЁЛ), в основном в рыбхозах и в районе крупных водохранилищ. Самые большие скопления встречены в Лотошинском р/х, напр. 9.08 150 (Авдеев), 13.09 350 (Авдеев), 14.09 150+ (Шведко, Язаров). Там же отмечена попытка гнездования (см. статью на с. 45)

Большая белая цапля *Ardea alba*: Новое место гнездования (четвёртое) в области — гнездо с 4 птенцами в колонии серых цапель на берегу Рузского вдхр. в окр. Осташёво (Беляев Д.А., 2025, РОЖ, 34 (2548): 2919–2921).

Много встреч в течение всего периода (БОГ, ВОС, ДМИ, ЕГО, КЛИ, КОЛ, КРА, ЛОТ, ЛУХ, МОЖ, ТАО, ОДИ, ОРЕ, РУЗ, СЕРПОС, СЕРПУХ, СОЛ, СТУ, ШАТ, ЩЁЛ), в основном в рыбхозах и в районе крупных водохранилищ. Самые большие скопление встречены в Лотошинском р/х, напр. 28.05 200+ (Голубева, Моисейкин, Швыдун), 6.09 150 (Авдеев), 14.09 100 (Пронькин)

Чёрный аист *Ciconia nigra*: 29.03 1 в Дединовской пойме, ЛУХ (Кердивар, Лапшина, Морозова, Потопаева, Черепушкин), там же 26.04 1 (Юрьев); 26.04 1 у Ивакино, МОЖ (Конторщиков); 26.04–24.05 1 в Лотошинском р/х (Авдеев, Голубева, Губина, Д.В. Давыдов, Калиниченко, А. Кириллов, Ковалёв, Никитин, Пархаев, Скачков, Хоханова и др.), там же 13.06 2 (Д.В. Давыдов), 21.06 1 (Семёнов) и 5.07 3 (Авдеев); 26.04 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Федосеева), там же 24.05 1 (Авдеев, Ковалёв, Пархаев), 25.06 1 (Шведко), 5.07 1 (Д.В. Давыдов) и 3.08 1 (Авдеев); 1.06 1 в Дединовской пойме (Новосёлова), там же 5.07 1 (Конов) и 3.08 4 (Авдеев, Ковалёв); 9.05 1 в Песках, КОЛ (Федоринов); 27.04 1 у Ольян, ЛУХ (Чугляев); 6.08 1 у Подмоклово, СЕРПУХ (Губина)

Белощёкая казарка *Branta leucopsis*: 3.04 у Кашино, ВОЛ (Голубева, Моисейкин); 5.04 2 на Нарских прудах (Баранова, Губер, Кац, Петрова); 5.04 2 у Пенского, ТАЛ



Красношейная поганка, Владимирский пруд, М., 22.05.2025 г.

Фото: Е.Ю. Власов



Большой баклан, Лотошинский рыбхоз, 27.07.2025 г.

Фото: В.П. Авдеев



Чёрный аист, Лотошинский рыбхоз, 20.05.2025 г.

Фото: С.А. Скачков

(Е. Великанов, Губина, Д.В. Давыдов, Мамаева, Тригер, Шведко); 19.04 3 в Лотошинском р/х (Авдеев, Невский, Нецветаев), там же 20.04 1 (Долгоруков, Остапова), 4.05 2 (Авдеев), 10.05 2 (Никитин) и 17.05 1 (Брандт, Калининченко, Никитин, Симонов, Черепушкин); 20.04 1 в Виноградовской пойме, ВОС (Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов, Никитин, Черепушкин), 10.05 2 там же (Уланова); 27.04 2 у Ожого, ВОЛ (Д.В. Давыдов); 3.05 4 у Дубранивки, ШАХ (Калякин, Калякина); 4.06 2 у Заболотья, СЕРПОС (Конторщиков)

Канадская казарка *Branta canadensis*: 18.04 1 в Мытищах (Гончаров); 21.06–28.09 1 в Лотошинском р/х (Семёнов, Авдеев, Губина, Д.В. Давыдов, Пронькин и др.)

Краснозобая казарка *Branta ruficollis*: 30.03 1 в Лотошинском р/х (Голубева), там же 13.04 2 (Авдеев, Кова-

лёв, Скачков, Филатов), 27.04–17.05 1 (Авдеев, Калининченко, Ковалёв, Никитин и др.)

Серый гусь *Anser anser*: 3.04 у Мастищево, ВОЛ (Голубева, Моисейкин); 3.04 у Суворово, ВОЛ (Голубева, Моисейкин); 5.04 2 в Лотошинском р/х (Авдеев), 15.04 там же (Голубева, Моисейкин); 11.09 7 у пос. Фабрики 1 Мая, НАО (Гельметдинов)

Пискулька *Anser erythropus*: 1.04 возм. 1 над парком Кузьминки, М. (Д.В. Давыдов, см. заметку на с. 48); 3.04 1 у Кашино, ВОЛ (Голубева, Моисейкин); 4.05 1 в Лотошинском р/х (Авдеев)

Короткоклювый гуменник *Anser brachyrhynchus*: 20.04 1 (фото есть; м.б. несколько) в Лотошинском р/х (Г. Ларин), там же 27–28.04 1 (фото есть) (Калининченко, Никитин) и 8.05 1 (Левина)



Канадская казарка, Лотошинский рыбхоз, 27.07.2025 г.
Фото: В.П. Авдеев



Канадская казарка, Лотошинский рыбхоз, 2.06.2025 г.
Фото: С.А. Скачков



Змееяд, Дединовская пойма, 13.04.2025 г.
Фото: Д.В. Давыдов

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*: летние встречи — 10.06 5 у Заболотья, СЕРПОС (Гринченко, Конторщиков); 13.06 1 в Лотошинском р/х (Д.В. Давыдов); 12.07 1 в Лотошинском р/х (Левина); 30.08 6 у Бучево, ТАЛ (Авдеев)

Малый лебедь *Cygnus bewickii*: 6.04 5 в Лотошинском р/х (Никитин), там же 13–22.04 1–3 (Филатов, Авдеев, Губер, Губина, Долгоруков, А. Елисеев, Кац, Невский, Невцветаев, Остапова, Попова) и 20.04 4 (Г. Ларин); 14.04 1 у Сипягинского пруда, ТАО (Симонов)

Пеганка *Tadorna tadorna*: 17–18.05 1 в Лотошинском р/х (Калиниченко, Никитин, Симонов, Черепушкин, Голубева), 1.06 1 там же (Новосёллова); 17.05 1 у Чёрного, БАЛ (Конов)

Красноносый нырок *Netta rufina*: 17.05 2–3 в Бисеровском р/х, БОГ (Губина), 10.09 1 там же (Д.В. Давыдов)

Морская чернеть *Aythya marila*: 13.04 2 в Лотошинском р/х (Авдеев), 28.09 4 там же (Авдеев)

Морянка *Clangula hyemalis*: 4.05 1 в Лотошинском р/х (Авдеев); 17.05 1 на Белом оз., Косино, М. (А. Фетисова)

Гоголь *Bucephala clangula*: скопление — 17.05 180 в Лотошинском р/х (Пархаев)

Синьга *Melanitta nigra*: 1.05 пара у Петракова, ДМИ (Конторщиков); 17.05 1 в Лотошинском р/х (Авдеев, Брандт, Пархаев)

Луток *Mergellus albellus*: летние встречи — 27.07 1 в Лотошинском р/х (Авдеев, Губина, Д.В. Давыдов), 9.08 3 там же (Авдеев); 13.08 1 в р/х «Цна», ЕГО (Симонов)

Длинноносый крохаль *Mergus serrator*: 1.05 9 (4 самца, 5 самок) на Сипягинском пруду, ТАО (Симонов); 4.05 2 у Москворецкой Слободы, МОЖ (Сазонов); 6.05 2 самца в р/х «Цна», ЕГО (Симонов)

Большой крохаль *Mergus merganser*: летние встречи — 23.06 2 в Виноградовской пойме (Язаров); 15.08 1 в Лотошинском р/х (Голубева)

Степной лунь *Circus macrourus*: 5.04 1 самец у Константиново, СЕРПОС (Кузьмин); 12.04 1 самец у Лужков, СЕРПУХ (Дёров); 14.04 1 в Дединовской пойме (Губина, Малышева); 20.04 1 у Теряево, ВОЛ (Голубева, Моисейкин); 20.04 1 в Виноградовской пойме (Никитин); 23.04 1 самец у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова); 26.04 1 у Троицы, ТАО (Гончаренко); 17.05 1 у Шишково, ВОЛ (Д.В. Давыдов); 17.05 1 самка у Слободы, КЛИ (Русол); 24.05 пара у Крутовца, СЕРПРУД (Федосеева); 31.05 1 самка у Большого Брянцево, ПОД (Д.В. Давыдов, А. Носенко); 8.07 1 у Разиньково, СТУ (Насонова, Салов); 16.08 у Шишково, ВОЛ (Конов); 22.08 1 мол. у Клёново, ТАО (Симонов); 22.08 у Большого Брянцево, ПОД (Голубева, Моисейкин); 28.08 у Ланьшинского карьера, СЕРПУХ (Симонов); 20.09 1 у Стрешневых Гор, ЛОТ (Авдеев)

Курганник *Buteo rufinus*: 29.06 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Бугакова, Виноградова, Голованова, Губина, Тригер, Шведко, Шурыгина, Язаров)

Змееяд *Circaetus gallicus*: 29.03 1 в Дединовской пойме (Кердивар, Лапшина, Морозова, Потопаева, Черепушкин), там же 13.04 1 (Д.В. Давыдов, Калиниченко); 13.04 1 в Виноградовской пойме (Белинский); 18.04 1 у Губино, ОРЕ (Сазонов); 19.04 1 в Талдомском ГО (Пылёв, Хлебникова); 17.05 1 у Трофимово, ВОС (Баранова, Губер, Кац); 21.05 1 у Фосфоритного, ЕГО (Черепушкин); 8.06 1 у Новой Ольховки, НАР (С. Елисеев); 23.06 2 у Лисьих Нор, ЛУХ (Невский); 29.06 1 там же (Бугакова, Виноградова, Голованова, Губина, Тригер, Шведко, Шурыгина, Язаров), 16.08 1 там же (Д.В. Давыдов, Авдеев); 3.07 у Туголесского Бора, ШАТ (М. и П. Пахлевановы); 16.08 у Лесного, ЛУХ (Д.В. Давыдов); 6.09 1 у Савинской, ШАТ (Губина, Населевец, Шведко); 7.09 1 у Пестовской, ШАТ (Невский)

Орёл-карлик *Hieraaetus pennatus*: 13.04 1 (светлая морфа) в Дединовской пойме (Д.В. Давыдов, Калиниченко), там же 14.04 1 (Губина, Малышева), 31.07 1



Орёл-карлик, окр. Белоомута, 24.07.2025 г.

Фото: В.П. Авдеев



Камнешарка, Лотошинский рыбхоз, 28.05.2025 г.

Фото: Е.В. Швыдун

(Набровенков) и 3.08 1–3 (Авдеев, Ковалёв); 20.04 1 в Виноградовской пойме (Д.В. Давыдов, Никитин, Черепушкин), там же 31.07 1 (Д.В. Давыдов, Язаров) и 14.08 2 (Д.В. Давыдов); 20.04–7.09 1–2 у Лисьих Нор, ЛУХ (Авдеев, Губина, Д.В. Давыдов, Ковалёв, Пархаев, Павлушкин); 1.06 1–2 у Белоомута, ЛУХ (Брандт, Калашников, Остапова, А. Потапова); 3.06 1 (тёмная морфа) у Перевицкого Торжка, ЛУХ (Калининченко, Симонов); 8.06 1 у Раково, ИСТ (Новосёлова); 21.06 1 у Ланьшинского карьера, СЕРПУХ (Голованова, Дёров, Хоханова, Шарло); 23.06 1 у Раменского (Язаров); 25.06 1 у Солчино, ЛУХ (Шведко); 3.07 у Больших Горок, НАР (Швыдун); 5.07 1 у Пущино, СЕРПУХ (Левина); 13.07 1 у Семёновского, СТУ (Уланова); 18.07 1 у Алпатьево, ЛУХ (Губина); 24.07 1 в окр. Белоомута, ЛУХ (Авдеев); 3.08 1 у Ильинского, КРА (Губина)

Степной орёл *Aquila nipalensis*: 28.04 1 мол. (фото) у Петровского, ВОЛ (Скачков; см. статью на с. 50); 15.05 1 мол. (фото) в Гаврилково, КРА (Швыдун)

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*: много встреч 1–2 птиц в традиционных местах, в основном в ВОЛ, ВОС, ЕГО, КЛИ, КОЛ, ЛОТ, ЛУХ, МЫТ, ОДИ, ТАО, ШАТ. Больше всего птиц встречены в Лотошинском р/х, напр. 20.04 6 (А. Елисеев, Долгоруков, Остапова, Попова) и 26.04 14 (Ковалёв, Пархаев)

Сапсан *Falco peregrinus*: встречи вне Москвы — 8.05 1 у Кульпино, ЛОТ (Авдеев, Ковалёв); 17.05 1 в Лотошинском р/х (Калининченко, Никитин, Симонов, Черепушкин)

Дербник *Falco columbarius*: 5.04 1 у Пенского, ТАЛ (Е. Великанов, Губина, Д.В. Давыдов, Мамаева, Триггер, Шведко); 11.04 1 в Виноградовской пойме (Белинский); 26.04 1 у Шишково, ВОЛ (Ковалёв, Пархаев); 3.05 1 самка у Пасыкино, СТУ (Насонова, Салов); 8.05 1 у Котляково, ЛОТ (Ковалёв); 24.06 1 у Ольшан, ЛУХ (Ерёмки, Ковылов, Шведко); 9.08 1 в Лотошинском р/х (Авдеев)

Кобчик *Falco vespertinus*: 10.05 1 самка у Нушпол, ТАЛ (М. Великанов, Хромов); 20.05 1 у Тимонино, НАР (Ковалёв); 3.06 1 самка в Дединовской пойме (Калининченко, Симонов); 12.06 1 у Лисьих Нор, ЛУХ (Д.В. Давыдов); 25.06 1 у Красной Поймы, ЛУХ (Шведко); 14.08 1 в Виноградовской пойме (Д.В. Давыдов); 25.08 7 в аэропорту «Шереметьево», ХИМ (Губина); 31.08 1 у Поливаново, ПОД (ru-birds); 31.08 1 у Захнево, РУЗ (Г. Кириллов); 1.09 1 у Рождествено, ИСТ (Новосёлова); 6.09 1 мол. У Ильинского, КРА (Язаров)

Фазан *Phasianus colchicus*: 1.04 2 самца у Некрасовского, ДМИ (Перова); 20.04 в Прилуках, СЕРПУХ (Салов,

Насонова); 27.04 1 у Шишково, ВОЛ (Калининченко, Никитин); 21.06 4 (самка и 3 птенца) у Никифорово, СЕРПУХ (Голованова, Дёров, Хоханова, Шарло)

Водяной пастушок *Rallus aquaticus*: 40+ встреч в ВОЛ, ВОС, КЛИ, ЛОТ, М., ОДИ, ОРЕ, ПОД, РУЗ, СЕРПОС, СТУ, ШАТ

Малый погоныш *Zapornia parva*: 27.04 2 на Нарских прудах (Благая, Брандт, Власова, Жиленков, Журавлёва, Калашников, Карасёва, Черепушкин); 9.05 1 в окр. Лотошинского р/х (Ковылов); 4 и 13.06 1 у Заболотья, СЕРПОС (Гринченко, Конторщиков); 11.06 у Пестово, БАЛ (Калининченко); 13.06 6 (5 позывок, 1 токующий самец) у Федорцово, СЕРПОС (Гринченко, Конторщиков)

Тулес *Pluvialis squatarola*: 17.05 1 у Белого оз., Косино, М. (Фетисова); 18.05 1 в Лотошинском р/х (Голубева, Пудовиков), 28.09 4 там же (Авдеев); 12.07 1 в Царицыно, М. (eBird); 1.06 у Сергиева Посада (Салов); 23.09 1 у Захарихи, РАМ (Голованова, Губина), там же 26.09 2 (Набровенков) и 27.09 1 (Губер, Кац)

Золотистая ржанка *Pluvialis apricaria*: крупные стаи — 26.04 1500 у Шишково, ВОЛ (Ковалёв, Пархаев); 26.04 500 у д. Зименки, ШАТ (Шведко); 27.04 200 у Шишково, ВОЛ (Калининченко, Никитин); 17.05 100 там же (Калининченко, Никитин, Симонов, Черепушкин)

Галстучник *Charadrius hiaticula*: 26–27.04 1 в Лотошинском р/х (Авдеев, Ковалёв, Пархаев, Д.В. Давыдов, А. Носенко, В. Носенко), там же 17.05 25 (Авдеев, Брандт, Калининченко, Ларин, Никитин, Пархаев, Симонов, Филатов, Черепушкин и др.); 18–25.05 1–10 (Д.В. Давыдов, С. Потапова и др.), 1.06 5 (Новосёлова), 13.09 40 в Лотошинском р/х (Авдеев) 14–27.09 3–20 (Авдеев, Губина, Пронькин, Федосеева); 17.05 1 у Белого оз., Косино, М. (Фетисова); 22.05 1 в Клиновском р/х (Нефёдова), там же 29.08 1 (Невский, Ровинский, Язаров) и 1.09 1 (Голубева, Моисейкин); 25.05 14 у Окаёмо, СЕРПОС (Конторщиков), 3.06 4 там же (Конторщиков); 3.06 5 у Перевицкого Торжка, ЛУХ (Калининченко, Симонов); 7.06 1 у Шорново, РУЗ (Г. Кириллов); 12.07 1 в Царицыно, М. (eBird); 7.09 у Сихнево, ДМИ (Уколов); 8.09 12 у Зиброво, СЕРПУХ (Левина); 8.09 1 у Ильинского, КРА (Губина); 18.09 1 в Строгино, М. (Кузиков, Чурикова; см. статью на с. 51); 26.09 1 у Захарихи, РАМ (Набровенков); 27.09 2 у Алфимово, СТУ (Губер, Кац)

Камнешарка *Arenaria interpres*: 24.05 1 в Лотошинском р/х (Д.В. Давыдов), 28.05 там же (Швыдун), 4.06 8 там же (Бондарева, Петрова); 20.07 1 у Рыжовского пруда, ТАО (Балаев)



Ходулочник, окр. г. Озёры, 3.06.2025 г.

Фото: В.Д. Калиниченко



Ходулочник, окр. г. Озёры, 7.06.2025 г.

Фото: В.П. Авдеев



Кулик-сорока, окр. г. Озёры, 7.06.2025 г.

Фото: В.П. Авдеев



Щёголь, Лотошинский рыбхоз, 27.07.2025 г.

Фото: В.П. Авдеев

Ходулочник *Himantopus himantopus*: 24.05 3 у Никифорово, СЕРПУХ (Брандт, Калашников, Малов, Остапова, Черепушкин); 3.06 2 (спаривание) в Озёрах, КОЛ (Калиниченко, Симонов), 7.06 2 там же (Авдеев)

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*: встречи вне поймы Оки (КАШ, КОЛ, ЛУХ, СЕРПУХ) — 27.03 1 у Дубны (iNaturalist); 5.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Уланова); 8–10.04 2 у Рыжовского пруда, ТАО (Балаев, Дёров и др.); 13.04 1–2 в Лотошинском р/х (Авдеев, Филатов), там же 26–27.04 1 (Авдеев, Д.В. Давыдов), 4.05 1 (Авдеев) и 17.05 1 (Авдеев, Калиниченко, Никитин, Симонов, Черепушкин); 13.04 1 у Шишково, ВОЛ (Авдеев); 17.05 1 у Воронино, СЕРПОС (Насонова, Салов); 1.06 у Сергиева Посада (Салов); 13.06 1 (по голосу) в Шорново, РУЗ (Г. Кириллов)

Щёголь *Tringa erythropus*: 20.04 1 в Лотошинском р/х (Голубева, Моисейкин), там же 4.05 8 (Авдеев), 7.05 4 (Никитин), 8.05 2–5 (Ковалёв, Левина, Шипилова), 10.05 6 (Никитин), 17.05 1–15 (Авдеев, Брандт, Калиниченко, Ларин, Никитин, Пархаев, Симонов, Филатов, Черепуш-

кин), 12.07 1 (Левина), 18.07 4 (Авдеев), 27.07 3 (Авдеев, Губина, Д.В. Давыдов), 12–14.09 1–6 (Авдеев, Голова-нова, Набровенков, Шведко, Язаров); 6.05 1 на Красной Пресне, М. (Салов); 6.05 4 в р/х «Цна», ЕГО (Симонов), там же 28.05 1 (Симонов), 21.06 3 (Д.В. Давыдов); 8.05 1 у Петрищево, РУЗ (Сазонов); 16.05 1–2 у Петраково, ДМИ (Конторщиков); 10.06 2–3 у Заболотья, СЕРПОС (Гринченко, Конторщиков); 12.06 1 у Подмоклово, СЕРПУХ (Авдеев); 4.08 1 у пос. дома отдыха Горки, ДМИ (Уколов); 17.08 1 на Рыжовском пруду, ТАО (Симонов); 27.08 1 на Нарских прудах (Баранова)

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*: 17–28.05 2–3 в Лотошинском р/х (Авдеев, Голубева, Пархаев, А. Потапова, Пудовиков, Швыдун), 13.09 2 там же (Авдеев); 3.06 2 в Озёрах, КОЛ (Калиниченко, Симонов); 13.08 у Никифорово, СЕРПУХ (Голубева); 4.09 в Горбуново, ВОЛ (Голубева, Моисейкин)

Турухтан *Philomachus pugnax*: крупная стая — 26.04 500 у Шишково, ВОЛ (Ковалёв, Пархаев)



Чернозобик, Лотошинский рыбхоз, 19.07.2025 г.

Фото: В.П. Авдеев

Кулик-воробей *Calidris minuta*: 15.07 1 у Рыжовского пруда, ТАО (Балаев); 22.07 2 у Никифорово, СЕРПУХ (Дёров), там же 8.09 4 (Левина); 27.08 3 у Нарских прудов (Баранова); 29.08 3 в Клинском р/х (Невский, Ровинский, Язаров); 12–14.09 10–50 в Лотошинском р/х (Авдеев, Голованова, Шведко, Язаров), 21.09 3 там же (Губина); 23–26.09 1 у Захарихи, РАМ (Голованова, Губина, Набровенков)

Белохвостый песочник *Calidris temminckii*: 6.05 у Рахманово, ПАВ (М. Пахлеванова); 15–18.05 1–35 в Лотошинском р/х (Авдеев, Голубева, Губина, Калиниченко, Ларин, Лупанов, Никитин, Пархаев, Пудовиков, Симонов, Филатов, Фролов, Черепушкин и др.), там же 18.07 2 (Авдеев), 27.07 5 (Авдеев, Губина, Д.В. Давыдов) и 13.09 2 (Авдеев); 16.05 1 у Петраково, ДМИ (Контрощиков); 22.05 5 в Клинском р/х (Нефёдова); 1.06 1 у Захарихи, РАМ (Федоринов); 31.07 1 у Рыжовского пруда, ТАО (Балаев); 6–7.08 1 у Подмоклово, СЕРПУХ (Губина, Набровенков); 16.08 1 у Окаёмово, СЕРПОС (Контрощиков); 4.09 на Нарских прудах (Губина)

Краснозобик *Calidris ferruginea*: 12.07 2 у Подмоклово, СЕРПУХ (Баранова, Губер, Кац, Петрова), 22.07 1 там же (Губина, Малышева); 27–28.08 3 мол. у Подольска (Д.В. Давыдов, Голубева, Моисейкин); 29.08 10 в Клинском р/х (Невский, Ровинский, Язаров); 4.09 на Нарских прудах (Губина); 6.09 3 в Лотошинском р/х (Авдеев), 13.09 2 там же (Авдеев)

Чернозобик *Calidris alpina*: 21.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Нефёдова); 16.05 5 у Петраково, ДМИ (Контрощиков); 15.05 в Лотошинском р/х (Голубева, Губина); 17.05 50–85 там же (Авдеев, Брандт, Калиниченко, Лупанов, Никитин, Пархаев, Симонов, Филатов, Фролов, Черепушкин), там же 24.05 5 (Д.В. Давыдов); 17–18.05 1 в Дединовской пойме (Долматова, Пудовиков); 18.05 1 у Никифорово, СЕРПУХ (Нецветаев), 24.05 9 там же (Брандт, Калашников, Малов, Остапова, Черепушкин); 25.05 1 у Тарасково, КАШ (Новосёлова); 28.05 у Сергиева Посада (Салов); 3.06 1 у Окаёмово, СЕРПОС (Контрощиков); 12.07 5 в Лотошинском р/х (Левина), там же 18.07 1 (Авдеев), 6.09 8 (Авдеев), 13.09 15 (Авдеев), 14.09 5 (Голованова, Шведко, Язаров), 20.09 3 (Авдеев), 21.09 2 (Губина), 28.09 15 (Авдеев); 3.08 1 у Рыжовского пруда, ТАО (Балаев); 6.08 1 у Подмоклово, СЕРПУХ (Губина); 10.08 1 в Шорново, РУЗ (Г. Кириллов); 10.08 1 у Ли-

сских Нор, ЛУХ (Губина); 29.08 5 в Клинском р/х (Невский, Ровинский, Язаров), там же 1.09 (Голубева, Моисейкин); 30.08 у Нарских прудов (Губина); 8.09 1 у Зиброво, СЕРПУХ (Левина); 23.09 2 у Захарихи, РАМ (Голованова, Губина), там же 26.09 2 (Набровенков) и 27.09 1 (Губер, Кац); 27.09 1 у Тимонино, ВОЛ (Федосеева)

Песчанка *Calidris alba*: 6–14.09 1 в Лотошинском р/х (Авдеев, Голованова, Конов, Пронькин, Шведко, Язаров); 23.09 1 у Захарихи, РАМ (Голованова, Губина)

Гаршнеп *Limnospiza minimus*: 18.04 в Куркино, М. (Швыдун); 17–25.04 1–4 у Большого Брянцево, ПОД (Голованова, Губина, Д.В. Давыдов, Калиниченко, Левина, Конов, Набровенков, Невский, А. Носенко); 20.04 4 в Виноградовской пойме (Д.В. Давыдов, Никитин); 1.05 1 у Матюшкино, ЛОТ (Невский); 2.05 1 у Большого Брянцево, ПОД (Губер); 16.05 1 в Крылатском, М. (Губер)

Средний кроншнеп *Numenius phaeopus*: 11.04 6 в Виноградовской пойме (Белинский), 20.04 1 там же (Д.В. Давыдов, Никитин); 20.04 1 у Большого Брянцево, ПОД (Симонов), 22.04 4 там же (Калиниченко, Симонов); 26.04 16 в Лотошинском р/х (Авдеев, Ковалёв, Пархаев); 16.05 1 в Крылатском, М. (Губер); 4.08 1 у Чегодаево, ТАО (Симонов)

Малая чайка *Hydrocoloeus minutus*: 22.04 2 в Лотошинском р/х (Голубева, Губина, Моисейкин), там же 26.04 2 (Авдеев, Ковалёв, Пархаев), 27.04 2 (Калиниченко, Никитин), 4.05 8 (Авдеев), 8.05 1 (Ковалёв), 17.05 1–3 (Авдеев, Брандт, Калиниченко, Ларин, Никитин, Симонов, Черепушкин), 18.05 1 (А. Потапова), 2.06 1 (Голубева), 13.09 1 (Авдеев) и 21.09 3 (Губина); 27.04 у Мельчевки, ДМИ (Невский, Великанова, Демичева); 28.04 в ГО Домодедово (Салтыкова); 1.05 5 у Степаньково, ЛОТ (Невский, Нецветаев); 3.05 12 в Виноградовской пойме (Пархаев), 7.05 6 там же (Никитин); 6.05 15 в р/х «Цна», ЕГО (Симонов); 18.05 2 у Туголесского Бора, ШАТ (Уколов); 29.05 2 мол. в Бисеровском р/х (Д.В. Давыдов), там же 5.08 2 (Виноградова, Шведко), 17.08 20 (Губина) и 31.08 5 (Шведко); 6.06 3 пары в колонии озёрных чаек и речных крачек у Петраково, ДМИ (Гринченко, Контрощиков); 3.08 2 на Рыжовском пруду, ТАО (Балаев); 4.08 у Кашино, ВОЛ (Голубева); 8.08 в Горбуново, ВОЛ (Голубева), 4.09 там же (Голубева, Моисейкин); 31.08 1 мол. в Царицыно, М. (Виноградов)

Халей *Larus heuglini*: 1.04 37 в Бисеровском р/х (Шведко), там же 2.04 63, 4.04 60, 15.04 320 (вместе с клушами), 17.04 80 (вместе с клушами), 5.08 30 (Шведко) и 28.09 1 (Авдеев, Конов); 25.04 2 у Константиново, СЕРПОС (Шведко)

Клуша *Larus fuscus*: 1.04 5 в Бисеровском р/х (Шведко), там же 2.04 5–7, 15.04 320 (вместе с халеями), 17.04 80 (вместе с халеями) (Шведко), 30.07 1 (Д.В. Давыдов), 5.08 1 (Шведко) и 28.09 1 (Конов); 12.04 2 в Виноградовской пойме (Барабанова, Губер, Кац, Невский, Петрова); 20.06 1 у Каурцево, НАР (С. Елисеев); 28.09 1 в Лотошинском р/х (Авдеев)

Морская чайка *Larus marinus*: 10.09 1 в Бисеровском р/х (Д.В. Давыдов), 28.09 2 там же (Конов)

Белощёкая крачка *Chlidonias hybrida*: 26.04 1+ на оз. Великом, ШАТ (Шведко); 4.05 6 у Новосергиево, БОГ (Седых); 5.05 1 в Лотошинском р/х (Постовая, Пылёв, Ямбаев), там же 17.05 1 (Коновалов) и 24.05 6–20 (Д.В. Давыдов); 6.05 1 в р/х «Цна», ЕГО (Симонов); 14–18.05 1 на оз. Нерском, СЕРПУХ (Дёров, Голубева); 19.05 1 в Лышиково, ОРЕ (Васильев); 20.05 1 в Озёрах, КОЛ (Киселёв); 23.05 2 в Виноградовской пойме (Ники-



Западный черноголовый чекан, Лукерьино, 12.07.2025 г.

Фото: В.П. Авдеев



Юрок с кормом, Тропарёвский парк, М., 30.05.2025 г.

Фото: О. Корабельникова

тин), там же 10.06 4 (Гончаров), 13.06 1 (Губер, Кац) и 23.06 1 (Язаров); 28.05 5 у Погостище, ШАТ (Невский, Нецветаев); 30.05 1 в парке Кузьминки, М. (Семенец); 1.06 1 у Маришкино, ВОС (Никонорова); 8.06 20 пар на оз. Дубовом, ШАТ (Шведко), 22.06 10 пар там же (Шведко); 10.06 1 у Заболотья, СЕРПОС (Гринченко, Конторщиков); 22.06.2025 1 у Дорофеево, ШАТ (Шведко)

Чеграва *Hydropogon caspia*: 30.04 1 в Лотошинском р/х (Скачков), 21.06 1 (окольцованная) там же (Семёнов); 14.05 5 в Анискино, ЛОС (Горин)

Филин *Bubo bubo*: 16.04 1 (голос) у Подушкино, ОДИ (Олещенко-Коржаков); 12.06 1 в Журавлиной родине (Пылёв, Шариков; см. заметку на с. 53)

Сплюшка *Otus scops*: с 31.05 по 2.06 в Крылатском, М. (Межнева, Федулеева); 9.06 1 в окр. Рошалья, ШАТ (Уколов)

Бородатая неясыть *Strix nebulosa*: 4.04 у Раменского (Рудов)

Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus*: 20.04 2 в Конобеево, ВОС (Белинский, Власова, Жиленков, Карасева, Никитин, С. Потапова); 12.06 в Озёрах, КОЛ (Д.В. Давыдов); 24.06 1 мол. в Бутово, М. (Ардатов); 31.07 1 в Виноградовской пойме (Д.В. Давыдов, Язаров); 11.08 1 в Дединовской пойме (Голубева)

Трёхпалый дятел *Picoides tridactylus*: 14+ встреч в ВОЛ, КРА, СЕРПОС, НАР, СТУ, ШАТ, ЩЁЛ

Малый жаворонок *Calandrella brachydactyla*: 26.05 1 (фото) у Чегодаево, ТАО (Симонов)

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*: 5.04 5 в Виноградовской пойме (А. Елисеев, Шведко); 11.04 7 в Барвихе, ОДИ (Голубева); 12.04 3 у Кашино, ВОЛ (Голубева); 12.04 10 в Строгино, М. (eBird); 13.04 5 у Слободы, ЛЕН (Пархаев); 13.04 16 у Ерёмино, ЩЁЛ (Седых)

Чернолобый сорокопут *Lanius minor*: 2.06 1 у Крутовца, СЕРПРУД (Балаев)

Серый сорокопут *Lanius excubitor*: летние встречи (июнь-июль) — 24.06 1 у Лесного, ЛУХ (Ерёмкин, Ковылов, Шведко); 25.06 6 у Авсюнино, ОРЕ (Невский); 25.06 1 в Дединовской пойме (Шведко), 12.07 4 (в двух местах) там же (Авдеев, Д.В. Давыдов); 3.07 1 южнее Дубровки, ОРЕ (Сазонов); 6.07 1 у Дубровино, ШАХ (Г. Кириллов); 12.07 1 у Панюково, ШАХ (Калякин); 27.07 1 у Леки, ШАТ (Уколов); 3.08 1 в Дединовской пойме (Авдеев)

Индийская камышевка *Acrocephalus agricola*: 28.05 2 в р/х «Цна», ЕГО (Симонов); 13.06 1 у Виноградово (Губер, Кац), там же 23.07 1 (Д.В. Давыдов); 6.07 1 в Бисе-

ровском р/х (Шведко), 17.08 1 там же (Губина); 31.07 2 (Д.В. Давыдов, Язаров); 17.08 1 в Виноградовской пойме (Бондарева, Губер)

Ястребинная славка *Sylvia nisoria*: встречи в Москве — 15.05 пара в Митино, М. (Аверьянова), там же 24.06 1 самец с кормом и 3.07 пара со слётками (Аверьянова); 23.05 1 в Царицыно, М. (Пронькин), там же 19.07 1 (Кац) и 5.08 3 (Д.В. Давыдов)

Пеночка-зарничка *Phylloscopus inornatus*: 16.08 1 (запись голоса) в Шорново, РУЗ (Г. Кириллов)

Мухоловка-белошейка *Ficedula albicollis*: встречи в Москве — 27.04 1 в Щукино, М. (СОПР); 28.04 1 у ст. метро «ВДНХ», М. (Кузнецов); 28.04 1 в Капотне, М. (Сидорова); 30.04 1 в Капотне, М. (Василевская, Губина); 9.05 1 в Битцевском лесопарке, М. (eBird); 12.05 1 на Воробьёвых горах, М. (С.В. Волков); 14.05 самец в парке Узкое, М. (Симонов); 18.05 пара в парке Алтуфьево, М. (Ги); 22.05 1 в Царицыно, М. (Саржант); 22.05 1 в Битцевском лесопарке, М. (Олифер); 25.05 1 в Измайловском парке, М. (Д.В. Давыдов); 28.05 1 на Краснопресненской наб., М. (eBird); 1.06 1 в парке Покровское-Стрешнево, М. (Калашникова); 3.06 1 в Битцевском лесу, М. (Д.С. Давыдов); 16.06 1 в Терлецком лесопарке, М. (Зубрилова); 2.07 1 самец в Измайловском парке, М. (А. Потапова)

Западный черноголовый чекан *Saxicola rubicola*: 1.05 1 самец у Алпатьево, ЛУХ (Сазонов); 12.07 2 у Лукерьино, КОЛ (Авдеев, Д.В. Давыдов)

Сибирский черноголовый чекан *Saxicola taura*: 9.06 2 у Лыткарино, ЛЫТ (Калиниченко), там же 16.06 2 (Набровенков), 21.06 6 (гнездование; см. статью на с. 64) (Д.В. Давыдов и др.), 29.06 тот же выводок (Голубева); 31.05–5.07 беспокоящаяся пара у Песочного, СЕРПРУД (Губина, Голованова, Дёров, Нецветаев, Невский)

Каспийский подвид ремеза *Remiz pendulinus caspius*: 21 и 28.05 у д. Погостищи, ШАТ (Невский, Нецветаев, см. фото на с. 11)

Черноголовая гаичка *Parus palustris*: встречи вне обычного ареала — 5.04 1 на Дмитровском шоссе, М. (Аксаментов); 18.04 в Радищево, СОЛ (Кудрявцева); 20.04 1 в ГЭС, М. (Калашникова); 2.05 1 у Лобково, РУЗ (Колочинский); 7.05 1 в Звенигороде, ОДИ (Лучникова); 8.05 2 в Анискино, ЛОС (Горин)

Князёк *Parus cyaneus*: в течение всего периода 1–3 в Лотошинском р/х (20+ наблюдателей); 10.05 3 в Журавлиной родине, ТАЛ (С.В. Волков)



Садовая овсянка, окр. Белоомута, 3.07.2025 г.
Фото: С.А. Скачков



Просянка, пойма Оки южнее Белоомута, 3.06.2025 г.
Фото: В.Д. Калиниченко

Юрок *Fringilla montifringilla*: 30.05 самец с кормом в Тропарёвском парке, М. — доказанное гнездование (Корабельникова)

Европейский выюрок *Serinus serinus*: 16.04 1 в ГО Орехово-Зуево (Баженова); 25.04 пара в Шатуре (Ерёмки); 27.04 пара (возм. 3 птицы) в сквере Героев-Нефтяников, Капотня, М. (Евсеев), там же 30.04 пара (Василевская, Губина), 2.05 спаривание пары (Авдеев), 3.05 2 самца (конфликт) и 1 самка (Виноградов), одна пара загнездилась, 25.07 1 самец, 2 птенца (Виноградова); 18.04 3 у Лукьяновки, ЛЮБ (Белинский); 12.05 1 в Химках (Шахватова); 14.05 1 в Серебряных Прудах (СОПР); 20.05 1 в Озёрах, КОЛ (Киселёв), 3.06 1 там же (Калиниченко, Симонов)

Лапландский подорожник *Calcarius lapponicus*: 13.04 1 у Слободы, ЛЕН (Пархаев); 3.05 3 в Виноградовской пойме (Пархаев)

Пуночка *Plectrophenax nivalis*: 13.04 8 у Слободы, ЛЕН (Пархаев)

Садовая овсянка *Emberiza hortulana*: 26.05 1 в Анискино, ЛОС (Горин); 17.05 1 у Крутовца, СЕРПРУД, 2.06 2 там же (Балаев); 3.06 1 у Белоомута, ЛУХ (Калиниченко, Симонов), 28.06 2 там же (Филатов); 6.06 у Лопатино, ТАО (М. и П. Пахлевановы); 28.06 у Крутого, СЕРПРУД (Дёров)

Овсянка-ремез *Ocyris rusticus*: 10.04 1 (фото) у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова); 10.09 5 у Бисеровского р/х (Д.В. Давыдов)

Просянка *Miliaria miliaria*: 29.04 1 у Барских прудов, ЩЁЛ (Шипилова); 25.05 1 у Кудиново, ЗАР (Невский); 25.05 3 в Дединовской пойме (Невский, Нецветаев); 25.05 2 у Носово-2, ЛУХ (Насонова, Салов); 3.06 5 у Белоомута, ЛУХ (Калиниченко, Симонов); 3.06 1 у Перевицкого Торжка, ЛУХ (Калиниченко, Симонов); 12.06 1 у Госконюшни, СТУ (Насонова, Салов); 12.06 1 у Пасыкино, СТУ (Насонова, Салов); 23.06 в Журавлиной родине (Пылёв); 9.08 1 у Володино, ЛОТ (Авдеев)



Овсянка-ремез, Бисерово, 10.09. Фото: Д.В. Давыдов

Наблюдатели

В.П. Авдеев, Л. Аверьянова, А. Аксаментов, И.М. Ардатов, И.Д. Баженова, А.Н. Балаев, В.А. Белинский, Р. Благая, Н.А. Бондарева, Ю. Брандт, Бугакова, А.С. Бурсаков, И. Васильев, Е. Великанов, М.В. Великанов, А.М. Великанова, Г.М. Виноградов, Е. Виноградова, В.А. Вишневский, Е.Ю. Власов, Ю. Власова, С.В. Волков, С.Л. Волков, А.М. Гельметдинов, С. Голованова, А.В. Голубева, М. Гончаренко, А.И. Гончаров, А. Горин, О.С. Гринченко, Д. Губер, Л.Н. Губина, Д.В. Давыдов, Д.С. Давыдов, Д. Демичева, М.Б. Дёров, В. Долгоруков, М.Л. Долматова, А. Евсеев, А. Елисеев, С.Л. Елисеев, Г.С. Ерёмки, Е.А. Ерошина, А. Жиленков, Н. Журавлёва, А. Зубрилова, Ю. Калашников, О. Калашникова, В.Д. Калиниченко, М.В. Калякин, И.В. Калякина, С. Карасёва, А.В. Кац, К. Кердивар, А.В. Кириллов, Г.Е. Кириллов, А.Н. Киселёв, К.И. Ковалёв, М.В. Ковылов, С. Колочинский, Д.А. Конов, М.В. Коновалов, В.В. Конторщиков, О. Корабельникова, Т. Кудрявцева, И.В. Кузиков, М.В. Кузьмин, А. Лапшина, Г. Ларин, А. Левина, Г. Лучникова, Д. Малов, С.В. Малышева, Е. Мамаева, Е.А. Межнева, В.А. Моисейкин, Н. Морозова, О.О. Набровенков, Е. Населевец, С.О. Насонова, М.А. Невский, Е. Нефёдова, В.А. Нецветаев, Я. Никитин, Е. Новикова, С.Ю. Новосёлова, Н. Олещенко-Коржаков, В.В. Олифер, Н.В. Остапова, А.В. Павлушкин, П.Ю. Пархаев, М.Б. Пахлеванова, П.Ф. Пахлеванова, Е.Л. Певницкая, М.Д. Перова, М.Е. Петрова, Е. Попова, А. Постовая, А. Потапова, В. Потапова, С. Потапова, В. Потопаева, О. Пронькин, Ф. Пудовиков, Е.М. Пылёв, А. Ровинский, А. Рудов, В.А. Русол, А.В. Сазонов, А.А. Салов, А. Салтыкова, Р. Саржант, В.А. Седых, В. Семенец, А.В. Семёнов, Кс.П. Семёнова, Н. Сидорова, С.Б. Симонов, С.А. Скачков, Е.Г. Триггер, И.И. Уколов, М.В. Уланова, С.В. Федоринов, М.Г. Федосеева, Ю.С. Федулеева, А. Фетисова, М.В. Филатов, Д. Фролов, Е. Хлебникова, Т.В. Хоханова, А.А. Хромов, С.А. Черепушкин, И. Чугляев, Н. Чурикова, М.С. Шамин, К.Ю. Шамина, А.В. Шариков, К. Шарло, К. Шахватова, М.А. Шведко, Е.В. Швыдун, А.В. Шипилова, Е. Шурыгина, А. Юрьев, Т.Р. Язаров, Д. Ямбаев и др.

Всем большое спасибо!

Хирт Гроот Куркамп, geert.grootkoerkamp@gmail.com



НОВОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРАММЫ <i>М.В. Калякин</i>	1
ВЕДЕНИЕ СПИСКА ВИДОВ ПТИЦ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
Обновления на сентябрь 2025 года <i>М.В. Калякин, О.В. Волцит</i>	2
АВИФАУНИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЩЁРЕ В 2025 ГОДУ	
<i>В.А. Нецветаев, М.А. Невский, И.И. Уколов, С.Б. Симонов, А.В. Сазонов, М.А. Шведко</i>	3
ГНЕЗДОВАНИЕ ВЯХИРЯ НА ВОРОБЬЁВЫХ ГОРАХ В МОСКВЕ <i>Н.С. Морозов, Г.Э. Александренков, К.Д. Колтышева</i>	12
О СИНАНТРОПИЗАЦИИ ВЯХИРЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ <i>В.В. Конторщиков, О.С. Гринченко, Т.В. Свиридова, А.В. Шариков, Т.С. Массальская, Т.С. Ковинька, А.М. Евсеева, Е.М. Пылёв, А.В. Севрюгин, А.А. Хромов</i>	18
УЧЁТЫ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ	
Видовой состав и численность водоплавающих птиц в Москве летом 2025 года <i>К.В. Авилова, А.Б. Поповкина</i>	20
ПРИЛЁТ ПТИЦ ВЕСНОЙ 2025 ГОДА <i>Х. Гроот Куркамп</i>	26
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ	
О встречах и гнездовании некоторых редких видов птиц на территориях музеев-заповедников «Коломенское» и «Царицыно» в 2019–2025 гг. <i>А.А. Кудрявцев, П.А. Богомазов</i>	41
Новый случай гнездования красношейной поганки в Московской области <i>В.А. Нецветаев, М.А. Невский, А. Ровинский</i>	43
Первое гнездование чомги в ООПТ «Суханово» и гибель птиц <i>М.А. Аргир</i>	44
Первая попытка гнездования больших бакланов в Московской области в Лотошинском рыбхозе <i>В.П. Авдеев</i>	45
Светлые кряквы в Москве и Подмоскowie: взрослые и птенцы <i>А.Б. Поповкина</i>	45
Случаи помощничества у московских водоплавающих <i>К.В. Авилова, А.Б. Поповкина</i>	47
Пискулька (?) в небе над Москвой <i>Д.В. Давыдов</i>	48
О гнездовании и питании птенцов у двух пар перепелятника на территории памятника истории «Бутовский полигон» и в его окрестностях <i>А.Б. Артамонов, Кс.П. Семёнова</i>	48
Степной орёл в Московской области <i>С.А. Скачков</i>	50
Встреча одноногого галстучника в Строгине <i>И.В. Кузиков</i>	51
О современном статусе домового сыча в Московской области <i>В.А. Нецветаев, М.А. Невский, К.Ю. Шамина</i>	52
Филин на севере Московской области: новая регистрация и сведения о питании <i>Е.М. Пылёв, А.В. Шариков</i>	53
Питание серой неясыти на «Бутовском полигоне» (с конца марта до начала сентября 2025 года) <i>Кс.П. Семёнова, А.Б. Артамонов</i>	54
Гнездо под снегом: как сова насиживала яйца в апрельские снегопады <i>Е.Ю. Хлебникова, А.В. Шариков, С.В. Волков</i>	55
Необычный случай гнездования золотистой щурки в долине Протвы <i>Н.Г. Кадетов, Е.Н. Чумакова, А.А. Кадетова</i>	56
Необычно низкое гнездование большого пёстрого дятла в Москве <i>Н.С. Морозов</i>	58
О гнездовании теньковки в населённых пунктах Московской области <i>В.В. Конторщиков</i>	60
Гнездование азиатского черноголового чекана в Лыткарино <i>В.Д. Калиниченко, Д.В. Давыдов</i>	64
Неудачная попытка гнездования ополовников в парке «Яуза» <i>В.П. Авдеев</i>	65
О гнездовании московки на ООПТ «Суханово» в 2025 году <i>А.Б. Артамонов, М.А. Аргир</i>	67
Очевидное невероятное: воробьи и скворец <i>С.В. Барабанищикова</i>	67
РЕЦЕНЗИИ	68
ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ <i>Х. Гроот Куркамп (сост.)</i>	69

